专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年河北省大名县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背200题真题题库附参考答案（完整版）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.抗瘤谱较广，对恶性淋巴瘤效果显著，还能用于治疗自身免疫性疾病的药物是

A：长春新碱

B：多柔比星

C：环磷酰胺

D：博来霉素

答案：C

2.以下药物的镇咳作用从弱到强排列正确的是

A：可待因、吗啡、右美沙芬

B：苯丙哌林、可待因、吗啡

C：喷托维林、苯丙哌林、可待因

D：喷托维林、右美沙芬、苯丙哌林

答案：D

3.阿托品引起便秘的原因是()

A：使括约肌兴奋

B：抑制排便反射

C：抑制胃肠道腺体分泌

D：松弛肠道平滑肌

答案：D

4.对羟甲基戊二酰辅酶A(HMC-CoA)还原酶抑制作用最强的是

A：辛伐他汀

B：普伐他汀

C：阿托伐他汀

D：洛伐他汀

答案：C

5.5岁以下儿童首选的散瞳剂是

A：1%硫酸阿托品眼膏剂

B：10%去氧肾上腺素滴眼剂

C：2%后马托品眼膏剂

D：四环素可的松眼膏剂

答案：A

6.（2016年真题）属于促胰岛素分泌剂的是

A：阿卡波糖

B：二甲双胍

C：那格列奈

D：艾塞那肽

答案：C

7.变异型心绞痛不宜选用的是

A：普萘洛尔

B：胍乙啶

C：硝苯地平

D：硝酸甘油

答案：A

8.红霉素的主要不良反应是

A: 胃肠道反应

B: 过敏反应

C: 耳毒性

D: 肝损伤

答案：A

9.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

A: 不会导致锥体外系反应

B: 不会促进乙酰胆碱的释放

C: 不会导致催乳素增多

D: 不会导致Q～T间期延长及室性心律失常

答案：B

10.使用后可出现口腔苦味

A: 利巴韦林

B: 更昔洛韦

C: 氯霉素

D: 四环素可的松

答案：C

11.用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染的药物是

A: 万古霉素

B: 红霉素

C: 克拉霉素

D: 克林霉素

答案：A

12.硝酸酯类药发挥抗心绞痛作用时，体内参与的物质不包括

A: β 受体

B: cGMA 依赖性蛋白激酶

C: 谷胱甘肽转移酶

D: 钙离子

答案：A

13.可以引起低钾血症和低镁血症，增加洋地黄中毒危险的是

A: 呋塞米

B: 胺碘酮

C: 克拉霉素

D: 硫酸镁

答案：A

14.巨细胞病毒可致

A: 急性出血性结膜炎

B: 角膜炎

C: 巨细胞病毒性视网膜炎

D: 流行性结膜炎

答案：C

15.通过增强 AT-Ⅲ的活性发挥抗凝作用的是

A: 维生素 K1

B：肝素

C：维生素B12

D：香豆素类

答案：B

16.物质代谢过程中催化“一碳单位”转移反应的辅酶组成成分是

A：维生素A

B：维生素B1

C：维生素

D：叶酸

答案：D

17.主要作用于S期的抗肿瘤药物是

A：抗代谢药

B：抗癌抗生素

C：长春碱类

D：烷化剂

答案：A

18.可促进白细胞增生的药物是

A：叶酸

B：维生素B

C：红细胞生成素

D：粒细胞集落刺激因子

答案：D

19.关于双嘧达莫的描述，不正确的是

A：使血小板内环磷酸腺苷（cAMP）减少

B：使血小板内环磷酸腺苷（cAMP）增多

C：常用于肾病综合征的抗凝治疗

D：抑制血小板、上皮细胞和红细胞摄取周围腺苷

答案：A

20.能升高血糖，对抗胰岛素的降血糖作用的是

A：甲状腺素

B：普萘洛尔

C：磺胺甲唑

D：格列喹酮

答案：A

21.属于 β 受体阻断剂的降低眼压药是()

A：甘露醇

B：曲伏前列素

C：毛果芸香碱

D：噻吗洛尔

答案：D

22.可用于金黄色葡萄球菌等革兰阳性菌所致严重感染的是

A：磷霉素钠+万古霉素

B：利奈唑胺+哌替啶

C：磷霉素氨丁三醇

D：利奈唑胺+苯丙醇胺

答案：A

23.通过与寄生虫肠细胞微管蛋白特异性结合而干扰其细胞微管形成，可使寄生虫肠道超微结构退化，从而破坏寄生虫对葡萄糖的吸收及消化功能，最终导致寄生虫死亡的药物是

A：阿苯达唑

B：哌嗪

C：甲苯咪唑

D：左旋咪唑

答案：C

24.下列药物使用期间需要缓慢停药的是

A：依那普利

B：比索洛尔

C：氨氯地平

D：地尔硫?

答案：B

25.甲氧苄啶联用利福平使

A：白细胞减少风险增加

B：抗凝作用增强

C：半衰期缩短

D：肾毒性增加

答案：C

26.中度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

A：5-HT

B：每日化疗前，应用5-HT

C：奥美拉唑+口服地塞米松

D：5-HT

答案：D

27.下列药物属于第四代头孢菌素的是

A：头孢噻肟

B：头孢氨苄

C：头孢吡肟

D：头孢呋辛

答案：C

28.临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌的糖肽类抗菌药物是

A：克拉霉素

B：罗红霉素

C：红霉素

D：万古霉素

答案：D

29.下列描述中，哪一项是胰岛素的禁忌证

A：用于细胞内缺钾

B：对胰岛素过敏和低血糖者

C：酮症酸中毒

D：胰岛素抵抗

答案：B

30.通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上PBP3的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

A：头孢他啶

B：头孢噻肟

C：头孢美唑

D：氨曲南

答案：D

31.下述不属于水溶性维生素的是

A：维生素C

B：维生素B6

C：维生素B1

D：维生素

答案：D

32.（2019年真题）为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化、利尿的同时，还应给予的药物是（）

A：氯化钾

B：螺内酯

C：二甲双胍

D：美司钠

答案：D

33.（2015年真题）患者，男，56岁。有高血压病史4年。体检：血压156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者若长期服用依那普利片，除应监测血压、心、肾功能外。还应监测的指标是（）。

A：血钾

B：血氯

C：血钙

D：血钠

答案：A

34.柔红霉素可能与()存在交叉耐药性。

A：阿糖胞苷

B：甲氨蝶呤

C：环磷酰胺

D：多柔比星

答案：D

35.下述属于外周性多巴胺D2受体阻断剂的是

A：莫沙必利

B：甲氧氯普胺

C：多潘立酮

D：西沙必利

答案：C

36.抑制骨髓造血功能的是

A：四环素

B：氯霉素

C：左氧氟沙星

D：青霉素

答案：B

37.下列不属于肽类抗生素的是

A：多黏菌素B

B：万古霉素

C：利奈唑胺

D：去甲万古霉素

答案：C

38.维生素A的适应证不包括

A：夜盲症

B：干眼病

C：坏血病

D：角膜软化

答案：C

39.（2021年真题）兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是（）

A：呋麻滴鼻液

B：麻黄碱滴鼻液

C：羟甲唑啉鼻喷剂

D：赛洛唑啉滴鼻液

答案：A

40.患者，女，26岁，妊娠3个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是()。

A：头孢氨苄

B：左氧氟沙星

C：青霉素G

D：阿莫西林

答案：B

41.属于多巴胺受体阻断剂的止吐药物是

A：格雷司琼

B：阿瑞吡坦

C：甲氧氯普胺

D：甲地孕酮

答案：C

42.用于治疗单纯性甲状腺肿的是

A：大剂量碘制剂

B：小剂量碘制剂

C：甲状腺素

D：None

答案：C

43.容易引起球后神经炎的抗结核药物是

A：异烟肼

B：利福平

C：乙胺丁醇

D：链霉素

答案：C

44.患者，女，46岁。以"口角歪斜3天"之主诉入院。3天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

A：缓解肿瘤患者的骨转移疼痛

B：佝偻病

C：骨质疏松

D：骨发育不全

答案：A

45.不易导致便秘或腹泻不良反应的药物是

A：氢氧化铝

B：碳酸钙

C：铝碳酸镁

D：三硅酸镁

答案：C

46.下列药物中，与甲氨蝶呤长期大量合用，可引起膀胱移行细胞癌的是

A：维生素类

B：抗病毒药物

C：抗生素

D：糖皮质激素

答案：D

47.匹维溴铵在使用中应注意

A：对食管有刺激性，需整片吞服

B：感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

C：糖尿病患者避免使用

D：痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

答案：A

48.易导致牙齿黄染的药品是

A：庆大霉素

B：多西环素

C：头孢哌酮

D：加替沙星

答案：B

49.可与小剂量糖皮质激素合用，能降低排异反应及感染的发生率，提高存活率的是()

A：硫唑嘌呤

B：环孢素

C：环磷酰胺

D：甲泼尼龙

答案：B

50.最常见不良反应为干咳，严重不良反应为血管神经性水肿的是

A：哌唑嗪

B：卡托普利

C：地高辛

D：氨氯地平

答案：B

51.局麻药吸收过量所引起的症状，错误的是

A：心律失常

B：心缩力增强

C：先兴奋，后抑制

D：血压下降

答案：B

52.小剂量雌激素用于

A：回奶

B：再生障碍性贫血

C：绝经期综合征

D：痛经

答案：C

53.以下维生素在注射前需要进行皮肤敏感试验的是

A: 维生素B2
B: 维生素B1
C: 维生素
D: 维生素B6
答案：B

54.出现流感样症候群，寒战、发热的药物是
A: 对氨基水杨酸
B: 异烟肼
C: 利福平
D: 链霉素
答案：C

55.对大多数肠杆菌科细菌和厌氧菌有活性，但对铜绿假单胞菌、不动杆菌及革兰阳性菌（尤其是肠球菌和耐青霉素肺炎球菌）的活性不及其他碳青霉烯类药物的是
A: 美罗培南
B: 厄他培南
C: 亚胺培南
D: 西司他丁
答案：B

56.属于抗胆碱药的是()
A: 哌仑西平
B: 氢氧化铝
C: 奥美拉唑
D: 雷尼替丁
答案：A

57.属于非磺酰脲类胰岛素促泌剂的是

A：艾塞那肽

B：瑞格列奈

C：罗格列酮

D：阿卡波糖

答案：B

58.患者首次使用西妥昔单抗,为减轻其不良反应常规预处理使用的药物是（）

A：抗组胺类药物

B：维生素类药物

C：质子泵抑制剂

D：化疗止吐类药物

答案：A

59.属于破坏DNA的铂类化合物的抗肿瘤药物是

A：紫杉醇

B：顺铂

C：依托泊苷

D：来曲唑

答案：B

60.氢氯噻嗪的药理作用是()

A：抑制近曲小管的碳酸酐酶活性

B：抑制远曲小管Na

C：与醛固酮受体结合

D：提高血浆渗透性，产生组织脱水作用

答案：B

61.可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

A：白三烯受体阻断剂

B：M受体拮抗剂

C：磷酸二酯酶抑制剂

D：β 受体激动剂

答案：A

62.（2016年真题）外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是

A：地塞米松>卤米松>氯轻松

B：地塞米松>氟轻松>卤米松

C：卤米松>氟轻松>地塞米松

D：卤米松>地塞米松>氟轻松

答案：C

63.可增加肝毒性的药物是

A：甲氨蝶呤

B：利福平

C：阿糖胞苷

D：β 受体阻断剂

答案：B

64.维生素B12主要用于治疗的疾病是

A：再生障碍性贫血

B：缺铁性贫血

C：巨幼细胞性贫血

D：慢性失血性贫血

答案：C

65.氨基糖苷类的作用特点是

A：在酸性环境中抗菌作用增强

B：日剂量一次给药可达到满意杀菌效果

C：口服给药可治疗全身性感染

D：只对繁殖期细菌有杀茵作用

答案：B

66.用于抗艾滋病病毒的药物是

A：利巴韦林

B：更昔洛韦

C：拉米夫定

D：阿昔洛韦

答案：C

67.以降低三酰甘油为主要治疗目标时，首选的调血脂药是

A：依折麦布

B：瑞舒伐他汀

C：辛伐他汀

D：非诺贝特

答案：D

68.大剂量糖皮质激素冲击疗法用于()

A：变态反应性疾病

B：抑制器官移植急性排斥危象

C：肾病综合征

D：湿疹

答案：B

69.注射液含苯甲醇，新生儿和早产儿禁用的药物是

A：甘草酸二铵

B：多烯磷脂酰胆碱

C：甲氧氯普胺

D：雷尼替丁

答案：B

70.渗透到异常细胞的药量比正常细胞多的药物

A：阿达帕林

B：异维A酸

C：壬二酸

D：维A酸

答案：C

71.属于解毒类保肝药的是

A：多烯磷脂酰胆碱

B：异甘草酸镁

C：还原型谷胱甘肽

D：双环醇

答案：C

72.属于超长效胰岛素/胰岛素类似物的是

A：普通胰岛素

B：甘精胰岛素

C：精蛋白锌胰岛素

D：门冬胰岛素

答案：B

73.患者，男，38岁。因“发作性喘息”3个月人院，发作时憋喘、全身大汗、端坐不能平卧，肺部可闻及哮鸣音。诊断为支气管哮喘，静脉滴注地塞米松。

A: 异丙托溴铵

B: 氟替卡松

C: 氨茶碱

D: 特布他林

答案：B

74.NSAID镇痛抗炎的作用机制是

A: 减少前列腺素的释放

B: 抑制环氧酶

C: 对抗前列腺素的作用

D: 抑制MAO

答案：B

75.在使用减毒活流感疫苗后一段时间内不应服用奥司他韦，该时间是

A: 2周内

B: 1周内

C: 3周内

D: 4周内

答案：A

76.属于脂肪酸类抗癫痫药的代表药物是

A: 氯硝西泮

B: 加巴喷丁

C：苯巴比妥

D：丙戊酸钠

答案：D

77.下述药物中，不属于促动力药的是

A：甲氧氯普胺

B：莫沙必利

C：多潘立酮

D：氢氧化铝

答案：D

78.可使前者作用加强或延长的是

A：维生素C

B：他莫昔芬

C：红霉素

D：氯丙嗪

答案：D

79.甲氧苄啶与磺胺合用是因为

A：双重阻断细菌的叶酸代谢

B：相互对抗不良反应

C：减少泌尿道损害

D：抗菌谱相似

答案：A

80.抗心绞痛药物的主要目的是()

A：减慢心率

B：扩张冠状动脉

C：缩小心室容积

D：降低心肌耗氧量

答案：D

81.（2017年真题）可用于吗啡中毒解救的药物是（）

A：阿托品

B：纳洛酮

C：苯甲酸钠咖啡因

D：氟马西尼

答案：B

82.羟甲唑啉滴鼻剂使用期间，可能发生的不良反应是

A：血压下降

B：流量

C：鼻衄

D：心率加快

答案：D

83.青光眼患者应该慎用

A：孟鲁司特

B：噻托溴铵

C：沙美特罗

D：沙丁胺醇

答案：B

84.既能增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素的敏感性的药物是

A：胰岛素

B：氢氧化镁

C：二甲双胍

D：罗格列酮

答案：C

85.抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是

A：定向力障碍

B：血尿酸升高

C：低镁血症

D：血糖升高

答案：C

86.既可用于消化道肿瘤又可用于卵巢癌的药物是

A：利妥昔单抗

B：氟尿嘧啶

C：甲氨蝶呤

D：阿糖胞苷

答案：B

87.连续使用应间隔4h以上

A：赛洛唑啉

B：酚甘油滴耳液

C：麻黄碱

D：羟甲唑啉

答案：D

88.骨髓抑制较严重的是

A：卡铂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/738022027045007022