

2024 年福建省思明区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题完整版附答案【综合题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 弥漫性青铜色色素沉着

- A: 博来霉素
- B: 白消安
- C: 柔红霉素
- D: 氟尿嘧啶

答案：B

2. 口服铁剂宜选用

- A: 3 价铁
- B: 2 价铁
- C: 1 价铁
- D: 4 价铁

答案：B

3. 口服避孕药可能导致

- A: 粪便细胞显微镜检查检出真菌
- B: 血清血红蛋白升高
- C: 血清总胆固醇升高
- D: 血白细胞减少

答案：C

4. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

- A: 医师处方和法定处方
- B: 门诊处方和住院处方
- C: 中药处方和西药处方
- D: 专用处方和普通处方

答案：A

5. 患者，女，77 岁，53kg，既往糖尿病病史 10 年，因“反复尿路感染 4 个月，加重 3 天”来院就诊。4 个月前，患者无明显诱因出现排尿疼痛，间断低热，体温波动在 37.2℃~37.5℃之间，自服左氧氟沙星片 0.29bid 治疗 5 天后好转停药。其间多次反复发作，自服左氧氟沙星片好转。3 天前，患者再次出现尿路刺激症状，自行口服左氧氟沙星 0.29bid 治疗后无明显好转。门诊查尿常规示：白细胞（+++），白细胞计数 463.2 / g1，细菌计数 1262.1 / μl。查体：T37.9℃P86 次 / 分 R21 次 / 分 BP132 / 77mmHg，心、肺听诊无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，左肾区叩击痛（+），双下肢无水肿。辅助检查：血常规：白细胞计数 12.35×10⁹ / L、中性粒细胞百分比 86.5%，CRP69.5mg / L。血生化：AST15U / L，ALT11U / L，ALB43.29 / L，Scr669mol / L。尿培养及药敏试验结果：大肠埃希菌（ESBLs+），细菌计数>10⁵cfu / ml；对左氧氟沙星耐药，对哌拉西林一他唑巴坦、亚胺培南敏感。

- A: 4.5gqd
- B: 1.5gq8h
- C: 4.5gq8h
- D: 1.5gqd

答案：C

6. 经检查，某患者 A/G（白蛋白/球蛋白） <1 ，提示患者可能患有

- A: 慢性肝炎
- B: 胃肠炎
- C: 胰腺炎
- D: 胆囊炎

答案：A

7. 抑制细菌叶酸合成的药物是

- A: 头孢哌酮
- B: 利福喷汀
- C: 头孢米诺
- D: 磺胺嘧啶

答案：D

8. 患者，男，33 岁。中度哮喘急性发作，宜选用的药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 糖皮质激素
- C: β_2 受体阻断剂
- D: 短效 β_2 受体激动剂

答案：D

9. 不宜肌内注射或直接静脉注射，滴注速度过快可出现红人综合征的药物是

- A: 洛铂
- B: 万古霉素
- C: 培氟沙星
- D: 苯妥英钠

答案：B

10. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺（-），双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

- A: 严重高血压
- B: 牙齿肿胀
- C: 膀胱颈梗阻
- D: 血糖升高

答案：A

11. 原发性蛛网膜下腔出血的最常见的病因是

- A: 颅内动脉瘤
- B: 脑血管畸形
- C: 高血压
- D: 动脉硬化

答案：A

12. 静脉滴注时间应控制在 6h 以上的药物是

- A: 培氟沙星
- B: 万古霉素
- C: 青霉素
- D: 两性霉素 B

答案：D

13. 消化性溃疡抗 H. pylori 的四联疗法正确的是（）

- A: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑
- B: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑
- C: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋
- D: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋

答案：C

14. 对胃肠刺激较小，体内分解为两种解热镇痛药、作用时间长的是

- A: 布洛芬
- B: 阿司匹林
- C: 贝诺酯
- D: 吲哚美辛

答案：C

15. 从饮食、运动上严格管理，最适合于

- A: 骨质疏松
- B: 高血压
- C: 糖尿病
- D: 焦虑障碍

答案：C

16. 合剂的规范书写是

- A: Dil
- B: Liq
- C: Dos
- D: Mist

答案：D

17. 导致 13 万多例横纹肌溶解症患者的是

- A: 加替沙星
- B: 罗非昔布
- C: 阿托伐他汀
- D: 己烯雌酚

答案：C

18. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 感冒清热冲剂
- B: 葡萄糖酸锌口服液
- C: 维生素 C 片
- D: 头孢克洛干混悬剂

答案：D

19. 简化治疗方案是提高患者依从性的有效方法，以下方案中最符合此原则的是

- A: 注射给药方案
- B: 少用药的方案
- C: 使用半衰期较长的药物或缓、控释制剂，每日 1 次给药
- D: 短疗程的方案

答案：C

20. 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒致发热、咽痛、流涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是

- A: 速克感冒片
- B: 复方酚咖伪麻胶囊
- C: 维 C 银翘片

D: 速感宁胶囊

答案: B

21. (2019 年真题) 下列药物中，使用前无需皮试的是

A: 苄星青霉素注射剂

B: 抗狂犬病血清注射剂

C: 紫杉醇注射剂

D: 抑肽酶注射剂

答案: C

22. 适用于年轻、震颤明显患者的是

A: 恩托卡朋

B: 左旋多巴

C: 司来吉兰

D: 苯海索

答案: D

23. 患者，女，54 岁，诊断为类风湿关节炎 2 年。目前服用甲氨蝶呤 (15mg, qw) 和塞来昔布 (200mg, qd)。患者因担心药物不良反应，用药不规律，时断时续。近几日出现腕关节肿胀和疼痛加重，晨僵明显，加用泼尼松 10mg, qd。

A: 早期治疗. 遵医嘱规律用药

B: 定期就诊，评估病情，调整治疗方案

C: 预防骨质疏松

D: 多晒太阳. 适量补充钙剂、维生

答案: B

24. 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是（）

- A: 利巴韦林
- B: 奥司他韦
- C: 金刚烷胺
- D: 金刚乙胺

答案：B

25. 磷化锌经口中毒的典型临床表现是

- A: 呕吐物有蒜臭味
- B: 口内有金属味
- C: 腐蚀性口腔炎
- D: 抽搐

答案：A

26. 用药后 2 小时内尽量不排尿或局部冲洗的剂型是

- A: 舌下片
- B: 阴道栓
- C: 咀嚼片
- D: 泡腾片

答案：B

27. 一级信息资料的最突出优点是

- A: 内容广泛、使用方便
- B: 提供的信息丰富、详实
- C: 读者可以自己 对文献进行评价，免受他人观点的影响
- D: 查阅时需要利用所提供的参考文献去验证

答案：C

28. 所有病情稳定并无禁忌证的心功能不全患者一经诊断均应立即使用

A: 坎地沙坦

B: 卡托普利

C: 地高辛

D: 美托洛尔

答案：D

29. 因体内肝酶不足，易发生灰婴综合征

A: 庆大霉素

B: 米诺环素

C: 氯霉素

D: 阿奇霉素

答案：C

30. 患者，女，实验室检查：血红蛋白 95g / L。临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片。下列向患者交代的用药注意事项，错误的是

A: 不宜同时进食牛奶和蛋类

B: 宜空腹服用

C: 宜同时补充维生素 C 或稀盐酸

D: 不宜与钙剂同时服用

答案：B

31. 属于肠道促分泌剂，增加肠液分泌而保持血清电解质水平，促进肠道运动，可显著增加 IBS 患者自主排便频率并改善腹痛症状，美国 FDA 批准用于 18 岁以上女性便秘型 IBS 患者的药物是

A: 洛哌丁胺

B: 鲁比前列酮

C: 西托溴铵

D: 曲美布汀

答案: B

32. pH 碱性的感染尿液常见

A: 尿酸盐结晶

B: 磷酸盐结晶

C: 草酸盐结晶

D: 酪氨酸和亮氨酸结晶

答案: B

33. 与环丙沙星有相互作用合并使用应做血液浓度监测的药物是

A: 沙丁胺醇气雾剂

B: 茶碱片

C: 异丙托溴铵气雾剂

D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案: B

34. 药学服务的最基本的要素是

A: 用药指导

B: 与药物有关的服务

C: 药学知识

D: 调配

答案: B

35. (2021 年真题) 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/mr，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 颠茄片
- B: 吗啡控释片
- C: 双氯芬酸钠缓释片
- D: 加巴喷丁胶囊

答案：C

36. 肿瘤患者在化疗后出现痛性黏膜炎，可对症给予

- A: 醋酸甲地孕酮—地塞米松
- B: 吗啡
- C: 劳拉西泮
- D: 苯海拉明—利多卡因—氢氧化镁铝

答案：D

37. 最有可能确认患者用药伤害事件的方法是

- A: 病历审查
- B: 直接观察
- C: 岗位工作问责
- D: 计算机检测方法

答案：A

38. (2017 年真题) 高脂饮食可促进其吸收的药物是 ()

- A: 左旋多巴片
- B: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊
- C: 非洛地平片
- D: 维 A 酸片

答案：D

39. 开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏证、禁忌证和药物相互作用等方面信息，归属

- A: 科学发展
- B: 环境与流程的优化与持续改进
- C: 知识培训
- D: 管理规范到位

答案：B

40. 人的体重指数（BMI）=体重（kg） / 身高的平方（m²），中国人根据 BMI 值判断肥胖的标准是

- A: <18.5
- B: 18.5~23.9
- C: ≥28
- D: ≥26

答案：C

41. 早晨因咳嗽和打喷嚏引起的头痛，提示可能是

- A: 脑血管意外
- B: 脑肿瘤
- C: 动脉瘤
- D: 脑膜炎

答案：B

42. 中毒时可采用催吐处理方法的患者

- A: 昏迷状态病人
- B: 孕妇患者

C: 中毒引起抽搐，惊厥被控制之后的清醒病人

D: 患有严重心脏病的患者

答案：C

43. (2017 年真题) 抗结核联合治疗方案中, 可引起球后视神经炎不良反应的药物是 ()

A: 利福平

B: 吡嗪酰胺

C: 乙胺丁醇

D: 左氧氟沙星

答案：C

44. 下列药物在服用时宜多喝水的是

A: 硝酸甘油

B: 利胆药

C: 去氨加压素

D: 止咳糖浆

答案：B

45. 在治疗蛔虫病的药物中, 可能引起"蛔虫游走而口吐蛔虫"的是

A: 噻嘧啶

B: 枸橼酸哌嗪

C: 甲苯咪唑

D: 三苯双脒

答案：C

46. (2019 年真题) 患者向药师咨询, 停用口服避孕药后多久可备孕。下列答复中, 正确的是

- A: 复方短效口服避孕药停药 6 个月后方可备孕
- B: 长效避孕药停药后即可备孕
- C: 复方短效口服避孕药停药后即可备孕
- D: 复方短效口服避孕药停药 3 个月后方可备孕

答案：C

47. 卡托普利主要通过下列哪项而起抗慢性心功能不全的作用

- A: 利尿降压
- B: 抑制血管紧张素转化酶
- C: 扩张血管
- D: 拮抗钙

答案：B

48. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 药物制剂因素
- B: 药物的使用
- C: 药理作用
- D: 药动学相互作用

答案：A

49. 对于尿液的描述正确的是

- A: 正常人的新鲜尿液呈弱碱性
- B: 正常人每日排出尿液 1~2L，其中 50%为水分
- C: 尿量的多少主要取决于肾小球滤过率和肾小管的重吸收
- D: 正常人的尿量变化幅度不大

答案：C

50. 慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是()

- A: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素
- B: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- C: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- D: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

答案：A

51. (解救常见毒物中毒的催吐措施)，可用口服吐根糖浆 15ml、饮水 500ml 催吐解救的中毒是

- A: 丙戊酸钠中毒
- B: 三唑仑中毒
- C: 丙米嗪中毒
- D: 磷化锌中毒

答案：C

52. 患者女 58 岁，有 2 型糖尿病史，因头疼、头晕就诊，体征和实验室检查，餐前血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 8.8%，血压 166/96mmHg，蛋白尿>1g/24h，推荐在降糖的基础上，合并选用

- A: 特拉唑嗪
- B: 赖诺普利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 二甲双胍

答案：B

53. 长期精神紧张性头痛，推荐应用的药物是

- A: 谷维素
- B: 地西泮
- C: 罗通定
- D: 阿司匹林

答案：B

54. 患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid，甲硝唑片 0.4gbid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

- A: 维生素 B2 缺乏
- B: 维生素 B12 缺乏
- C: 维生素 A 缺乏
- D: 维生素 B6 缺乏

答案：B

55. 荨麻疹患者常出现

- A: 血红蛋白减少
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 血小板计数增高

答案：B

56. 不宜咀嚼或吞服，以免影响药物剂型设计目的是

- A: 粉剂
- B: 胶囊剂
- C: 糖浆剂
- D: 舌下片

答案：D

57. 水杨酸、萘甲唑啉等局部用药可引起中毒，即

- A: 药物代谢
- B: 药物吸收
- C: 药物中毒
- D: 药物分布

答案：B

58. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用

- A: 3%过氧化氢溶液
- B: 3%酚甘油滴耳液
- C: 2%酚甘油滴耳液
- D: 2%过氧化氢溶液

答案：C

59. 以下药物中，妊娠妇女使用可能引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

- A: 苯妥英钠
- B: 辛伐他汀
- C: 甲氨蝶呤
- D: 沙立度胺

答案：D

60. 易经乳汁分泌的药物特性是

- A: 弱酸性
- B: 脂溶性高
- C: 蛋白结合率高
- D: 分子量大

答案：B

61. 处置蛇类咬伤的重要措施是防止毒液的扩散和吸收，最先实施的应急措施是

- A: 抽吸伤口内的毒液
- B: 用绳索、布带将伤口的近心端的 5cm 处捆住
- C: 在伤口上做多个"十"字小切口
- D: 用器械取出残留的毒蛇牙

答案：B

62. 属于 COMT 抑制剂的是

- A: 司来吉兰
- B: 苯海索
- C: 恩托卡朋
- D: 普拉克索

答案：C

63. 用于治疗苯二氮?类药物中毒的特殊解毒剂是

- A: 青霉胺
- B: 纳洛酮
- C: 乙酰胺
- D: 氟马西尼

答案：D

64. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

- A: 胰酶片
- B: 莫沙必利

C: 复方阿嗟米特肠溶片

D: 雷尼替丁

答案: D

65. (2015 年真题) 观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是 ()。

A: IV 期临床试验

B: II 期临床试验

C: I 期临床试验

D: III 期临床试验

答案: C

66. 妊娠后期长期使用，可导致胎儿严重出血，甚至死胎的药物是

A: 叶酸拮抗剂

B: 阿司匹林

C: 沙利度胺

D: 雌孕激素、雄激素

答案: B

67. 根据体重计算婴幼儿的剂量时注

A: 应减少用量

B: 可适当调整

C: 不可调整

D: 选用剂量的上限

答案: D

68. 患者，男，60 岁，身高 170cm，体重 85kg。既往有伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、糖尿病、高脂血症及心肌梗死病史。近日因夜间咳嗽并伴有粉红色泡沫样痰就诊。查体：心率 100 次 / 分、血压 160 / 100mmHg，血总胆固醇及三酰甘油均高于正常。诊断：伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、心力衰竭。

A: 140 / 90mmHg

B: 130 / 80mmHg

C: 150 / 100mmHg

D: 140 / 80mmHg

答案：B

69. 服用地西泮等苯二氮

A: 浓茶

B: 烟

C: 酒

D: 咖啡

答案：B

70. 中成药麻杏止咳片具有镇咳、祛痰、平喘的功效，与其合用可增加对心脏的毒性，引起心律失常的药物是。

A: 复方利血平

B: 地高辛

C: 甲氧氯普胺

D: 氯苯那敏

答案：B

71. 振奋精神增加供氧能力的兴奋剂是

A: 甲睾酮

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 阿托品

C: 呋塞米

D: 苯丙胺

答案：D

72. 主要用于哮喘合并慢阻肺以及慢阻肺长期治疗的药品是

A: 异丙托溴铵

B: 氨茶碱

C: 噻托溴铵

D: 孟鲁司特

答案：C

73. 为了避免夜间排便，泻药硫酸镁应该

A: 清晨服用

B: 餐后服用

C: 睡前服用

D: 餐前服用

答案：A

74. 《中国药典》2015 年版分为几部

A: 四部

B: 二部

C: 一部

D: 三部

答案：A

75. 洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀等他汀类所致的药源性损伤为

A: 胃肠道损害

B: 肺损害

C: 肾损害

D: 肝损害

答案：D

76. 观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是

A: III期临床试验

B: IV期临床试验

C: II期临床试验

D: I期临床试验

答案：D

77. 苯丙酸诺龙属于哪一类兴奋剂

A: 利尿剂

B: 精神刺激剂

C: 蛋白同化激素

D: β 受体阻断剂

答案：C

78. 患者，男，66岁，身高170cm，体重85kg，以“头晕、胸闷、乏力1周”为主诉入院治疗。空腹血糖11.2mmol/L，餐后血糖16.5mmol/L。诊断结果：2型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍0.5gbid、消渴丸10丸（规格30g/120丸）bid、罗格列酮4mgqd治疗。

A: 硝苯地平控释片

B: 阿司匹林肠溶片

C: 消渴丸

D: 罗格列酮片

答案：D

79. 患者，女性，25 岁，因面色苍白、头晕、乏力 1 年余，加重伴心悸 1 个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

- A: 右旋糖酐铁
- B: 琥珀酸亚铁
- C: 葡萄糖酸亚铁
- D: 叶酸

答案：D

80. 人体的生物钟规律即指在人体内调控某些生化、生理和行为现象有节奏地出现的生理机制，很多药物的作用和毒性、不良反应与人体的生物节律(生物钟)有着极其密切的关系，同一种药物在同等剂量可因给药时间不同而产生不同的作用和疗效。

- A: 清晨服用利尿药
- B: 睡前服用助眠药
- C: 清晨服用泼尼松
- D: 清晨服用驱虫药

答案：C

81. 服用保泰松、水杨酸钠可呈现

- A: 白陶土便
- B: 红至黑色
- C: 橘红至红色
- D: 黄色

答案：B

82. 弥漫性青铜色色素沉着

- A: 氟尿嘧啶

B: 柔红霉素

C: 白消胺

D: 博来霉素

答案: C

83. 成人血小板计数正常参考区间是

A: $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$

B: $(200 \sim 300) \times 10^9 / L$

C: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$

D: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$

答案: A

84. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是 ()

A: 利托那韦

B: 齐多夫定

C: 依非韦伦

D: 利巴韦林

答案: C

85. 治疗急性腹泻可选用 ()

A: 聚乙醇 4000

B: 莫沙必利

C: 双八面体蒙脱石散

D: 阿苯达唑

答案: C

86. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；可评价为

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/738111136043007022>