

2024 安徽省太湖县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题完整版（综合卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 关于莫西沙星作用特点的说法，错误的是()

- A: 莫西沙星属于浓度依赖型抗菌药物
- B: 莫西沙星组织分布广泛,但不能透过血脑屏障
- C: 莫西沙星可经验性用于社区获得性肺炎的治疗
- D: 莫西沙星抗菌谱广,对常见革兰阴性及革兰阳性菌均具有良好抗菌活性

答案: B

2. 下列关于 IA 类抗心律失常药物的描述，错误的是

- A: 抑制 Na
- B: 延长 APD 和 ERP
- C: 减慢 0 相去极化速度
- D: 降低膜反应性

答案: A

3. 幼儿甲状腺素不足易患

- A: 黏液性水肿
- B: 侏儒症
- C: 单纯性甲状腺肿
- D: 呆小病

答案: D

4. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

- A: 修复消化道黏膜
- B: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动
- C: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素
- D: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能

答案：B

5. (2017 年真题) 可降低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油, 主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是 ()

- A: 阿昔莫司
- B: 利血平
- C: 瑞舒伐他汀
- D: 依折麦布

答案：A

6. 以上药物镇咳作用最弱的是

- A: 可待因
- B: 右美沙芬
- C: 吗啡
- D: 喷托维林

答案：D

7. 癫痫小发作选用

- A: 丙戊酸钠

- B: 乙琥胺
- C: 苯巴比妥
- D: 苯妥英钠

答案：B

8. 为高渗溶液，静脉给药后可提高血浆渗透压的药物是

- A: 甘露醇
- B: 阿米洛利
- C: 甘油果糖
- D: 螺内酯

答案：A

9. 中和胃酸的药物是()

- A: 氢氧化铝
- B: 哌仑西平
- C: 奥美拉唑
- D: 雷尼替丁

答案：A

10. 治疗细菌性结膜炎宜选用

- A: 复方托吡卡胺滴眼液
- B: 碘苷滴眼液
- C: 毛果芸香碱滴眼液
- D: 左氧氟沙星滴眼液

答案：D

11. 氢氯噻嗪的利尿作用部位在()

- A: 集合管

- B: 髓袢升支粗段
- C: 肾小球
- D: 远曲小管初段

答案：D

12. 下列对利奈唑胺药理作用与作用机制的描述，错误的是

- A: 与细菌核糖体 30S 亚单位结合
- B: 与细菌核糖体 50S 亚单位结合
- C: 阻止 70S 起始复合物的形成
- D: 抑制 mRNA 与核糖体连接

答案：A

13. 属于促凝血因子合成药的是

- A: 氨甲环酸
- B: 鱼精蛋白
- C: 酚磺乙胺
- D: 甲萘氢醌

答案：D

14. 磷酸二酯酶III抑制剂是()

- A: 米力农
- B: 依那普利
- C: 多巴酚丁胺
- D: 地高辛

答案：A

15. 乳腺癌患者绝经前、后均可使用的内分泌治疗药是

- A: 他莫昔芬

- B: 氟他胺
- C: 曲妥珠单抗
- D: 阿那曲唑

答案：A

16. 硝酸甘油含服时应尽量采取的姿势为

- A: 平卧位
- B: 立位
- C: 侧卧位
- D: 坐位

答案：D

17. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片 20mg/d 治疗。服药期间应监测血生化指标，其中超过正常值上限 10 倍，应立即停药的指标是()。

- A: Cr
- B: BUN
- C: CK
- D: Hcy

答案：C

18. 糖皮质激素的免疫抑制作用是

- A: 提高中枢神经系统的兴奋性
- B: 提高机体对细菌内毒素的耐受力
- C: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理
- D: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶

答案：C

19. 下列关于利巴韦林作用机制的描述中，不正确的是

- A: 可竞争性抑制 DNA 多聚酶
- B: 破坏病毒复制与传播
- C: 抑制病毒合成酶
- D: 减少病毒核糖核酸和蛋白质合成

答案：A

20. 可用于防治泌尿系统结石的是

- A: 氯化钙
- B: 氯化钠
- C: 氯化钾
- D: 枸橼酸钾

答案：D

21. 适用于哺乳期妇女治疗甲亢的药物是

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 卡比马唑
- C: 碘剂
- D: 甲巯咪唑

答案：A

22. 可增加维生素 B6 经肾排出量的药物是

- A: 乙胺丁醇
- B: 红霉素
- C: 吡嗪酰胺
- D: 异烟肼

答案：D

23. 与核糖体 30S 亚基结合，阻止氨基酰 tR-NA 进入 A 位的抗菌药是

- A: 万古霉素
- B: 氯霉素
- C: 四环素
- D: 青霉素

答案：C

24. 长期大量应用双嘧达莫治疗缺血性心脏病时，可能导致患者缺血加重，甚至病情恶化可能的原因是（）

- A: 双嘧达莫抵抗
- B: 治疗反应变异
- C: 冠状动脉窃血
- D: 抗血小板药物继发失效

答案：C

25. （2016 年真题）抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反应（）

- A: 急性肝衰竭
- B: 肺部纹理加重
- C: 急性肾衰竭
- D: 胰腺坏死

答案：C

26. 作用于远曲小管近端的中效利尿药是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米

D: 氨苯蝶啶

答案：A

27. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

A: 茶碱血药浓度

B: 胸部 CT

C: 血常规

D: 腹部 B 超

答案：A

28. 急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药是()

A: 普萘洛尔

B: 胺碘酮

C: 利多卡因

D: 奎尼丁

答案：C

29. 下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

A: 属于抗动力药

B: 具有吸附、收敛的作用

C: 不良反应少，可用于治疗儿童的急、慢性腹泻

D: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环

答案：A

30. (2019 年真题) 有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是 ()

A: 乙醇

B: 聚氯乙烯

C: 聚乙烯醇蓖麻油

D: 邻苯二甲酸二辛酯

答案：C

31. 奈韦拉平的作用靶点是

A: 神经氨酸酶

B: 脱氧核糖核酸聚合酶

C: HIV-1 反转录酶

D: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

答案：C

32. 下列关于低镁血症的描述，错误的是

A: 抗菌药物可增加镁的排泄

B: 质子泵抑制剂可使镁的排泄增加

C: 质子泵抑制剂可使镁的排泄减少

D: 长期应用胰岛素，可引起镁向细胞内转移而导致低镁血症

答案：C

33. (2016 年真题) 与西地那非协同，可导致严重低血压的药品是

A: 甲睾酮

B: 硝酸甘油

C: 丙酸睾酮

D: 非那雄胺

答案：B

34. 阿托品 2mg 时，表现出的中毒症状为()

A: 心悸、显著的口干、瞳孔扩大，有时出现视物模糊

- B: 轻微的心率减慢，略有口干及少汗
- C: 口干、心率加快、瞳孔轻度散大
- D: 语言不清、烦躁不安、皮肤干燥发热

答案：A

35. 糖皮质激素禁用于胃溃疡患者是因为

- A: 抑制蛋白质合成
- B: 抑制免疫功能，只抗炎不抗菌
- C: 促进胃酸分泌及胃蛋白酶分解
- D: 水钠潴留

答案：C

36. 患者易于配合，多用于重症患者和儿童的是

- A: 气雾剂
- B: 雾化吸入溶液
- C: 干粉吸入方法
- D: 口服制剂

答案：B

37. 属于靶向抗肿瘤药物的是

- A: 紫杉醇
- B: 吉非替尼
- C: 昂丹司琼
- D: 多柔比星

答案：B

38. 阿托品用于全麻前给药的目的是()

- A: 减少呼吸道腺体分泌

B: 减少麻醉药的用量

C: 增强麻醉效果

D: 预防心动过缓

答案: A

39. 精神紧张、情绪恐惧所致的失眠宜选用

A: 氟西泮

B: 氯美扎酮

C: 夸西泮

D: 谷维素

答案: B

40. 通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是

A: 青蒿素

B: 噻嘧啶

C: 氯喹

D: 哌嗪

答案: D

41. 下列硝酸酯药物相互作用中，可以合用的是

A: 与他汀类药物合用

B: 与西地那非合用

C: 与硝普钠合用

D: 与麻黄碱合用

答案: A

42. 长期和较大剂量服用质子泵抑制剂后的潜在风险是

- A: 动脉粥样硬化
- B: 骨质疏松性骨折
- C: 应激性大出血
- D: 血小板减少症

答案：B

43. 对地高辛中毒出现严重心律失常者可静脉滴注

- A: 苯妥英钠
- B: 利尿剂
- C: 阿托品
- D: 氯化钾、葡萄糖注射液

答案：D

44. (2015 年真题) 属于 A 型单胺氧化酶抑制剂的是 ()。

- A: 吗氯贝胺
- B: 阿米替林
- C: 文拉法辛
- D: 氟西汀

答案：A

45. 引起睫状肌麻痹，适用于治疗虹膜睫状体炎、检查眼底前的散瞳、验光配镜屈光度检查的药物是

- A: 奥布卡因
- B: 阿托品
- C: 碘苷
- D: 20%甘露醇

答案：B

46. (2018 年真题) 属于胆固醇吸收抑制剂的调节血脂药是 ()

- A: 依折麦布
- B: 辛伐他汀
- C: 非诺贝特
- D: 烟酸

答案: A

47. 可使呋达帕胺利尿作用增强的是

- A: 拟交感药
- B: 考来烯胺
- C: 胺碘酮
- D: 多巴胺

答案: D

48. 呋塞米与抗组胺药合用时

- A: 引起电解质紊乱的概率增加
- B: 利尿作用减弱
- C: 耳毒性增加
- D: 低氯性碱中毒机会增加

答案: C

49. 治疗心绞痛急性发作的首选药物是 ()

- A: 普萘洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 地尔硫
- D: 硝酸甘油

答案: D

50. 长期大量服用维生素 A 会出现

- A: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- B: 视物模糊、疲乏、乳腺肿大
- C: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- D: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

答案：C

51. 根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

- A: 中午 12 时左右
- B: 晚餐前
- C: 下午 4 时左右
- D: 上午 8 时左右

答案：D

52. 滴药过频易致反跳性鼻充血，久用可致药物性鼻炎

- A: 羟甲唑啉
- B: 过氧化氢
- C: 硼酸
- D: 克罗米通

答案：A

53. 对脑血管扩张作用较强的药物是()

- A: 非洛地平
- B: 尼莫地平
- C: 硝苯地平
- D: 尼索地平

答案：B

54. 西酞普兰抗抑郁的药理作用机制是

- A: 抑制 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取
- B: 抑制 5-羟色胺再摄取
- C: 抑制神经末梢突触前膜 α
- D: 抑制单胺氧化酶

答案：B

55. 可与抗菌药物联合应用的是

- A: 嗜酸乳杆菌
- B: 保加利亚乳杆菌
- C: 地衣芽孢杆菌
- D: 嗜热链球菌

答案：C

56. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC 3.0×10^{12} / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 蓝色
- B: 绿色
- C: 黑色
- D: 红色

答案：C

57. （2018 年真题）在体内不经细胞色素 P450 酶代谢的药物是（）

- A: 氟伐他汀

- B: 普伐他汀
- C: 瑞舒伐他汀
- D: 阿托伐他汀

答案：B

58. 有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是()

- A: 聚氯乙烯
- B: 邻苯二甲酸二辛酯
- C: 聚乙烯醇蓖麻油
- D: 乙醇

答案：C

59. 有激素样作用，长期服用可导致男性乳房发育、阳痿、女性月经失调的是

- A: 乙酰唑胺
- B: 依他尼酸
- C: 氢氯噻嗪
- D: 醛固酮

答案：D

60. 与氨曲南在结构上相似的头孢菌素类药是

- A: 头孢美唑
- B: 头孢他啶
- C: 头孢噻肟
- D: 氨曲南

答案：B

61. 焦虑型、夜间醒来次数较多者

- A: 夸西泮
- B: 氟西泮
- C: 氯美扎酮
- D: 谷维素

答案：B

62. 对钙及骨矿物质具有极强的吸附性，主要分布在骨骼中发挥疗效的药物是()

- A: 氯屈膦酸二钠
- B: 帕米膦酸二钠
- C: 依替膦酸二钠
- D: 阿仑膦酸钠

答案：A

63. 以下避孕药不受月经周期限制的是

- A: 左炔诺孕酮
- B: 孕二烯酮
- C: 去氧孕烯
- D: 双炔失碳酯

答案：D

64. 属于浓度依赖性抗菌药物的是

- A: 氨曲南
- B: 庆大霉素
- C: 拉氧头孢
- D: 头孢西丁

答案：B

65. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: 短效 B₂ 受体激动剂
- C: 吸入性糖皮质激素
- D: 白三烯受体阻断剂

答案：B

66. 已发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁加以预防的抗肿瘤药是

- A: 注射用盐酸博来霉素
- B: 注射用硫酸长春新碱
- C: 注射用柔红霉素
- D: 紫杉醇注射液

答案：D

67. 胰岛素和磺酰脲类药物最常见的共同不良反应是

- A: 胃肠道反应
- B: 低血糖反应
- C: 过敏反应
- D: 肝功能损伤

答案：B

68. 下列选项中，除抑制延髓咳嗽中枢外，还可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，并具有罂粟样平滑肌解痉作用的药物是（）。

- A: 喷托维林
- B: 右美沙芬

C: 苯丙哌林

D: 可待因

答案: C

69. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 吉西他滨

B: 奥沙利铂

C: 泼尼松

D: 顺铂

答案: D

70. (2020 年真题) 使用奥沙利铂后最需要关注的典型不良反应是

A: 肾毒性

B: 消化道反应

C: 肝毒性

D: 神经毒性

答案: D

71. 强心苷中毒引起的室性心律失常，治疗应首选的药物是

A: 普罗帕酮

B: 丙吡胺

C: 苯妥英钠

D: 普萘洛尔

答案: C

72. 异丙托溴铵属于

A: β 肾上腺素受体激动剂

B: M 胆碱受体阻断剂

C: 白三烯调节剂

D: 黄嘌呤类药物

答案: B

73. 能使凝血因子 I 降解为纤维蛋白单体的药物是()

A: 鱼精蛋白

B: 蛇毒血凝酶

C: 甲萘氢醌

D: 卡巴克络

答案: B

74. 小剂量雌激素用于

A: 痛经

B: 再生障碍性贫血

C: 绝经期综合征

D: 回奶

答案: C

75. (2017 年真题) 可能导致牙龈出血的药物是()

A: 普伐他汀

B: 普萘洛尔

C: 拉西地平

D: 依诺肝素

答案: D

76. 中毒后可用等剂量维生素 B

A: 乙胺丁醇

B: 异烟肼

C: 利福平

D: 对氨基水杨酸

答案: B

77. 以下哪个选项不是二磷酸果糖的不良反应

A: 乳酸中毒

B: 尿潜血、血色素尿

C: 低钾血症

D: 低钠及低磷血症

答案: D

78. 壬二酸的抗菌活性和吸收依赖于

A: 剂型

B: pH

C: 浓度

D: 作用面积

答案: B

79. 可加速硝基咪唑类药物清除，使血药浓度下降的是

A: 替硝唑+苯巴比妥

B: 奥硝唑+乙醇

C: 替硝唑+华法林

D: 甲硝唑+乙醇

答案: A

80. 袢利尿药中，最易引起耳毒性，且可发生永久性耳聋的药物是()

A: 依他尼酸

B: 托拉塞米

C: 布美他尼

D: 呋塞米

答案: A

81. 有关可乐定的叙述，错误的是

A: 可乐定可用于治疗高血压危象

B: 可乐定可用于治疗中度高血压

C: 可乐定是中枢性降压药

D: 可乐定可用于治疗重度高血压

答案: D

82. 慢性外耳道炎时局部滴用，促使耳道干燥，可选用

A: 赛洛唑啉

B: 伪麻黄碱

C: 3%硼酸乙醇

D: 2%酚甘油

答案: C

83. 下述可用于治疗甲氨蝶呤引起的巨幼红细胞性贫血的是

A: 叶酸+维生素 B

B: 亚叶酸钙

C: 叶酸

D: 维生素 B

答案: B

84. 可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂

A: 咪康唑

B: 灰黄霉素

C: 克霉唑

D: 环丙沙星

答案: D

85. 可产生 β 拟交感神经效应，刺激黏膜纤毛运动，增强黏膜纤毛清除功能的是

A: 复方薄荷油

B: 西地碘

C: 桃金娘油

D: 羟甲唑啉

答案: C

86. 可预防环磷酰胺所致膀胱毒性的药物是()

A: 维生素

B: 呋塞米

C: 糖皮质激素

D: 美司钠

答案: D

87. 作用机制是有丝分裂抑制剂的是

A: 吉非替尼

B: 枸橼酸他莫昔芬

C: 紫杉醇

D: 巯嘌呤

答案: C

88. 伊伐布雷定发挥作用特异性针对

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 房室传导

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/738133065050007022>