

日照市麻醉学三基考试试题和答案解析

一、选择题

1. 慢支继发下列哪项时，不能用氯胺酮

- A. 大量脓痰
- B. 肺大泡
- C. 肺动脉高压
- D. 支气管痉挛
- E. 肺结核

2. 高渗胶体溶液适用于下述情况，但除外

- A 组织水肿
- B. 高渗性脱水
- C. 长时间的休克
- D. 低渗性脱水
- E. 急性血容量不足

3. 胎儿及新生儿药物代谢特点下列哪项正确

- A. 血脑屏障对药物通透性比成人高
- B. 肾对药物的排泄能力比成人高
- C. 肾对药物的排泄能力与成人相似
- D. 肝脏对药物的解毒功能比成人高
- E. 肝脏对药物的解毒功能比成人低

4. 马来酸麦角新碱应用于下列哪种情况是合适的

- A. 子宫收缩不良引起的产后出血
- B. 催产
- C. 甲亢性心脏病产妇
- D. 伴高血压性心脏病产妇
- E. 妊高征产妇

5. 单侧肺通气较两侧肺通气气量减少

- A. 12%
- B. 17%
- C. 22%
- D. 27%
- E. 32%

6. 麻醉前用药中，麻醉性镇痛药的主要目的是

- A 抑制呼吸道腺体分泌物
- B. 镇痛、镇静
- C. 抑制迷走神经
- D. 维持内环境稳定
- E. 预防呕吐

7. 非紫绀型先心病最常见的形式

- A. 左向右分流伴肺血增加
- B. 左向右分流伴肺血减少

- C. 右向左分流
- D. 右向左分流伴肺血减少
- E. 右向左分流伴肺血增加
8. 有关判断心脏功能不全的严重程度，下列哪种提法正确
- A. 根据病情是急性还是慢性
- B. 由于存在左心或右心衰竭
- C. 根据致病的压力或容量负荷
- D. 根据休息及负荷的情况下感到不适
- E. 以上各项全是错误的
9. 肝移植，供肝的冷缺血时间不宜超过
- A. 2 小时
- B. 4 小时
- C. 6 小时
- D. 8 小时
- E. 10 小时
10. 患者女性， 28 岁。患甲状腺功能亢进。经抗甲状腺药治疗后症状得到控制，决定外科手术，但唯有心率不下降（10 次/min）。宜选下列哪项
- A. 卢戈液
- B. 地西洋
- C. 普萘洛尔十卢戈液
- D. 甲状腺素片
- E. 普萘洛尔
11. Q—T 间期延长综合征患者术前处理最关键的措施
- A. 心电图检查
- B. 充分给予普萘洛尔等 β -受体阻滞药
- C. 充分镇静
- D. 作心功能检查
- E. 术前不宜应用阿托品
12. 1899 年在动物及人做蛛网膜下隙阻滞成功的为
- A. Pravaz
- B. Koller
- C. Bier
- D. Halstead
- E. Freund
13. 下列关于静脉全麻药的描述哪项错误
- A. 氯胺酮具有良好的体表镇痛
- B. 任何一种静脉全麻药均难以单独完成全身麻醉
- C. 静脉全麻药的可控性与吸入麻醉相似
- D. 有癫痫史的病人，麻醉诱导禁用 $r-OH$
- E. 依托咪酯麻醉中有时出现肌震颤
14. 目前心内手术低温技术以下述何者为主
- A. 体表法深低温
- B. 体表降温为主，辅以血流降温

- C. 血流降温为主，辅以体表降温
- D. 完全血流降温
- E. 上述均不是

15. 骶丛的组成是

- A. L4 前支一部分， L5 前支， 骶尾神经前支
- B. L5 前支， 骶尾神经前支
- C. 骶神经前支
- D. 尾神经前支
- E. 以上都不对

16. 口对口吹气法在我国最早记录于

- A. 肘后备急方
- B. 金匱要略方法
- C. 伤寒论
- D. 普救类方
- E. 伤寒杂病论

17. 能生存的最小二尖瓣口面积是

- A 2. 6cm2
 - B 1. 1 ~1. 5cm2
 - C 1. 0cm2
 - D 0. 3~ 0. 4cm2
 - E 0. 1~0. 2cm2

18. 紫绀性心脏病术中出现低氧血症的主要原因

- A. 外周血管阻力过高
- B. 通气不足
- C. 支气管痉挛
- D. 心衰加重
- E. 右室流出道痉挛或外周血管阻力降低

19. 硬膜上穿刺孔的愈合时间，哪项正确

- A. 8 小时
- B. 24 小时
- C. 72 小时
- D. 1 — 2 周
- E. 3 周以上

20. 肥胖患者麻醉诱导后气管插管时的无呼吸时间应控制在

- A. 1 分钟以内
- B. 2 分钟以内
- C. 3 分钟以内
- D. 4 分钟以内
- E. 5 分钟以内

21 . 老年人心率失常发生率随年龄增加而增加，最多见

- A. 室性早搏
- B. 室上性早搏
- C. 房性早搏

- D. 短阵室速
 - E. 室上性心动过速
22. 心肺联合移植供体肺动脉开放前应先
- A. 静注正性肌力药物
 - B. 静注前列腺素 E1
 - C. 静注硝酸甘油
 - D. 静滴硝普钠
 - E. 静注甲基泼尼松龙
23. 甲亢患者不宜使用下列哪种药物
- A. 复方碘溶液
 - B. 利血平
 - C. 他巴唑
 - D. 阿托品
 - E. 普萘洛尔
24. 急性坏死性胰腺炎下列哪一项症状不会出现
- A. 高钙血症
 - B. 低钙血症
 - C. 心肌抑制
 - D. 肺间质水肿
 - E. ARDS
25. 从麻醉角度衡量甲亢最危险的并发症是
- A. 动脉粥样硬化
 - B. 心动过速
 - C. 心功能代偿不全
 - D. 代谢增高
 - E. 心律不齐。
26. HPV 的重要意义在于
- A. 肺内分流增加，加重低氧血症
 - B. 肺内分流增加，减轻低氧血症
 - C. 肺内分流减少，减轻低氧血症
 - D. 肺内分流减少，加重低氧血症
 - E. 肺血管扩张，肺血流量增加
27. 肌松药的血浆清除率随年龄增长而改变，但不包括
- A. 阿曲库铵
 - B. 维库溴铵
 - C. 筒箭毒碱
 - D. 泮库溴铵
 - E. 二甲基筒箭毒碱
28. 下列有关麻醉前用药的叙述中哪项是正确的
- A. 对并发发热、脱水、心动过速、甲亢的病人多应用阿托品
 - B. 支气管哮喘病人术前药应以吗啡为首选药
 - C. 对血卟啉症病人术前可安全使用巴比妥类药物
 - D. 对老年或有疼痛的病人多使用东莨菪碱

E. 休克病人麻醉前用药除需吗啡类药物止痛外，多经静脉给予阿托品 29. 低温有以下特点，但除外

- A. 耗氧量随体温的下降而降低
- B. 增加心脏工作负担
- C. 对血液产生抗凝效果
- D. 减少麻醉药用量
- E. 抑制酶的活化及细菌的活动

30. 以下是休克的错误认识，哪项除外

- A. 休克就是动脉压下降
- B. 休克就是心排血量降低
- C. 休克是组织灌注不足，组织缺氧
- D. 休克就是心力衰竭
- E. 休克是受打击后意识丧失

31. 有关全氟碳溶液的特点，哪项错误

- A. 是另一种携氧血液代用品，运送氧和二氧化碳的方式与无基质血红蛋白溶液类似
- B. 可明显降低血液粘度，改善微循环
- C. 对免疫功能有一过性抑制作用
- D. 氧离解曲线为线性关系，因此需较高的吸入气氧分压才能携带足够的氧
- E. 一般输注量为 500ml，最大量不超过 1000ml

32. 正常人取 45° 头低斜坡位时，心脏循环可出现下列哪一项变化

- A. 心率减慢，静脉压升高，脑血流减少
- B. 心率增快，静脉压增高，舒张压上升
- C. 心脏容积增大，收缩压下降，脑静脉压下降
- D. 动静脉血氧差减少，静脉压增高，脑血流增加
- E. 心率增快，心输出量下降，静脉压升高

33. 哪种胶体与血混合输注时，最可能引起凝血

- A. 羟乙基淀粉
- B. 中分子右旋糖酐
- C. 低分子右旋糖酐
- D. 琥珀明胶

34. 全麻恢复期病人血压偏低最常见的原因是

- A. 血容量不足
- B. 心率失常
- C. 心肌功能受抑制
- D. 麻醉药的抑制作用
- E. 外周阻力下降

35. 陈旧性心肌梗死患者并发心绞痛，拟行腹股沟疝修补术，哪种麻醉方式不妥

- A. 局麻
- B. 静脉麻醉
- C. 吸入麻醉
- D. 复合全麻
- E. 脊麻

36. 理论上维持组织血流灌注的最低动脉平均压是

- A. 72mmHg
- B. 62mmHg

C. 52mmHg

D. 42mmHg

E. 32mmHg 37. 脊麻后最常见的并发症是

A 腰背痛

B. 头痛

C. 颅内感染

D. 虚性脑膜炎

E. 马尾综合征

38. 正常小儿代谢率在什么年龄组最高

A. 1~2 岁

B. 5~6 岁

C. 8~ 9 岁

D. 10 ~ 12 岁

E. 13 ~ 14 岁

39. C4 支配的皮肤区域与以下哪一神经支配的区域相邻

A 枕下神经

B. C5 神经

C. T1 神经

D. T2 神经

E. 面神经

40. 快诱导气管插管时静注利多卡因之主要目的

A. 抑制心率升高

B. 抑制血压升高

C. 抑制颅内压升高

D. 抑制呛咳反应

E. 抑制注药部位血管痉挛

41 . 小儿臂丛神经阻滞 1 %的利多卡因，按容积计

A. 0. 3ml/kg

B. 0. 4ml/kg

C. 0. 5ml/kg

D. 0. 8ml/kg

E. 1 . 2ml/kg 42. 认为全麻药进入脑组织后形成以麻药分子为中心的拢合物，干扰了膜表面的电外传导或突触部位的

冲动传递，而产生全麻效应。此为下列哪种学说

A 脂溶性学说

B. 亲水区作用学说

C. 自由能吸附理论

D. 临界容积学说

E 多部位膨胀学说 43. 1 847 年在英国首先将氯仿用于外科手术者是

A. Snow

B. Leilig

C. Sinposon

D. Jiuporob

- E. **Morton 44.** 老年人术后肺并发症哪项错误
- A 精心护理可减少肺并发症
- B. 非全麻可完全避免肺并发症
- C. 注意排痰
- D. 加强抗炎
- E. 可适当的吸氧

45. 新生儿复苏最适宜的环境温度

- A. 26 C
- B. 28 C
- C. 30 C
- D. 34 C
- E. 36 C

46 . 正常 新生儿自主呼吸出现在生后哪一时间

- A. 生后 1 分钟内
- B. 生后 1 分半钟
- C. 生后 2 分钟
- D. 生后 2 分半钟
- E. 生后 3 分钟

47. 小儿收缩压，按年龄计算是

- A. 年龄（岁） $X4+40$ （ mmH） g
- B. 年龄（岁） $X2+80$ （ mmH） g
- C. 年龄（岁） $X6+20$ （ mmH） s
- D. 年龄（岁） $X4+20$ （ mmH） g
- E. 年龄（岁） $X2+40$ （ mmH） g

48. 下列哪项是 **COPDF** 高发人群

- A. 过敏体质
- B. 有胸部手术史
- C. 有吸烟和 **COPD** 家族史
- D. 有高血压病史
- E. 有慢性咽炎史

49. 麻醉前用药中，使用麻醉性镇痛药的主要目的是

- A. 减弱迷走神经反射
- B. 镇静
- C. 抑制呼吸道腺体分泌
- D. 稳定内环境
- E. 预防呕吐

50. 老年人用麻醉药应适当减量的原因除外

- A. 药物与血浆蛋白的结合下降
- B. 机体脂肪百分比降低
- C. 血容量相对减少
- D. 血浆蛋白浓度减少
- E. 脑血流量降低

51. 主动脉瓣关闭不全诱导时最不合适的药物是

- A. 咪达唑仑

- B. 泮库溴铵
- C. 依托咪酯
- D. 芬太尼
- E. 艾司洛尔

52. 关于麻醉前用药的药理作用，以下叙述哪项正确

- A. 催眠剂量巴比妥类药可产生遗忘和镇静作用
- B. 哌替啶有时可出现“遗忘”呼吸现象
- C. 地西洋可产生解除恐惧、引导睡眠和遗忘作用
- D. 阿托品不能直接兴奋呼吸中枢
- E. 东莨菪碱不产生镇静和遗忘作用

53. 首先证明硬膜外麻醉的是

- A. Wood
- B. Corning
- C. Koller
- D. Bier
- E. Halstead

54. 小儿血容量的估计，以下哪项是最接近

- A. 70ml/kg
- B. 80ml/kg
- C. 90ml/kg
- D. 95ml/kg
- E. 100ml/kg

55. 蛛网膜下腔阻滞用于老年人，说法不正确的是

- A. 效果确切完善
- B. 易发生低血压
- C. 作用时间延长
- D. 起效慢
- E. 范围广

56. 高原红细胞增多症的诊断依据除外

- A. 红细胞增多》6. $51 \times 10^9/L$ ，血红蛋白》20g/L
- B. 血粘度比正常增高4—5倍
- C. 病人的臂—脑循环时间缩短
- D. 血氧饱和度降到60%左右
- E. 红细胞比积》0.65

57. 气管、支气管镜检查的麻醉中哪项错误

- A. 无论局麻或全麻都应给术前药
- B. 充分表麻
- C. 一旦出现严重缺氧，即刻退出支气管镜，口罩给氧
- D. 注意保持呼吸道通畅
- E. 常用喷射呼吸机维持通气

58. 芬太尼与吗啡不同之处在于

- A. 应用同效镇痛剂量时，抑制呼吸的作用较弱.
- B. 不会引起“胸廓木僵”（wooden chest）征

- C. 释放组织胺的作用较弱
 - D. 应用同效镇痛剂量时，对心血管抑制作用较强
 - E. 作用时间比吗啡长
59. 现已少用六甲溴铵单独实施控制性降压，原因不包括
- A. 单用六甲溴铵难获满意降压效果
 - B. 可能会出现难以控制的低血压
 - C. 作用时间长，血压难以调节控制
 - D. 副作用及不良反应多
 - E. 特别不适用于老年人和血管硬化病人
60. 对心衰病人施行择期手术，最好使心衰控制
- A. 3d 以后
 - B. 1 周以后
 - C. 2 周以后
 - D. 3~4 周以后
 - E. 1 个月以后
61. 老年病人硫喷妥钠静脉诱导易引起过量的原因主要是
- A. 血浆白蛋白减少
 - B. 体内脂肪量减少
 - C. 细胞外液量减少
 - D. 细胞内液量减少
 - E. 血容量减少
62. 使气管环和气管粘膜毛细血管血流开始中断的气管套囊压为
- A. 15mmHg
 - B. 20mmHg
 - C. 25mmHg
 - D. 28mmHg
 - E. 32mmHg
63. 60kg 病人 CABG 手术，体外循环期间 ACT460 秒报警，应追加肝素
- A. 1000~ 2000u
 - B. 2100~ 4000u
 - C. 4100~ 8000u
 - D. 8100~ 12000u
 - E. 12100~ 15000u
64. 麻醉状态下监测体温最适用的体温计
- A. 深部体温计
 - B. 零梯度耳温度计
 - C. 液晶温度计
 - D. 电阻温度计
 - E. 温差电偶温度计
65. 关于高血压病以下哪项说法错误
- A. 高血压病人常有血容量减少
 - B. 死亡的主要原因是脑血管意外
 - C. 眼底变化可反映高血压病的严重程度

D. 90%为原发性高血压

E. 血压越高，麻醉风险越小

66. 门诊手术麻醉下述哪项正确

A. 为防止患者紧张，强调镇静剂的使用

B. 麻醉前常规应用阿托品

C. 一般不用麻醉性镇痛药

D. 无需常规禁食水

E. 麻醉前用药以肌注或静注为宜

67. 关于门诊手术麻醉后的恶心和呕吐，不恰当的是

A. 是最常见的并发症

B. 小儿多于成人

C. 小儿必须待呕吐停止后方可离院

D. 术前用麻醉性镇痛药者更易发生

E. 与麻醉时间长短无关。

68. 全麻药蛋白质作用假说中，下述哪项是错误的

A. 全麻药与蛋白质氨基酸残基结合

B. 全麻药作用在蛋白质结构的疏水区

C. 全麻药与通道蛋白结合

D. 全麻药作用在周围基质间接影响蛋白质功能

E. 全麻药影响蛋白质的三级结构

69. 先心病小儿术前准备和用药哪项不对

，术前半小时肌注 A. > 1 岁儿童，吗啡 0. 1mg/kg，东莨菪碱 0. 1mg/kg

B. < 1 岁婴幼儿，吗啡应减半量

C. 极严重病例可省略术前用药

D. 术前 8~4 小时可给清流质

E 有紫绀缺氧危象史患儿给药后可取蹲踞位

70. 上腹腔手术操作易引起血压下降主要是因为

A. 迷走神经反射

B. 腹腔神经丛反射

C. 动脉丛反射

D. 膈神经反射

E. 交感神经反射

71 . 支气管镜检时必须避免

A. 浅麻醉、心动过速

B. 深麻醉、心动过缓

C. 恶心、呕吐

D. 缺氧、支气管痉挛

E. 过度换气

72. 全身麻醉的分期和各期不同体征是谁首先提出的

A. Guedel

B. Wesley Bourne

C. Magill

D. hundy

E. JohnSnow

73. 下列哪项不是静脉全麻的优点

- A. 对呼吸道无刺激
- B. 不燃烧，不爆炸
- C. 可控性好
- D. 操作简单
- E. 病人舒适

74. 颈丛阻滞患者出现声音嘶哑或失音，最可能的原因是

- A. 药液误入硬脊膜外腔间隙
- B. 局麻药的毒性作用
- C. 膈神经阻滞
- D. 迷走神经阻滞
- E. 星状神经节阻滞

75. 对于氟芬合剂，下列哪项叙述错误

- A. 能加强吸入麻醉药的镇痛作用
- B. 能加强巴比妥类的中枢抑制作用
- C. 术后病人安静，无锥体外系并发症
- D. 具有一定的抗心律失常作用
- E. 具有较好的镇吐作用

76. 下列哪种说法不对

- A. 麻醉科是一级临床科室
- B. 麻醉医生是临床医生
- C. 麻醉医生有诊断、治疗和处方权
- D. 医科院校毕业生进入麻醉科即称为麻醉医师
- E. 麻醉科是边缘学科

77. 下列哪种因素与血液流变无关

- A. 血流速度
- B. 红细胞比积
- C. 血浆粘度
- D. 除血浆渗透压
- E. 允许单个红细胞通过内径小于红细胞的营养毛细血管

78. 单侧肺通气的绝对适应证除外

- A. 支气管胸膜瘘
- B. 肺脓疡
- C. 大咯血
- D. 胸主动脉瘤
- E. 单侧支气管肺灌洗

79. 下列关于心电图的叙述，哪项错误

- A. 心房兴奋产生 P 波
- B. P-R 间期为 0. 12~0. 20 秒
- C. QRS 间期不应超过 0. 1 秒
- D. P-R 间期反应希氏束的传导时间
- E. T 波在心室收缩时出现

80. 关于颈丛阻滞，哪项叙述错误
- A. 肌间沟内注射局麻药，可同时阻滞颈丛及臂丛神经
 - B. 颈丛阻滞时，C4 横突定位方法为乳头与胸锁乳头肌胸骨头连线中点
 - C. 颈丛为感觉神经，臂丛为混合神经
 - D. 颈深丛阻滞时局麻药应注射在横突附近，颈浅丛阻滞注射于皮下、颈阔肌筋膜下
 - E. 颈丛阻滞可出现阻滞侧面红无汗现象

81. 氧自由基对细胞的损害是通过

- A. 开放钙通道
- B. 使钠一钾 ATP 酶活性增强
- C. 直接的毛细血管收缩作用
- D. 抑制前列腺合成
- E. 使生物膜脂质过氧化

82. 除下列哪项外均可作为判断复合麻醉深度变浅的指标

- A. 瞳孔逐渐变大
- B. 角膜反射存在，眼球不固定
- C. 心率逐渐变快
- D. 眼眶中含有泪珠
- E. 血压较基值高 20~40mmHg

83. 吸入麻醉深度主要取决于

- A. 呼吸频率
- B. 麻醉药效能
- C. 病人年龄
- D. 脑内药物浓度
- E. 心输出量

84. 妇科手术麻醉前宜使血红蛋白高于二

- A. 6g/100ml
- B. 7g/100ml
- C. 8g/100ml
- D. 9g/100ml
- E. 10g/100ml

85. 孕期母体储存能量的主要方式是

- A. 糖原储存
- B. 维生素储存
- C. 脂肪储存
- D. 蛋白质
- E. 胆固醇储存

86. 下述导致体温降低因素中哪项易导致心律失常

- A. 寒冷环境中碘酊、酒精消毒胸前皮肤
- B. 术野及体腔长时间暴露在寒冷环境中
- C. 快速输入 4℃ 库血
- D. 冷液体冲洗腹腔
- E. 用寒冷的气体通气

87. 普鲁卡因静脉复合麻醉时成年人普鲁卡因第 1 小时用量应为

- A. 3-4g

- B. 1-2g
- C. 2-3g
- D. 3. 5-4. 5g
- E. 0. 5-1. 5g
88. 全麻后（非气管插管时）哪一种体位最为安全
- A. 俯卧位
- B. 俯卧位床尾抬高
- C. 仰卧位
- D. 侧卧位床尾抬高
- E. 头抬高的仰卧位
89. 无痛分娩采取下列方法，哪项错误
- A. 吸入氧化亚氮
- B. 硬膜外阻滞
- C. 骶管阻滞
- D. PCA 泵
- E. 肌注硫喷妥钠
90. 老年人术前准备，哪项处理不恰当
- A. 因进食不足引起的脱水可不必处理
- B. 血浆蛋白低者补给血浆或白蛋白
- C. 纠正水电解质紊乱
- D. 贫血者给予输血
- E. 临床常见低血钾，应注意纠正
91. 胆心反射不会引起
- A. 冠状动脉痉挛
- B. 心率减慢
- C. 心律失常
- D. 血压下降
- E. 血压上升
92. 有关抗胆碱药，下列哪项叙述是错误的
- A. 各种抗胆碱药都有减少唾液分泌的效应
- B. 近年来术前应用抗胆碱药病例日见减少
- C. 抗胆碱药能预防胃酸误吸危害的效应
- D. 胃长宁引起心动过速、发热和面红等副作用比阿托品轻
- E. 东莨菪碱更适用于心内直视手术的术前用药
93. 妇科手术常选用的麻醉方法
- A. 针刺麻醉
- B. 腰麻
- C. 局麻
- D. 连续硬膜外麻醉
- E. 气管插管全麻
94. 能被胎盘水解的局麻药是
- A. 丁卡因
- B. 利多卡因
- C. 布比卡因
- D. 卡波卡因
- E. 依替卡因

95. 肾移植麻醉，选用局麻药时应避免

- A. 酰胺类局麻药
- B. 酯类局麻药
- C. 加用肾上腺素
- D. 短效局麻药
- E. 长效局麻药

96. 高原气候对人体的影响，下述哪项正确

- A. 肾血流量增加
- B. 久居高原者，胃排空时间缩短
- C. 氧解离曲线左移
- D. 内分泌激素分泌量增加
- E. 高原低氧不会影响视力

97. 对于冠心病病人围术期的监测，下列哪个指标能更敏感地反映心肌缺血

- A. 心率收缩压的乘积
- B. 心率、收缩压、PCWf 三者的乘积
- C. 食管超声
- D. 平均动脉压与心率的比值
- E. 心电图

98. LMA 较早在哪个国家应用较多

- A. 美国
- B. 英国
- C. 日本
- D. 中国
- E. 德国

99. 下列哪项不是胃肠道手术麻醉应该注意的事项

- A. 低蛋白血症
- B. 贫血
- C. 水电解质平衡紊乱
- D. 呕吐、误吸
- E. 家族史

100. 缩窄性心包炎病人的麻醉前准备哪项不对

- A. 静脉补充白蛋白和全血
- B. 尽快抽尽胸水
- C. 给予利尿药
- D. 尽量抽尽腹水
- E. 注意血钾的平衡

101. 下列哪项不属喉罩的并发症

- A. 喉痉挛
- B. 反流和误吸
- C. 呼吸道梗阻
- D. 呼吸停止
- E. 术后咽喉痛

102. 关于先天性心脏病以下何者错误

- A. 通常分为充血性和紫绀性两大类
- B. 室间隔缺损、主动脉或二尖瓣狭窄等属于充血性心脏病
- C. 法洛四联症、肺动脉狭窄及大动脉转位等属于紫绀性心脏病
- D. 紫绀性心脏病患者肺血流不足
- E. 充血性心脏病也可在生后 1~2 个月出现充血性心衰

103. 在防止麻醉意外方面，最有意义的监测项目是

- A. 脉搏氧饱和度和呼气末二氧化碳监测
- B. 无创血压和 ECG 监测
- C. 呼吸器报警和吸入氧浓度监测
- D. 潮气量和气道压监测
- E. 体温和电解质监测

104. 2 号喉罩适用于

- A. 学龄前儿童
- B. 8~12 岁儿童
- C. 3 个月~12 岁儿童
- D. 婴儿
- E. 成人

105. 全紧闭麻醉中，最重要的监测是

- A. 潮气量
- B. 分钟通气量
- C. 呼吸频率
- D. 脉搏氧饱和度
- E. 吸呼比

106. 针刺镇痛产生的最主要的机制是

- A. 内源性阿片样物质释放增加
- B. 中枢 5-HT 释放增加
- C. 中枢乙酰胆碱释放增加
- D. 中枢去甲肾上腺素释放减少
- E. 中枢兴奋性氨基酸释放增加

107. 有关恶性高热的描述，哪项错误

- A. 有家族遗传因素
- B. 为免疫缺陷性疾病
- C. 男性多于女性。小儿多见
- D. 有诱发因素激发
- E. 以体温上升速度快、幅度高为特点

108. 老年人胸、腹腔大手术及需大量输血病人除常规监测血压、心电图、脉搏、血氧饱和度外，还应重点监测

- A. 体温
- B. 脑电图
- C. 吸入氧浓度
- D. 神经肌传递功能
- E. 电解质

109. 临床麻醉工作的目的，哪项是正确的

- A. 消除疼痛
- B. 保证安全

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/745010244241011104>