

## 儿科护理考试题及参考答案

1、护士为支气管肺炎患儿采取的体位是

- A、头高位或半卧位
- B、头低足高位
- C、去枕平卧位
- D、健侧卧位
- E、左侧卧位

答案：A

2、关于高渗性脱水，下列叙述哪项不妥

- A、多见于不显性失水增多而给水不足
- B、烦躁不安、肌张力增高甚至惊厥
- C、细胞内液减少明显
- D、尿少比重增高
- E、脱水征比其他两种脱水明显，易出现循环障碍

答案：E

3、某轻度脱水患儿口服ORS液进行治疗，则正确的做法为

- A、ORS液体应一次服完
- B、服ORS液期间可以不用喝水
- C、没有喝完的ORS液应加入开水加热后再喝
- D、如患儿眼睑出现水肿，应停止服ORS液
- E、腹胀儿可以服用ORS液

答案：D

4、关于低出生体重儿的叙述正确的是

- A、出生体重不足2500克
- B、出生体重不足2000克
- C、出生体重不足1500克
- D、出生体重不足1000克
- E、出生体重不足500克

答案：A

5、有关早产儿的护理，以下哪项不正确

- A、合理营养
- B、注意保暖
- C、预防感染
- D、预防窒息
- E、及早输血输液

答案：E

6、4个月人工喂养儿，体重6kg，每日需总液体量及能量分别是

- A、总液体量660ml，能量660kcal
- B、总液体量900ml，能量660kcal
- C、总液体量900ml，能量880kcal
- D、总液体量1200ml，能量660kcal
- E、总液体量1200ml，能量880kcal

答案：B

7、10个月人工喂养儿，腹泻半个月，大便每天5~6次，近3天加重，每天达10多次，稀水样，伴有呕吐2~3次/天，无口渴，尿极少。体查：体温38.5℃，体重4kg，精神萎靡，眼窝及前囟凹陷，哭声低微、无泪，皮肤干燥发灰，四肢凉，心率160次/分，心音低钝，腹胀，肠鸣音减弱。下列诊断哪项不正确

- A、重型迁延性腹泻
- B、重度低渗性失水伴代谢性酸中毒
- C、低钾血症
- D、中毒性肠麻痹
- E、重度营养不良

答案：D

8、护士向急性肾炎患儿家长解释目前为患儿应用青霉素的目的是

- A、防止继发感染
- B、预防肾炎症进一步发展
- C、消除体内残余病灶内的细菌
- D、防止其他合并症
- E、防止病情恶化

答案：C

9、患儿，6岁。皮肤同一部位出现丘疹、水疱疹，有的水疱内含清亮液体，有的呈浊性液，还有的已破溃结痂。考虑患儿发生了

- A、风疹
- B、水痘
- C、麻疹粘膜斑
- D、猩红热
- E、药疹

答案：B

10、避免新生儿颅内出血加重的关键措施是

- A、及时吸氧
- B、保持患儿安静，少搬动
- C、及时注射维生素 K
- D、加强孕产期保健
- E、积极建立呼吸

答案：B

11、患儿，6个月。吐奶拒食，嗜睡2天。查体：面色青灰，前囟紧张，脐部少许脓性分泌物。该患儿最可能的医疗诊断是

- A、病毒性脑炎
- B、化脓性脑膜炎
- C、脑脓肿
- D、颅内出血
- E、脐炎

答案：B

12、早产儿，2天，有窒息史。目前患儿嗜睡。体查：患儿瞳孔缩小，对光反应迟钝，前囟张力稍高，拥抱反射、吸吮反射弱，肌张力低下。头颅CT示脑室及其周围出血。患儿最可能的诊断是

- A、新生儿缺氧缺血性脑病
- B、新生儿化脓性脑膜炎
- C、新生儿颅内出血
- D、新生儿窒息
- E、新生儿败血症

答案：C

13、水痘皮疹的重要特征为

- A、均为水滴样疱疹
- B、皮疹呈离心性分布
- C、首先出现在头面部
- D、发热后3~4天出现皮疹
- E、分批出现的斑疹、丘疹、疱疹、结痂并存

答案：E

14、可能出现水冲脉及枪击音的先心病是

- A、法洛四联症
- B、艾森曼格综合征
- C、动脉导管未闭
- D、室间隔缺损

E、房间隔缺损

答案：C

15、1岁小儿的家长因孩子前囟未愈合来院咨询，护士应告知家长小儿前囟闭合的时间为

A、4~6个月

B、6~8个月

C、8~10个月

D、10~12个月

E、1~1.5岁

答案：E

16、关于麻疹最常见的并发症，正确的是

A、肺炎

B、麻疹脑炎

C、喉炎

D、心肌炎

E、急性胰腺炎

答案：A

17、患儿男，8岁，近半年来常感觉体力活动后容易疲乏。学校体检发现：血红蛋白为82g/L，则该患儿的贫血程度属于

A、无贫血

B、轻度贫血

C、中度贫血

D、重度贫血

E、极重度贫血

答案：C

18、“患儿男，9个月，因“间断腹泻2个月、厌食1个月”入院。查体：患儿神志清楚，精神反应差，皮肤、黏膜苍白。血常规：血红蛋白80g/L，红细胞 $3.0 \times 10^{12}$ ”

A、应从小剂量开始服用

B、患儿可能出现胃肠道反应

C、避免同时服用牛奶

D、避免同时服用维生素C、橙汁

E、服药后大便会变成黑色

答案：D

19、患儿，女，2岁，诊断为“法洛四联症”，患儿平素活动时都会主动下蹲片刻，家长咨询护士其原因，护士正确的解释是

- A、使心脑血管供血增加
- B、缓解漏斗部痉挛
- C、使劳累、气急缓解
- D、使静脉回心血量增加
- E、增加体循环阻力，减少右向左分流

答案：E

20、全脂奶粉配成全牛奶按容量计算，奶粉与水的比例为

- A、1：2
- B、1：4
- C、1：6
- D、1：8
- E、1：10

答案：B

21、小儿肺炎引起全身各系统病理变化的关键是

- A、病原体的侵入
- B、组织破坏
- C、机体免疫功能低下
- D、毒素作用
- E、缺氧，二氧化碳潴留

答案：E

22、小儿肺炎应用抗生素治疗，一般停药时间为

- A、体温正常，咳嗽消失
- B、体温正常后5~7天，症状消失
- C、体温正常后5~7天，临床症状体征基本消失后3天
- D、体温正常后2周，肺部体征消失
- E、体温正常后3~4天，症状消失

答案：C

23、1岁6个月的小儿乳牙总数的推算应是

- A、6~8颗
- B、8~10颗
- C、10~12颗
- D、12~14颗
- E、20颗

答案：D

24、患儿男，7个月，因“发热、咳喘3天，加重1天”就诊，经实验室检查以及胸片检查确诊为“小儿肺炎”入院。为防止并发症的发生，护士应重点观察患儿的

- A、饮水量
- B、心率、呼吸变化
- C、大小便次数
- D、精神状态
- E、体温变化

答案：B

25、小儿肺炎一般采用鼻前庭给氧，氧浓度一般不超过

- A、0.2
- B、0.3
- C、0.4
- D、0.5
- E、0.6

答案：C

26、某儿，5天，昨日起拒食，反应差，今日皮肤黄染明显而入院。查体：患儿颈周、前胸多个小脓疱，分泌物涂片找到G+球菌，心肺无异常，肝右肋下1.5cm。宜选哪项检查方能对致病菌作出确诊

- A、胸部X线摄片
- B、血培养
- C、血常规
- D、脑脊液检查
- E、血沉

答案：B

27、小儿肺部感染易引起肺间质性炎症是因为

- A、呼吸中枢不健全
- B、肺血管丰富，间质发育旺盛
- C、下呼吸道口径小，纤毛运动差
- D、呼吸肌不发达
- E、血IgM及IgG含量少

答案：B

28、婴幼儿时期易患的肺炎是

- A、大叶性肺炎

- B、支气管肺炎
- C、间质性肺炎
- D、干酪性肺炎
- E、支原体肺炎

答案：B

29、生理性贫血可出现在婴儿出生后

- A、1个月以内
- B、2~3个月
- C、4~6个月
- D、6~8个月
- E、8个月以后

答案：B

30、小儿高渗性脱水发生惊厥的原因是

- A、休克
- B、脑水肿
- C、循环衰竭
- D、细胞内脱水
- E、细胞外脱水

答案：D

31、患儿，5岁，1周前因“肾病综合征”入院，现阴囊皮肤高度水肿。该患者目前主要的护理问题是

- A、呼吸形态改变
- B、有受伤的危险
- C、活动无耐力
- D、潜在并发症：急性肾衰竭
- E、有皮肤完整性受损的危险

答案：E

32、患儿，男，4岁，体重16kg，身高98cm，智能发育正常，现在幼儿园学习。此期儿童发病率开始增多的疾病是

- A、婴幼儿腹泻病
- B、肺炎
- C、佝偻病
- D、急性肾炎
- E、骨折

答案：D

33、足月儿出生体重 3kg, 1 岁时其体重、身高、头围的测量值约为

- A、 6kg, 60cm, 36cm
- B、 7kg, 70cm, 40cm
- C、 9kg, 75cm, 46cm
- D、 12kg, 85cm, 48cm
- E、 15kg, 90cm, 50cm

答案： C

34、 婴儿化脓性脑膜炎时脑膜刺激征不明显是因为

- A、 机体反应差
- B、 脑膜炎症反应轻
- C、 颈部肌肉不发达
- D、 神经系统发育不完善
- E、 囟门未闭所起的缓冲作用

答案： E

35、 中性粒细胞与淋巴细胞比例两次相等的年龄是

- A、 4~6 天, 4~6 月
- B、 4~6 周, 4~6 岁
- C、 4~6 天, 4~6 岁
- D、 4~6 个月, 4~6 岁
- E、 4~6 周, 7~8 岁

答案： C

36、 患儿女, 7 岁, 处于麻疹出疹期, 对其应实施

- A、 呼吸道隔离
- B、 肠道隔离
- C、 分泌物隔离
- D、 严密隔离
- E、 无须隔离

答案： A

37、 对于未成熟儿的护理措施应除外

- A、 合理喂养
- B、 观察体温变化, 加强保暖
- C、 保持呼吸道通畅, 以防窒息
- D、 持续高浓度氧气吸入, 维持有效呼吸
- E、 严格执行消毒隔离制度, 防止交叉感染

答案： D



38、某幼儿园发现一例麻疹患儿，为预防麻疹传染给其他小儿，该患儿应隔离至

- A、起病后 1 周
- B、出疹后 5 天
- C、出疹后 1 周
- D、疹退后 5 天
- E、疹退后 10 天

答案：B

39、含铁量最低的食物是

- A、肉类
- B、豆类
- C、乳类
- D、蛋类
- E、菌类

答案：C

40、患儿，女，4 个月。出生后不久开始腹泻，大便每天 5~6 次，神志清楚，营养中等，面部见湿疹，大便常规正常。患儿最可能发生了

- A、婴儿腹泻
- B、迁延性肠炎
- C、病毒性肠炎
- D、生理性腹泻
- E、真菌性肠炎

答案：D

41、支气管肺炎的主要病理生理改变是

- A、病原体侵入
- B、高碳酸血症
- C、毒素作用
- D、低氧血症
- E、肺动脉高压

答案：D

42、下列哪项不是引起婴儿溢乳的原因

- A、胃呈水平位
- B、胃酸分泌少
- C、贲门括约肌较松弛
- D、幽门括约肌发育好

E、喂奶时吞咽较多空气

答案：B

43、下列关于婴儿心率的范围，正确的描述是

A、120~140 次 / 分

B、110~130 次 / 分

C、100~110 次 / 分

D、90~100 次 / 分

E、70~90 次 / 分

答案：B

44、患儿，女，1岁，因发热、咳嗽4天，伴气促2天来诊。体检：

T38.5℃，呼吸急促，鼻翼扇动，口周发绀，双肺可闻及少量中、细湿啰音。血象：WBC $18 \times 10^9/L$ ，其最可能的肺炎类型为

A、大叶性肺炎

B、支气管肺炎

C、迁延性肺炎

D、吸入性肺炎

E、过敏性肺炎

答案：B

45、患儿，男，11个月，出现喷射性呕吐，前囟饱满，诊断为化脓性脑膜炎，其不正确的护理措施为

A、严密观察患儿生命体征及瞳孔的变化

B、保持室内安静，避免一切刺激

C、将患儿头肩抬高 $15^\circ \sim 30^\circ$ 侧卧位

D、给予甘露醇

E、增加补液量

答案：E

46、脊柱出现颈椎前凸的时间是

A、出生时

B、3个月

C、6个月

D、9个月

E、12个月

答案：B

47、下列溶液配比中属于等渗液的是

A、1:2 溶液

- B、2: 1 溶液
- C、4: 3: 2 溶液
- D、ORS 溶液
- E、2: 3: 4 溶液

答案: B

48、下列哪项是维生素 D 缺乏性佝偻病骨样组织堆积的

- A、鸡胸
- B、O 型腿
- C、手镯征
- D、肋缘外翻
- E、颅骨有乒乓球感

答案: C

49、小儿心跳呼吸骤停的主要直接原因是

- A、严重外伤
- B、心脏疾患
- C、药物中毒
- D、窒息
- E、电解质紊乱

答案: D

50、7 个月小儿可添加的辅食种类为

- A、碎肉和菜汤
- B、烂面和鸡蛋
- C、煎饼
- D、饺子
- E、碎肉和饼干

答案: B

51、小儿，1 岁 7 个月，乳牙数目估计有

- A、月龄减 2
- B、月龄减 3~4
- C、月龄减 4~6
- D、月龄减 7~8
- E、月龄减 10

答案: C

52、小儿目前 6 个月，为预防营养性巨幼红细胞性贫血应避免

- A、长期羊奶喂养

- B、添加动物血、豆浆、肉类
- C、添加果汁
- D、添加新鲜瓜果、蔬菜
- E、长期饮用未煮沸的牛奶

答案：A

53、“患儿男，9个月，因“间断腹泻2个月、厌食1个月”入院。查体：患儿神志清楚，精神反应差，皮肤、黏膜苍白。血常规：血红蛋白80g/L，红细胞 $3.0 \times 10^{12}$ ”

- A、治疗腹泻与补充铁剂
- B、输血
- C、治疗腹泻与输血
- D、添加辅食
- E、治疗腹泻与添加辅食

答案：A

54、患儿，1个月。发热2天、呕吐5次入院。查体：患儿精神萎靡，目光凝视，脑膜刺激征阳性，初步诊断为化脓性脑膜炎。其常见的病原菌是

- A、大肠埃希菌
- B、肺炎球菌
- C、铜绿假单胞菌
- D、流感嗜血杆菌
- E、沙门菌

答案：A

55、患儿，男，6岁，因溺水出现心搏、呼吸停止。胸外心脏按压的频率为

- A、60-80次/分
- B、80-100次/分
- C、100-120次/分
- D、120-140次/分
- E、90-110次/分

答案：C

56、婴儿期是指

- A、自出生至生后1周岁
- B、自出生后28天至1周岁
- C、自出生后30天至1周岁
- D、自1周岁至2周岁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/745332023032011110>