

眼镜验光员中级理论知识试卷

0 5—0 3

注 意 事 项

考试时间：120 分钟。

请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。

不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

	一	二	总分
得分			
得分			
评分人			

一、单项选择(第 1 题 ～第 1 6 0 题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号

中,每题0． 5 分,满分80 分。)

1.企业生产给营活动中,促进员工之间平等尊重的措施是(B)。

A、互惠互惠，平均分配

B、加强交流,平等对话

C、只要合作，不要竞争

D、人心叵测，谨慎行事

2。(C)不是眼球内容物。

A、房水

B、晶状体

C、角膜

D、玻璃体

3.泪阜为眼 (C)组织包围着一个肉状隆起的组织。

A、睑裂

B、睑缘

C、内眦部

D、外眦部

4、(A)是指上下眼睑对角膜持续性压迫,使角膜产生垂直向屈光力较强的散光。

A、生理性散光

B、病理性散光

C、复性散光

D、混合性散光

5、泪液中的脂质层位于 (B)。

A、内层

B、外层

C、中层

D、上层

- 6、维持眼球的(B) 内容是巩膜的主要功能。
- A、位置 B、形状 C、透明性 D、
- 7、调节眼内压力是(D)的主要作用。
- A、视网 B、脉络 C、角膜 D、房水
- 8、白内障有进行性加重的趋势，不同程度地影响视力，用光学的方法(B)。
- A、完全矫正 B、不能矫正 C、完全治愈 D、可以治愈
- 9、球面透镜有两个界面，各界面对(D)能力用横焦度来表示就称这为面镜度。
- A、入射光线 B、反射光线 C、折射光线 D、光线屈折
- 10、通过移动(A)观察目标的动向，二者则呈现顺动。
- A、球镜 B、柱镜 C、正球面透镜 D、负球面透镜
- 1 1、如果柱面透镜的轴向在 1 35 度上,则该透镜的最大屈光力是在(A)上。
- A、4 5 度 B、90 度 C、1 3 5 度 D、180 度
- 1 2.直角坐标底向标示法和(B)是三棱镜的底向标示法的种类。
- A、180。底向标示法 B、36 0。底向标示法
- C、鼻端底向标示法 D、太阳穴底向标示法
13. 用(B)可求出眼用透镜上任意一点的三棱镜效果。
- A、有效镜度公式 B、移心透镜关系式
- C、三棱镜公式 D、代数和的方法
- 1 4.(D)是指戴镜注视目标时,两眼所遭到的三棱镜效果之差。
- A、三棱镜效果 B、透镜效果之差
- C、透镜与棱镜关系 D、差异三棱镜效果

23、用直视式顶焦度计测量球柱镜片,顶焦度计所示的光标图像不会同时清晰,而是 (D)。

- A、全部清晰 B、全不清晰 C、清晰 D、部分清晰

24、渐变镜片的两激光隐记连线中心点上方8mm 为(A)。

- A、远用焦度测量区 B、近用焦度测量区 C、棱镜 D、模糊区

25、眼镜 (A) 会造成眼镜棱镜效应的产生。

- A、大于15。 B、小于 15。 C、等于12。 D、大于10。

26、远视眼患者配戴隐形眼镜比框架眼镜度数(A)。

- A、大 B、小 C、相同 D、大20 %

27、(C) 是使用隐形眼镜时应注意的事项。

- A、半月一洗眼镜片 B、一周洗眼镜片
C、指甲不宜过长 D、指甲不宜过短

28、眼外观检查时可以 (A)。

- A、将患者与其他健康者比较 B、将患者与其他患者比较
C、在暗室进行 D、在红光下进行

29、(C) 是结膜充血的一种。

- A、巩膜充血 B、角膜新生血管 C、睫状充血 D、巩膜充血与结膜充血

30、(B)是睫状充血的特点。

- A、可移动性 B、不随结膜移动 C、只能上下移动 D、只能左右移动

31、睫状充血的特点是 (A)。

A、深红色、无压缩

B、浅红色、无压缩

C、深红色、有压缩

D、浅红色、有压缩

32、透见 (D)是蓝色巩膜的原因。

A、虹膜颜色

B、巩膜外色素

C、虹膜色素

D、巩膜内黑色色

素

33、角膜知觉减退常见于(A).

A、长期配戴隐形眼镜

B、短期配戴隐形眼镜

C、长期配戴框架眼镜

D、短期配戴框架眼镜

34、(A)是 Schirmer 试验的长度要求。

A、5 mm 长

B、10 mm长

C、20mm 长

D、30m

m 长

35、远视眼长期形成的调节张力(D)。

A、稍休息后可松弛

B、可主观消失

C、可逐渐加强

D、短时间内不能松弛

36、矫正后的近视眼看近时(B)。

A、不需要调节

B、需付出与正视眼相应的调节

C、需付出大于正视眼的调节

D、需付出小于正视眼的调节

37、应用带状光检影镜时,映光的 (A)是直接意义.

A、动向

B、速率

C、形状

D、亮度

38、对于散光眼来予,当映光变得细而亮时则可确定()。

A、近视度数

B、远视度数

C、散光度数

D、散光轴向

39、调节张力使 (A) 的测定结果偏深。

A、远视眼

B、散光眼

C、弱视

D、近视

眼

40、(D)是可以通过散光表来大致测试的.

A、准确轴位 B、准确度数 C、性质 D、轴位

41、如果有散光时，散光表的线条应(A)。

A、不均匀,深浅不同 B、均匀,深浅相同
C、均匀,深浅不同 D、不均匀，深浅相同

42、使用散光表时矫正视力须达到(B)才符合要求。

A、0.5 B、0.7 C、0.2 D、
0.1

43、不适用于裂隙片的散光是(D)。

A、 $-2.00/-1.00 \times 90^\circ$ B、 $-3.00/-2.00 \times 90^\circ$ 。
C、 $-1.00/-1.00 \times 90^\circ$ D、 $+0.25/+0.50 \times 90^\circ$ 。

44、使用裂隙片时矫正视力须达到(A)才符合要求。

A、0.5 B、0.7 C、0.2 D、
0.1

45、如果裂隙片在135最清楚,那么在(B)最模糊。

A、15° B、45° C、65° D、95°

46、用裂隙片测散光度数时，如果加+1.00D后更加模糊则改加(D)。

A、+0.25D B、+0.50D C、+2.00D D、
-1.00D

47、(C)是最不适用散光表的。

A、 $-3.00/-1.00 \times 90^\circ$ B、 $-4.00/-2.00 \times 180^\circ$ C、 $-7.00/-6.00 \times 45^\circ$
D、 $-10.00/-2.00 \times 75^\circ$ 。

48、(D)是用裂隙片测散光时必须分别在清晰位、模糊位先加的镜片。

- A、正散光片 B、负散光片 C、负球面片 D、正球面片

49、(D)含有固定式与活动式两种。

- A、裂隙片 B、检影镜 C、镜片箱 D、散光表

50、不能作为裂隙片裂隙宽度的是(A)。

- A、0.5mm B、1.0mm C、2.0mm D、2.5mm

51、散光的度数与轴向是用(D)来精确的。

- A、裂隙片 B、散光表 C、视力表 D、交叉柱镜

52、(D)是交叉柱镜翻转后每一位置应停留的时间。

- A、15分钟 B、半分钟 C、1秒 D、2~5秒

53、交叉柱镜是由(D)的柱镜片轴位垂直叠加在一起构成的。

- A、两个度数不等、符号相反 B、两个度数不等、符号相同
C、两个度数相等、符号相同 D、两个度数相等、符号相反

54、(C)是最常用的交叉柱镜。

- A、 $\pm 0.50\text{DC}$ B、 $\pm 0.75\text{DC}$ C、 $\pm 0.25\text{DC}$ D、 $\pm 1.00\text{DC}$

55、使用交叉柱镜比较前后两面清晰度是否相同时(A)。

- A、两面一定要同样清楚 B、两面一定要同样模糊
C、同样模糊与同样清楚均可 D、一面清楚一面模糊即可

56、交叉柱镜上与“+”号成45°的直线上的屈光力(C)。

- A、 $>0\text{D}$ B、 $<0\text{D}$ C、等于 0D D、 0.25D

57、(B)是交叉柱镜持柄的位置。

A、随意一个位置

B、“与”“一”两标志这正中

C、镜面标有“

D、镜面标有“ $\frac{1}{4}$ ”处

58、 (B)是双色测试时的要求.

A、雾视+1.00D

B、戴镜至最佳视力

C、戴镜

D、不戴镜

59、双色试验应(C)。

A、同时检查双眼

B、首先检查左眼

C、首先检查右眼

D、戴红绿色盲处

60、双色试验时应首先注视(D)。

A、白色视标

B、兰色视标

C、红色视标

D、绿色视标

61、双色试验时,如果红色清楚,那么应 (B)。

A、加正镜

B、加负镜

C、什么都不加

D、试负镜

6 2、双色试验时,如果绿色清楚,那么应(A)。

A、加正镜

B、加负镜

C、什么都不加

D、试正镜

63、七色光混合后可形成(D)。

A、黑色光

B、蓝色光

C、黄色光

D、白色光

64、红光是在(B)中传播最快的光。

A、真空

B、空气

C、低密介质

D、高密介质

65、通过人眼的屈光系统后，(C) 折射最小。

A、绿光

B、蓝光

C、红光

D、白光

66、红光是 (C)的可见光.

- A、波长最长、折射率最大

B、波长最短、折射率最大
- C、波长最长、折射率最小

D、波长最短、折射率最小
- 67、紫光是在(D)中传播最慢的光。
- A、真空

B、空气

C、低密介质

D、高密介质
- 68、在介质中紫光是(C)的可见光。
- A、波长长、速度快

B、波长长、速率慢
- C、波长短、折射力强

D、波长短、折射力弱
- 69、紫光是(C)的可见光。
- A、传播速度最快

B、波长最长
- C、波长最短

D、真空中传播速度最慢
- 70、(A)通过正视眼后焦点落在视网膜上。
- A、黄光

B、红光

C、蓝光

D、绿光
- 71、(A)通过正视眼后焦点落在视网膜前。
- A、绿光

B、红光

C、橙光

D、黄光
- 72、(B)通过正视眼后焦点落在视网膜后。
- A、绿光

B、红光

C、蓝光

D、紫光
- 73、通过近视眼的光线中，绿光的焦点与紫光的焦点相比(D)。
- A、二者焦点位置相同

B、二者焦点位置均在视网膜上
- C、前者比后者的焦点靠前

D、前者比后者的焦点靠后
- 74、光线通过近视眼的屈光系统后,黄光的焦点较绿光(D)。
- A、靠前

B、靠上

C、靠下

D、靠后
- 75、光线通过远视眼的屈光系统后,黄光的焦点较绿光(D)。

	B、靠上	C、靠下	D、靠后
76、黄色光是人眼（	D		）的颜色。
A、最不敏感	B、感光度最差	C、最不适应	D、感光度最强
77、双色法在（	D		）应慎用。
A、高度近视者时		B、高度远视者时	
C、高度散光者时		D、色觉异常者时	
78、雾视后晶体的屈光力比原来（	D		）。
A、变大	B、不变	C、变厚	D、变小
79、散光患者雾视后,则两条焦线必须在（	D		）。
A、视网膜上	B、视网膜后	C、视网膜西侧	D、视网膜前
80、先加后换”是为了避免（	B		）。
A、视力不正确		B、验光近视矫正镜太大	
C、结果正柱镜太小		D、雾视效果	
81、（	D		）是“先加后换”原则的目的。
A、工作方便	B、患者方便	C、加强雾视效果	D、保持雾视的连续性
82、雾视时，加正镜片的幅度为（	C		）。
A、每次+0.75	B、每次+0.50	C、每次+0.25	D、每次+1.00
83、远视患者造成“人工近视”须知（	C		）。
A、近视镜片	B、平光	C、远视镜片	D、双光镜片
84、电脑验光仪（	D		）至患者角膜顶点一般为12mm。
A、目镜	B、主体	C、中央	D、物镜
85、电脑验光仪每次检测（	D		）的次数为至少三次。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/746031001000010230>