

## 肿瘤专科知识考试题（附参考答案）

### 一、单选题（共 50 题，每题 1 分，共 50 分）

1、左半结肠癌的早期症状是（）

- A、腹部包块
- B、排便习惯改变
- C、肠梗阻症状
- D、贫血

正确答案：B

2、王某，56 岁，患晚期肝癌，近来病情发展迅速，肝区剧烈疼痛，腹水，呼吸困难。患者感到痛苦、悲哀，有轻生念头，此心理反应属于（）

- A、忧郁期
- B、愤怒期
- C、接受期
- D、否认期
- E、协议期

正确答案：A

3、直肠癌的早期症状是（）

- A、大便习惯改变
- B、排便困难，便条变细
- C、便血
- D、里急后重

正确答案：A

4、直肠癌根治手术能否保留肛门取决于（）

- A、左半结肠的长短
- B、肿瘤大小
- C、肿瘤距肛门的距离
- D、肿瘤有无远处转移

正确答案：C

5、以下哪种给药方法属于化疗药物局部给药方法（）

- A、TACE
- B、静脉注射
- C、口服给药
- D、肌肉注射

正确答案：A

6、PICC 置管者封管注射器最佳选择是 ( )

- A、2ml 注射器
- B、5ml 注射器
- C、10ml 以上注射器
- D、以上都可以

正确答案：C

7、肺癌病人首发症状 ( )

- A、咳嗽
- B、胸痛
- C、血痰
- D、发热

正确答案：A

8、严重低钾血症病人导致死亡的主要原因是 ( )

- A、肠麻痹
- B、心肌自律性增高
- C、呼吸肌麻痹
- D、心肌收缩性减弱
- E、肾衰竭

正确答案：C

9、化疗药物引起静脉炎的预防措施不包括 ( )

- A、对腋窝手术后不应选择患肢静脉给药
- B、最好选用中心静脉输入化疗药物
- C、在推注发泡性药物前应抽回血来证实静脉是否通畅
- D、先输发泡性药物, 后输非发泡性药物

正确答案：D

10、目前治疗恶性肿瘤的最佳方法是 ( )

- A、化学疗法
- B、手术治疗
- C、手术为主的综合治疗
- D、放射疗法

正确答案：C

11、TACE 术后的术侧下肢制动 ( ) 小时

- A、6 小时
- B、2 小时

C、24 小时

D、48 小时

正确答案：C

12、癌症的治疗措施包括（）

A、手术治疗

B、放射治疗

C、化学治疗

D、生物治疗

E、以上都是

正确答案：E

13、胆道疾病首选的诊断方法是（）

A、口服法胆道造影

B、静脉法胆道造影

C、B 超

D、经皮肝穿刺胆道造影

正确答案：C

14、抽吸化疗药物时，要注意抽出的药液不超过注射器容量的（）

A、2/3

B、1/2

C、3 / 4

D、1 / 3

正确答案：C

15、关于出血病人的护理，下列哪项是错误的（）

A、尽量减少注射或各种穿刺

B、避免皮肤的外伤或挤压

C、避免过度疲劳或情绪激动

D、为了减少皮下出血，不宜经常更换注射部位

正确答案：D

16、原发性肝癌内血行转移最易侵犯的部位为（）

A、肝门静脉

B、肝动脉

C、上腔静脉

D、肝静脉

正确答案：A

17、食道癌常好于哪部位（）

- A、食道中段
- B、食道上段
- C、食道下段
- D、以上都不正确

正确答案：A

18、下列陈述不正确的是（）

- A、癌症患者疼痛时才能用止痛剂，预防成瘾
- B、轻度疼痛时患者能正常生活睡眠
- C、发泡性药物指外渗后可引起局部组织坏死的药物
- D、疼痛是一种主观感觉

正确答案：A

19、PICC 置管患者，下列说法错误的是（）

- A、置管手臂不能杵拐杖
- B、置管期间患者不能洗澡
- C、置管手臂不能提取重物
- D、置管当天可适当活动上肢

正确答案：B

20、腹膜透析病人最重要的并发症是（）

- A、腹膜炎
- B、引流不畅
- C、腹膜透析管堵塞
- D、腹痛

正确答案：A

21、下列与乳腺癌发生无关因素（）

- A、饮食习惯
- B、乳房感染
- C、遗传因素
- D、性激素改变

正确答案：B

22、肝硬化病人最常见的并发症（）

- A、上消化道出血
- B、B . 肝性脑病
- C、原发性肝癌

D、电解质紊乱

正确答案：A

23、肺癌常见的并发症是（）

A、肝转移

B、上腔静脉阻塞综合征

C、Horner 综合征

D、骨转移

正确答案：B

24、卡培他滨应在餐后何时服用（）

A、30 分钟

B、20 分钟

C、40 分钟

D、60 分钟

正确答案：A

25、患者，男性，60 岁，直肠癌根治术后拟行 FOLFOX 方案辅助化疗，具体为：奥沙利铂 150 mg d1+亚叶酸钙 0.8 g d1+5-氟尿嘧啶 0.75 g d1。

正确的滴注顺序应当是：（）

A、奥沙利铂、亚叶酸钙、氟尿嘧啶

B、奥沙利铂、氟尿嘧啶、亚叶酸钙

C、亚叶酸钙、氟尿嘧啶、奥沙利铂

D、亚叶酸钙、奥沙利铂、氟尿嘧啶

E、氟尿嘧啶、亚叶酸钙、奥沙利铂

正确答案：A

26、膀胱冲洗时，根据下列哪项调节冲洗速度（）

A、患者主诉

B、引流液的量

C、病情

D、引流液颜色

正确答案：D

27、乳房癌术后几天可用患侧收洗脸、刷牙、进食等。（）

A、术后 3~4 日

B、术后两周

C、术后 24 小时

D、术后 4~7 日

正确答案：D

28、职业暴露是指医务人员在从事诊疗、护理活动过程中接触（），从而损害健康或危及生命的一种情况。

- A、有毒物质或传染病病原体
- B、有害物质或传染病病原体
- C、有毒、有害物质，或传染病病原体
- D、有毒、有害物质

正确答案：C

29、配制哪些化疗药不能用生理盐水作溶剂的是（）

- A、顺铂
- B、奥沙利铂
- C、丝裂霉素
- D、紫杉醇

正确答案：B

30、血清 AFP 阳性对哪种肿瘤有诊断意义？（）

- A、肺癌
- B、大肠癌
- C、肝转移癌
- D、肝细胞癌

正确答案：D

31、交界性肿瘤特征是（）

- A、良性肿瘤来源于两种组织
- B、良性肿瘤偶有远处转移
- C、良性肿瘤位于两个器官交界处
- D、形态上属于良性，但生长呈浸润，切除后易复发

正确答案：D

32、恶性淋巴瘤确诊的最主要依据（）

- A、病理组织学诊断
- B、CT
- C、B超
- D、临床表现

正确答案：A

33、一男性病人，右肩部皮下有一单发无痛性肿物，约 3cm×3cm×2cm，质韧，界限清，分叶状，无压痛，生长缓慢。考虑为（）

- A、纤维瘤
- B、脂肪瘤
- C、皮脂腺癌
- D、血管瘤
- E、皮样囊肿

正确答案：B

34、以下哪项陈述是正确的（）

- A、止痛治疗能使疼痛部分缓解即可
- B、疼痛剧烈时才用止痛药
- C、末期癌症病人才能使用最大剂量阿片类止痛药
- D、阿片类止痛药的用药剂量个体差别较大

正确答案：D

35、男性，45岁，因怀疑肝癌入院。患者因过度的焦虑和恐惧，表现出对护理不合作。以下护理措施错误的是（）

- A、批评患者的态度和行为
- B、教育患者适应身体状况
- C、解释护理的方法和可能的感受
- D、对患者的表现理解
- E、关注患者的心理和行为反应

正确答案：A

36、介于良性与恶性肿瘤之间的肿瘤称为（）

- A、母细胞瘤
- B、肉瘤
- C、脂肪瘤
- D、交界性肿瘤

正确答案：D

37、早期中心型肺癌诊断率最高的检查方法是（）

- A、转移灶活组织检查
- B、支气管镜检查
- C、胸腔积液检查
- D、纵隔镜检查

正确答案：B

38、发性肝癌普查应做哪项检查（）

- A、肝脏超声显像

- B、肝穿刺活检
- C、肝脏血管造影
- D、肝脏 CT

正确答案：A

39、年轻的乳腺癌患者，出院前健康教育中哪一项对预防复发最重要（）

- A、5年内避免妊娠
- B、加强营养
- C、参加体育活动增强体质
- D、早期来院检查

正确答案：A

40、结肠造口术后肛袋护理措施不正确的是（）

- A、肛门袋持续应用，以防污染皮肤
- B、每天浸泡消毒一次
- C、及时更换造口部位敷料
- D、排便后及时倒空、洗净、晾干

正确答案：A

41、正常成人每日分泌正常胃液量为（）

- A、1000~2000ml
- B、1500~2500ml
- C、2000~2500ml
- D、2000~3000ml
- E、1500~2000ml

正确答案：B

42、女性，36岁，行乳腺癌根治术后，情绪低落，不愿参加社交活动，其护理问题为（）

- A、营养失调：低于机体需要
- B、绝望
- C、有皮肤完整性受损的危险
- D、自我形象紊乱
- E、有感染的危险

正确答案：D

43、直肠肛管的主要生理功能是（）

- A、吸收
- B、排便



- C、免疫
- D、消化
- E、造血

正确答案：B

44、血清钾的正常值为（）

- A、2.5~4.5mmol/L
- B、2.5~3.5mmol/L
- C、4.5~6.5mmol/L
- D、3.5~5.5mmol/L
- E、3.5~4.5mmol/L

正确答案：D

45、嗜铬细胞瘤最具特征型的表现是（）

- A、持续性高血压
- B、阵发性高血压
- C、低血压、休克
- D、心率失常

正确答案：B

46、与吸烟关系最密切的肺癌是（）

- A、腺癌、未分化癌
- B、大细胞癌
- C、鳞癌、未分化癌
- D、鳞癌、腺癌

正确答案：C

47、肿瘤最常见的局部表现是（）

- A、肿块
- B、溃疡
- C、出血
- D、梗阻
- E、疼痛

正确答案：A

48、下列哪类药物不属于抗肿瘤药：（）

- A、抗肿瘤抗生素
- B、干扰素
- C、烷化剂

D、抗代谢类

正确答案：B

49、放射性脊髓炎的早期表现是（）

A、四肢乏力

B、感觉异常

C、疼痛

D、以上都是

正确答案：D

50、良性肿块的特点，哪项是错误的（）

A、高分化

B、生长缓慢

C、不含威胁生命

D、恶性程度低

E、界限明确

正确答案：C

二、多选题（共 50 题，每题 1 分，共 50 分）

1、下列哪些药物是用于轻中度疼痛的（）

A、阿司匹林

B、芬太尼

C、消炎痛

D、扑热息痛

正确答案：ABD

2、引起便秘的相关因素有（）

A、阿片类止痛药物

B、饮食结构不合理

C、肠梗阻、高钙血症、低钾血症等

D、卧床时间长，活动量减少

E、应用缓泻剂不和灌肠过度和不当

正确答案：ABCDE

3、全肺切除术后护理（）

A、控制输液速度 30 滴/分左右

B、手术侧胸膜腔内保留适量的气体液体以维持两侧胸膜腔的压力平衡

C、注意检查气管有无移位

D、胸腔引流管平时夹闭

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/746114004112010043>