

2024 年广东省惠东县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题王牌题库附解析答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 防止急性深静脉血栓形成的药物是

- A: 维生素 K1
- B: 维生素 B12
- C: 达肝素钠
- D: 香豆素类

答案：C

2. （2015 年真题）属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是（）。

- A: 文拉法辛
- B: 吗氯贝胺
- C: 氟西汀
- D: 阿米替林

答案：C

3. 可诱发哮喘且变异型心绞痛不宜选用的药物是

- A: 硝酸甘油
- B: 普萘洛尔
- C: 硝苯地平
- D: 洛伐他汀

答案：B

4. 头孢菌素类药的主要作用靶点是

- A: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- B: 核糖体的 30S 亚基
- C: 细胞内膜 PBP
- D: 核糖体的 50S 亚基

答案：C

5. 连续使用应间隔 4h 以上

- A: 酚甘油滴耳液
- B: 羟甲唑啉
- C: 赛洛唑啉
- D: 麻黄碱

答案：B

6. 抑制细菌依赖性 DNA 的 RNA 聚合酶，阻碍 mRNA 合成的药物是

- A: 利福平
- B: 磺胺嘧啶
- C: 两性霉素
- D: 氧氟沙星

答案：A

7. 氯霉素的抗菌作用机制是()

- A: 抑制细菌的 DNA 合成
- B: 抑制细菌的蛋白质合成
- C: 干扰细菌的细胞壁合成
- D: 干扰细菌的 RNA 转录

答案：B

8. 抗菌谱广，抗菌活性均类似于头孢噻肟的药物是

- A: 头孢氨苄
- B: 氨曲南
- C: 拉氧头孢
- D: 头孢孟多

答案：C

9. 对铜绿假单胞菌有较强作用的药物是

- A: 哌拉西林
- B: 美西林
- C: 阿莫西林
- D: 氯唑西林

答案：A

10. 主要增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素敏感性的药物是

- A: 胰岛素
- B: 罗格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 氢氧化镁

答案：C

11. 利多卡因对哪种心律失常无效()

- A: 室性期前收缩
- B: 室上性
- C: 阵发性室性心动过速
- D: 心室纤颤

答案：B

12. 快速静脉滴注可出现低血压、心律失常的是

- A: 氨基己酸
- B: 甲萘氢醌
- C: 蛇毒血凝酶
- D: 卡巴克络

答案：A

13. (2019 年真题) 镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是 ()

- A: 低蛋白血症
- B: 重症肌无力
- C: 癫痫
- D: 糖尿病

答案：B

14. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是 ()

- A: 克罗米通具有局部麻醉作用
- B: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵
- C: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫
- D: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及寄生虫的作用

答案：B

15. 患者，男，55 岁。1 小时前因右侧腰背部剧烈疼痛。难以忍受，出冷汗，服颠茄片不见好转，来院急诊。尿常规检查：可见红细胞。B 型超声波检查：肾结石。

- A: 吗啡
- B: 阿托品+哌替啶
- C: 阿托品
- D: 哌替啶

答案：B

16. 局部应用杀灭疥虫的药物中，疗效最佳的是()

- A: 克罗米通
- B: 硫黄软膏
- C: 林旦霜
- D: 苯甲酸苄酯

答案：C

17. 患者，女性，28 岁。妊娠 5 个月。淋雨 1 天后，出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈，12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：体温(T)39℃，脉搏(P)89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音，实验室检查：白细胞(WBC)28×10

- A: 磷霉素
- B: 头孢菌素
- C: 青霉素
- D: 四环素类

答案：D

18. 广谱抗菌药，对细胞内外的结核分枝杆菌、麻风杆菌均有抑制作用的是

- A: 异烟肼
- B: 利福平
- C: 乙胺丁醇
- D: 吡嗪酰胺

答案：B

19. 对地高辛中毒出现严重心律失常者可静脉滴注

- A: 苯妥英钠
- B: 阿托品
- C: 利尿剂
- D: 氯化钾、葡萄糖注射液

答案：D

20. 普芦卡必利为泻药的作用机制是

- A: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性
- B: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便
- C: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快
- D: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

答案：A

21. （2021 年真题）患者，男，48 岁，入院接受结肠癌手术，术后因合并肺部感染，静脉给予头孢哌酮舒巴坦钠治疗 6 天，观察到手术切口和静脉输液穿刺部位有少量渗血，实验室检验结果显示凝血功能异常。针对此症状，宜选用的治疗药物是（）

- A: 维生素 B₁₂
- B: 维生素 K₁
- C: 重组链激酶
- D: 重组人促红素

答案：B

22. 急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

- A: 曲妥珠单抗
- B: 甲氨蝶呤
- C: 环磷酰胺
- D: 长春新碱

答案：D

23. 作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

- A: 依托泊苷
- B: 顺铂
- C: 紫杉醇
- D: 来曲唑

答案：D

24. 下列对红霉素的说法错误的是()

- A: 作用机制是抑制蛋白质合成
- B: 容易透过血脑屏障
- C: 对革兰阳性菌作用强大
- D: 是治疗军团病的首选药

答案：B

25. 与其他 NSAID 合用时疗效并不增强，但可增加其他部位出血风险的是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 吲哚美辛
- C: 阿司匹林

D: 塞来昔布

答案: C

26. 下述保肝药物中可导致低钾血症的是

A: 复方甘草酸苷

B: 门冬氨酸鸟氨酸

C: 还原型谷胱甘肽

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案: A

27. 治疗轻度或中度原发性或肾性高血压宜选用

A: 普萘洛尔

B: 肼屈嗪

C: 卡托普利

D: 硝苯地平

答案: C

28. 丙磺舒可影响赛洛多辛的代谢，延长赛洛多辛在体内存在时间，这是因为丙磺舒抑制

A: CYP3A4

B: 血浆蛋白

C: p-糖蛋白

D: UGT2B7

答案: D

29. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 洛哌丁胺
- B: 口服补液盐
- C: 蒙脱石
- D: 双歧杆菌三联活菌

答案：A

30. 患者，男，56 岁，诊断为肝性脑病Ⅳ级，建议给予该患者使用的氨基酸是

- A: 支链氨基酸
- B: 脂肪族氨基酸
- C: 芳香族氨基酸
- D: 杂环氨基酸

答案：A

31. 肺栓塞静脉溶栓更有效的是()

- A: 尿激酶
- B: 磺达肝癸钠
- C: 肝素
- D: 华法林

答案：A

32. (2019 年真题) 患者女，58 岁，血糖升高 10 年，口服二甲双胍治疗，高血压病史 5 年，未规律治疗，近期查体：血压 158/95mmHg，尿常规示蛋白尿(+++)，适宜该患者使用的降压药物是()

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 甲基多巴
- D: 依那普利

答案：D

33. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 吸入性糖皮质激素
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: 短效 B₂ 受体激动剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：C

34. 唯一可用于治疗深部和皮下真菌感染的多烯类药物是

- A: 两性霉素
- B: 制霉菌素
- C: 氟康唑
- D: 灰黄霉素

答案：A

35. 用于合胞病毒引起的肺炎和支气管肺炎的抗病毒药是

- A: 阿昔洛韦
- B: 利巴韦林
- C: 碘苷
- D: 阿糖腺苷

答案：B

36. 下述不属于水溶性维生素的是

- A: 维生素 B₁
- B: 维生素 C
- C: 维生素 B₆
- D: 维生素

答案：D

37. 联用治疗布氏杆菌感染的是

- A: 青霉素和磺胺嘧啶
- B: 链霉素和磺胺嘧啶
- C: 链霉素和异烟肼
- D: 青霉素和链霉素

答案：B

38. 属于 β 受体激动剂的非强心苷类的正性肌力药是()

- A: 地高辛
- B: 多巴酚丁胺
- C: 依那普利
- D: 米力农

答案：B

39. 为避免继发真菌感染，使用后应立即漱口的药物是

- A: 羧甲司坦口服液
- B: 孟鲁司特片
- C: 布地奈德福莫特罗吸入剂
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：C

40. 若无禁忌,冠心病或缺血性脑卒中患者均应长期使用的药物是

- A: 依诺肝素
- B: 阿司匹林
- C: 肝素
- D: 氯吡格雷

答案：B

41. 可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是

- A: 甲巯咪唑片
- B: 甲状腺片
- C: 卡比马唑片
- D: 复方碘口服液

答案：A

42. 关于乙酰半胱氨酸的说法,错误的是()

- A: 乙酰半胱氨酸能减弱青霉素类、头孢菌素类四环素类药物的抗菌活性
- B: 乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚中毒解救
- C: 对痰液较多的患者,乙酰半胱氨酸可与中枢性镇咳药合用增强疗效
- D: 乙酰半胱氨酸能裂解脓痰中糖蛋白多肽链中的二硫键,使浓痰易于咳出

答案：C

43. 糖尿病患者、颅内活动性出血患者禁用()

- A: 硫酸镁
- B: 乳果糖
- C: 甘油
- D: 聚乙二醇 4000

答案：C

44. 属于脂肪酸类抗癫痫药的代表药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 氯硝西泮

C: 丙戊酸钠

D: 加巴喷丁

答案: C

45. 不耐酸，口服剂型多制成酯化物，为肝药酶抑制剂的药物是

A: 红霉素

B: 克拉霉素

C: 氟曲南

D: 克林霉素

答案: A

46. 可用于鼻部血管收缩的肾上腺素 α 受体激动药是

A: 西地碘

B: 羟甲唑啉

C: 桃金娘油

D: 复方薄荷油

答案: B

47. 甲状腺素的合成需要()

A: 过氧化物酶

B: 蛋白水解酶

C: 碳酸酐酶

D: 环氧化酶

答案: A

48. 可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是()

A: 头孢米诺

B: 头孢唑林

C: 头孢他啶

D: 头孢呋辛

答案: C

49. 普通感冒患者,有单纯性咳嗽症状,宜选用的药物是()

A: 茶碱缓释片

B: 氯苯那敏片

C: 对乙酰氨基酚滴剂

D: 右美沙芬片

答案: D

50. 关于使用依折麦布的说法, 错误的是

A: 剂量超过 10mg / d 对降低 LDL 水平无增效作用

B: 成人剂量一次 10mg。一日 1 次

C: 可单独服用或与他汀类联合应用

D: 需空腹服用

答案: D

51. 夜盲症患者应选用的维生素是

A: 维生素 A

B: 维生素 B

C: 维生素 D

D: 维生素 B

答案: A

52. (2018 年真题) 配制静脉输液时;应先用灭菌注射用水溶解,然后用 5%葡萄糖注射液稀释,不可用氯化钠注射液稀释的抗真菌药是 ()

A: 氟康唑

B: 两性霉素 B

C: 卡泊芬净

D: 伏立康唑

答案：B

53. 用硝基咪唑类药物后出现神经系统反应的是

A: 有活动性中枢神经系统疾病者

B: 新生儿

C: 妊娠期妇女

D: 老人

答案：A

54. (2019 年真题) 与体内过氧化物和自由基结合，保护细胞中含巯基的蛋白质和酶，参与多种有毒物质解毒反应的药物是 ()

A: 甘草酸二铵

B: 多烯磷脂酸胆碱

C: 葡醛内酯

D: 还原型谷胱甘肽

答案：D

55. 维生素 A 缺乏时引起

A: 成人佝偻病

B: 坏血病

C: 脚气病

D: 角膜软化症

答案：D

56. 通过干扰真菌细胞膜麦角固醇的合成导致真菌死亡的是

- A: 制霉菌素
- B: 阿莫罗芬
- C: 环吡酮胺
- D: 特比萘芬

答案：B

57. 单纯疱疹性或溃疡性角膜炎患者禁用()

- A: 氯霉素
- B: 利福平
- C: 夫西地酸
- D: 四环素可的松

答案：D

58. 治疗膀胱过度活动症宜选用

- A: 利血平
- B: 托特罗定
- C: 尼莫地平
- D: 坦洛新

答案：B

59. 能选择性地兴奋子宫平滑肌，使其产生节律性收缩，并软化和扩张子宫颈，促使宫口开全和胎儿娩出，临床用于中期引产、足月妊娠引产及治疗性流产的药物是

- A: 缩宫素
- B: 地诺前列酮
- C: 普拉睾酮
- D: 麦角新碱

答案：B

60. 链激酶的作用机制是

- A: 抑制血小板聚集
- B: 抑制维生素 K 在肝细胞合成凝血因子
- C: 促进纤维蛋白溶解
- D: 加速抗凝血酶Ⅲ的作用

答案：C

61. 吸收后代谢成活性产物而发挥抗甲型和乙型流感病毒的前体药物是
()

- A: 金刚烷胺
- B: 扎那米韦
- C: 金刚乙胺
- D: 奥司他韦

答案：D

62. 血管紧张素 I 转化酶抑制剂是

- A: 依那普利
- B: 地高辛
- C: 多巴酚丁胺
- D: 米力农

答案：A

63. 属于必需磷脂类的保肝药是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 联苯双酯
- D: 甘草酸二胺

答案：A

64. 肝功能减退患者可按原治疗量应用而肾功能减退患者需减量使用的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 青霉素
- C: 异烟肼
- D: 红霉素

答案：B

65. (2016 年真题) 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是

- A: 阿托伐他汀
- B: 非诺贝特
- C: 阿昔莫司
- D: 依折麦布

答案：A

66. 可与阿司匹林发生相互作用的是

- A: 坎利酮
- B: 伐地那非
- C: 呋塞米
- D: 丙酸睾酮

答案：A

67. 属于贝丁酸类调节血脂药的是

- A: 非诺贝特
- B: 阿托伐他汀
- C: 阿昔莫司

D: 依折麦布

答案：A

68. 格列本脲的降糖作用机制是

A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

B: 艾塞那肽

C: 胰岛素皮下注射

D: 二甲双胍

答案：A

69. 患者，男，25 岁。上腹灼痛、反酸，疼痛多出现在早上 10 点及下午 4 点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X 线钡餐检查：十二指肠溃疡。

A: 阿莫西林和四环素

B: 哌仑西平和西咪替丁

C: 兰索拉唑和阿莫西林

D: 米索前列醇和四环素

答案：C

70. 角鲨烯环氧酶的非竞争性、可逆性抑制剂是

A: 阿莫罗芬

B: 环吡酮胺

C: 制霉菌素

D: 特比萘芬

答案：D

71. 患者，男，58 岁。最近出现多饮、多尿和体重下降等不正常身体状况就诊，检查发现血糖高，诊断为 2 型糖尿病，轻度心功能不全，医嘱选择磺酰脲类促胰岛素分泌药治疗。

- A: 格列本脲
- B: 格列齐特
- C: 格列美脲
- D: 格列喹酮

答案：A

72. 治疗血吸虫病宜选用

- A: 甲硝唑
- B: 氯喹
- C: 吡喹酮
- D: 甲苯咪唑

答案：C

73. 他汀类所引起的肝损害特点不包括

- A: 肝毒性与剂量无关
- B: 使用辛伐他汀当转氨酶升高至正常值上限的 3 倍需停药
- C: 当转氨酶升高至正常值上限的 3 倍以上，需要减量或停药
- D: 所有他汀类药物都产生肝毒性

答案：A

74. 关于万古霉素，描述错误的是

- A: 属于杀菌剂
- B: 肾功能不全者无需调整剂量
- C: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成
- D: 可用于对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染

答案：B

75. 整合素受体阻断剂的机制

- A: 抑制葡萄糖脱氢酶
- B: 使血小板内 cAMP 浓度增高而产生抗血小板作用
- C: 抑制血小板表面的 ADP 受体
- D: 抑制纤维蛋白原与血小板膜表面糖蛋白受体的结合

答案：D

76. 能治疗强心苷中毒引起的异位心律的是

- A: 利血平
- B: 阿托品
- C: 哌替啶
- D: 苯妥英钠

答案：D

77. 放射性碘

- A: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧
- B: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状
- C: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成
- D: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌

答案：D

78. 以下药物肾结石患者禁用的是

- A: 秋水仙碱
- B: 苯溴马隆
- C: 别嘌醇
- D: 非布司他

答案：B

79. 原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙 40mgqd”静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是

- A: 泼尼松片 30mgq
- B: 地塞米松片 10mgqD
- C: 泼尼松片 50mgqD
- D: 泼尼松片 20mgqD

答案：C

80. (2017 年真题) 可降低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油, 主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是 ()

- A: 阿昔莫司
- B: 利血平
- C: 瑞舒伐他汀
- D: 依折麦布

答案：A

81. 有关可乐定的叙述，错误的是

- A: 可乐定是中枢性降压药
- B: 可乐定可用于治疗重度高血压
- C: 可乐定可用于治疗中度高血压
- D: 可乐定可用于治疗高血压危象

答案：B

82. 硫酸亚铁临床应用

- A: 急性中性粒细胞减少症

- B: 缺血性脑卒中
- C: 缺铁性贫血
- D: 失去药效

答案：C

83. 没有镇静和"宿醉"现象，不属于巴比妥类和苯二氮

- A: 异戊巴比妥
- B: 佐匹克隆
- C: 阿普唑仑
- D: 地西泮

答案：B

84. 被还原后的代谢物可抑制细菌的 DNA 代谢过程，促使细菌死亡，并可抑制阿米巴原虫的氧化还原反应，使原虫的氮链发生断裂的是

- A: 替硝唑
- B: 莫西沙星
- C: 甲氧苄啶 (TMP)
- D: 磺胺甲噁唑 (SMZ)

答案：A

85. 下列关于过氧化氢的用法及注意事项，叙述错误的是

- A: 遇氧化物或还原物即迅速分解并产生泡沫
- B: 遇光稳定，不易变质
- C: 避免皮肤及黏膜接触高浓度溶液
- D: 妊娠及哺乳期妇女慎用

答案：B

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/746212214101011030>