

2024 江苏省邳州市《执业药师之西药学专业二》考试题库大全带答案（夺分金卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2019 年真题）长期用药易发生低镁血症的药物是（）

- A: 奥美拉唑
- B: 复方碳酸钙
- C: 胶体果胶铋
- D: 替普瑞酮

答案：A

2. 曲霉菌主要通过呼吸道侵入机体，主要侵犯（）

- A: 肺脏
- B: 心脏
- C: 脑
- D: 窦腔

答案：A

3. 需要迅速抗血小板作用时，不能选用的二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂是

- A: 替罗非班
- B: 氯吡格雷
- C: 噻氯匹定
- D: 替格雷洛

答案：C

4. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 磺胺甲噁唑
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺米隆

答案: C

5. 下列抗心律失常药中，属于 β 受体阻断剂的代表药是()。

- A: 溴苄胺
- B: 普萘洛尔
- C: 索他洛尔
- D: 胺碘酮

答案: B

6. 选择性抑制 COX-2 的药物是

- A: 吲哚美辛
- B: 布洛芬
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 塞来昔布

答案: D

7. 多柔比星与可能致肝功损害的药物配伍使用，可能()

- A: 增加肝毒性
- B: 导致坏死性结肠炎
- C: 易产生沉淀
- D: 增加心脏毒性

答案: A

8. 属于头霉素类抗菌药物的是

- A: 头孢美唑
- B: 头孢他啶
- C: 氨曲南
- D: 头孢噻肟

答案：A

9. 能使凝血因子 I 降解为纤维蛋白单体的药物是()

- A: 鱼精蛋白
- B: 蛇毒血凝酶
- C: 甲萘氢醌
- D: 卡巴克络

答案：B

10. 抑制细菌核酸合成的抗菌药物是

- A: 利福喷丁
- B: 头孢吡肟
- C: 头孢米诺
- D: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶

答案：A

11. 广谱抗菌药，对细胞内外的结核分枝杆菌、麻风杆菌均有抑制作用的是

- A: 乙胺丁醇
- B: 吡嗪酰胺
- C: 利福平
- D: 异烟肼

答案：C

12. 长期大量与阿司匹林或其他 NSAID 合用时，可明显增加肾毒性的是

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 吲哚美辛
- D: 塞来昔布

答案：B

13. 直接影响 DNA 结构和功能的药物是()

- A: 氟尿嘧啶
- B: 多柔比星
- C: 顺铂
- D: 高三尖杉酯碱

答案：C

14. 主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

- A: 利血平
- B: 依折麦布
- C: 瑞舒伐他汀
- D: 阿昔莫司

答案：C

15. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

- A: 紫杉醇
- B: 依托泊苷
- C: 顺铂
- D: 来曲唑

答案：B

16. 氯霉素抗菌谱广，而最主要的不良反应是()

- A: 胃肠道反应
- B: 对肝脏严重损害
- C: 对造血系统的毒性
- D: 二重感染

答案: C

17. 患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

- A: 延迟性恶心呕吐
- B: 预期性恶心呕吐
- C: 爆发性恶心呕吐
- D: 急性恶心呕吐

答案: D

18. 以下不属于胰岛素的不良反应的是()

- A: 脂肪萎缩与肥厚
- B: 低血糖
- C: 胰岛素抵抗
- D: 高钾血症

答案: D

19. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是()

- A: 维拉帕米
- B: 胺碘酮
- C: 美托洛尔
- D: 地尔硫

答案：B

20. 可能导致耳蜗神经和肾损害的抗菌药物是

- A: 甲砷霉素
- B: 多西环素
- C: 加替沙星
- D: 庆大霉素

答案：D

21. 易引起过敏性休克的药物是()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 链霉素
- C: 青霉素
- D: 四环素

答案：C

22. 减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定，属于乙内酰脲类抗癫痫药的是

- A: 加巴喷丁
- B: 苯巴比妥
- C: 苯妥英钠
- D: 卡马西平

答案：C

23. 属于必需氨基酸，人体不能合成或合成速度不能满足人体需要()

- A: 复方氨基酸注射液(3AA)
- B: 赖氨酸
- C: 复方氨基酸注射液(18AA)

D: 精氨酸

答案：B

24. 抗阿米巴原虫药的药物是()。

A: 氯喹

B: 奎宁

C: 甲硝唑

D: 伯氨喹

答案：C

25. (2017 年真题) 夜盲症可以使用的治疗药物是 ()

A: 维生素 B1

B: 维生素 D

C: 维生素 A

D: 维生素 B2

答案：C

26. 以下哪种药物对心脏影响最轻

A: 沙丁胺醇

B: 茶碱

C: 肾上腺素

D: 异丙肾上腺素

答案：A

27. 去乙酰毛花苷在体内失去葡萄糖基和乙酸转化为

A: 毛花苷丙 (西地兰 C)

B: 去乙酰毛花苷 (西地兰 D)

C: 洋地黄毒苷

D: 地高辛

答案: D

28. 高血压合并痛风者不宜使用

A: 氢氯噻嗪

B: 硝苯地平

C: 阿替洛尔

D: 依那普利

答案: A

29. (2021 年真题) 患者，男，65 岁。患有 2 型糖尿病，长期服用降糖药，同时长期服用阿司匹林肠溶片 (100mg/d) 预防心脑血管疾病。近期拟行髋关节置换手术，为减少出血风险，宜采取的措施是 ()。

A: 停用阿司匹林 7-10 天后，再行手术

B: 无需停用阿司匹林，也无需加用其他药物预防出血

C: 停用阿司匹林 3 天后，再行手术

D: 无需停用阿司匹林，在手术日加用维生素 K1 预防出血

答案: A

30. (2019 年真题) 伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是 ()

A: 长效 β_2 受体激动剂

B: M 胆碱受体阻断剂

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D: 白三烯受体阻断剂

答案: B

31. 用于表面麻醉、阻滞麻醉的局部麻醉药是

A: 布地奈德

B: 利多卡因

C: 西地碘

D: 普鲁卡因

答案：B

32. 巨幼细胞贫血应首选

A: 叶酸+维生素 B12

B: 亚叶酸钙

C: 维生素 B6

D: 维生素 B12

答案：A

33. 有减轻体重作用的口服降糖药是

A: 达格列净

B: 吡格列酮

C: 那格列奈

D: 格列苯脲

答案：A

34. 治疗急性阿米巴痢疾和阿米巴肝脓肿应首选

A: 依米丁

B: 二氯尼特

C: 甲硝唑

D: 氯喹

答案：C

35. 既有抗病毒作用又有抗肿瘤作用的免疫调节剂是

A: 硫唑嘌呤

B: 环磷酰胺

C: 干扰素

D: 更昔洛韦

答案: C

36. 抑制蛋白质合成与功能的药物是()

A: 高三尖杉酯碱

B: 多柔比星

C: 氟尿嘧啶

D: 顺铂

答案: A

37. 细胞内液的主要阳离子是

A: 钠

B: 钙

C: 钾

D: 镁

答案: C

38. 患者，男，60岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

A: CYP2C19

B: CYP286

C: CYP2E1

D: CYP2D6

答案: A

39. 患者，女，46 岁。肝硬化腹水患者，长期使用噻嗪类利尿药不会引起

- A: 低氯性碱中毒
- B: 低钾血症
- C: 高尿酸血症
- D: 低钙血症

答案：D

40. 对癫痫小发作疗效最好的药物是

- A: 地西泮
- B: 卡马西平
- C: 氯硝西泮
- D: 乙琥胺

答案：D

41. 有指南推荐，为减少手术中和手术后出血风险，择期手术前需提前停用阿司匹林

- A: 1～3 日
- B: 4～6 日
- C: 7～10 日
- D: 11～15 日

答案：C

42. 不易导致便秘或腹泻不良反应的药物是

- A: 碳酸钙
- B: 三硅酸镁
- C: 铝碳酸镁
- D: 氢氧化铝

答案：C

43.（2015 年真题）可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是（ ）。

- A: 噻托溴铵
- B: 多索茶碱
- C: 沙美特罗
- D: 孟鲁司特

答案：A

44.（2015 年真题）静脉滴注速度过快可能发生“红人综合征”的药品是（ ）。

- A: 莫西沙星
- B: 万古霉素
- C: 磷霉素
- D: 夫西地酸

答案：B

45.（2016 年真题）抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反应（ ）

- A: 肺部纹理加重
- B: 急性肾衰竭
- C: 胰腺坏死
- D: 急性肝衰竭

答案：B

46. 氨基酸的主要作用不包括

- A: 合成蛋白质

- B: 调节体内酸碱平衡
- C: 维持氮平衡
- D: 转变为糖或脂肪

答案：B

47. 氟胞嘧啶为

- A: 抗真菌药
- B: 抗滴虫病药
- C: 抗病毒药
- D: 抗血吸虫病药

答案：A

48. 容易引起周围神经炎的抗结核药物是

- A: 乙胺丁醇
- B: 链霉素
- C: 利福平
- D: 异烟肼

答案：D

49. 口服后很少被吸收的口服降糖药是

- A: 阿卡波糖
- B: 达格列净
- C: 罗格列酮
- D: 二甲双胍

答案：A

50. 属于白三烯受体阻断剂的是

- A: 乙酰胆碱

B: 孟鲁司特

C: 异丙托溴

D: 福莫特罗

答案: B

51. (2020 年真题) 消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

A: 对乙酰氨基酚

B: 吲哚美辛

C: 塞来昔布

D: 阿司匹林

答案: C

52. 在体外无抗凝作用，在体内有抗凝作用的是

A: 尿激酶

B: 肝素

C: 噻氯匹定

D: 华法林

答案: D

53. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

A: 美西律

B: 普萘洛尔

C: 地尔硫革

D: 胺碘酮

答案: B

54. 属于 β_2 受体激动剂的平喘药是()

- A: 茶碱
- B: 沙美特罗
- C: 孟鲁司特
- D: 噻托溴铵

答案: B

55. 布地奈德皮下给药的效能约为皮质醇的

- A: 15 倍
- B: 40 倍
- C: 25 倍
- D: 100 倍

答案: B

56. 属于第一代喹诺酮类药物的是

- A: 诺氟沙星
- B: 萘啶酸
- C: 莫西沙星
- D: 吡哌酸

答案: B

57. 用于治疗慢性功能性便秘，也可用于高氨血症的治疗的是

- A: 乳果糖
- B: 开塞露
- C: 酚酞
- D: 聚乙二醇 4000

答案: A

58. 下列对皮肤真菌感染治疗药叙述错误的是()

- A: 奈替芬是丙烯胺类抗真菌药
- B: 阿莫罗芬为唑类的局部抗真菌药
- C: 酮康唑为咪唑类抗真菌药
- D: 环吡酮胺为吡啶酮类抗真菌药

答案：B

59. 阿司匹林的作用是()

- A: 促进纤维蛋白溶解
- B: 抑制纤维蛋白溶解
- C: 促凝血因子合成
- D: 抑制血小板聚集

答案：D

60. 通过抑制血管紧张素转化酶产生作用，长期应用有可能导致血钾升高的降压药是

- A: 哌唑嗪
- B: 硝酸甘油
- C: 维拉帕米
- D: 卡托普利

答案：D

61. 下述药物可引起药物性鼻炎的是

- A: 酚甘油滴耳液
- B: 硼酸甘油滴耳液
- C: 麻黄碱
- D: 过氧化氢溶液

答案：C

62. 以下属于胰高糖素样肽-1 受体激动剂的是

- A: 吡格列酮
- B: 利拉鲁肽
- C: 二甲双胍
- D: 瑞格列奈

答案：B

63. 用于肿瘤放、化疗引起的中性粒细胞缺乏症的药物是()

- A: 非格司亭
- B: 维生素 K
- C: 香豆素类
- D: 氨甲环酸

答案：A

64. 重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

- A: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦
- B: 奥美拉唑+口服地塞米松
- C: 每日化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松
- D: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松

答案：A

65. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

- A: S 期
- B: G
- C: G
- D: M 期

答案：A

66. 服药后尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物均可显橘红色的药物是（）

- A: 吡嗪酰胺
- B: 乙胺丁醇
- C: 链霉素
- D: 利福平

答案：D

67. 下述药物中不可用于治疗疥疮的是（）

- A: 硫黄软膏
- B: 林旦霜
- C: 苯甲酸苄酯
- D: 过氧苯甲酰

答案：D

68. （2019 年真题）患者，女 75 岁，既往有 2 型糖尿病史 18 年，有青霉素过敏史，因车祸导致左下肢开放性骨折，术后发生骨髓炎，给予克林霉素治疗 10 余天，临床应关注的典型不良反应是（）

- A: 抗生素相关性腹泻
- B: 肌肉震颤
- C: 红人综合征
- D: 急性溶血性贫血

答案：A

69. 使用氢化可的松大剂量冲击治疗时，用药时间一般不超过

- A: 5 日
- B: 1 日

C: 3 日

D: 7 日

答案: C

70. 无抗结核作用的是

A: 红霉素

B: 吡嗪酰胺

C: 异烟肼

D: 乙胺丁醇

答案: A

71. (2016 年真题) 鱼精蛋白可用于救治

A: 华法林过量导致的出血

B: 肝素过量导致的出血

C: 异烟肼中毒导致的神经毒性

D: 吗啡过量导致的呼吸抵制

答案: B

72. 钾离子竞争性酸抑制剂的作用机制是

A: 竞争性拮抗组胺与胃壁细胞上的 H₂受体结合

B: 抑制乙酰胆碱 M 受体

C: 通过二硫键与质子泵的巯基呈不可逆性的结合

D: 通过竞争胃壁细胞膜腔面的钾离子来发挥作用

答案: D

73. 属于芳基乙酸类的是

A: 吲哚美辛

B: 阿司匹林

C: 塞来昔布

D: 对乙酰氨基酚

答案: A

74. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而引起抗抑郁作用的药物是 ()

A: 度洛西汀

B: 帕罗西汀

C: 马普替林

D: 吗氯贝胺

答案: B

75. 成人口服左甲状腺素替代治疗，开始剂量每日 25~50 μg ，每 2 周增加

A: 4 μg / kg

B: 6 μg / kg

C: 25 μg

D: 5 μg / kg

答案: C

76. 柔红霉素可引起心脏毒性，临床应用的解毒方案是

A: 在用柔红霉素前 30 分钟，使用柔红霉素两倍量的氟马西尼

B: 在用柔红霉素前 30 分钟，使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生

C: 在用柔红霉素的同时，使用柔红霉素等量的右雷佐生

D: 在用柔红霉素后 30 分钟，使用柔红霉素两倍量的右雷佐生

答案: B

77. 可见头晕、耳鸣、视力减退、出汗等不良反应的是

A: 甲萘氢醌

- B: 卡巴克络
- C: 蛇毒血凝酶
- D: 氨基己酸

答案：B

78. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。

医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

- A: 不会导致锥体外系反应
- B: 不会导致催乳素增多
- C: 不会导致 Q-T 间期延长及室性心律失常
- D: 不会促进乙酰胆碱的释放

答案：D

79. 胰岛素的不良反应有

- A: 酮症酸中毒
- B: 骨髓抑制
- C: 高血糖高渗性昏迷
- D: 低血糖昏迷

答案：D

80. 对多巴胺描述正确的是()

- A: 对洋地黄和利尿药无效的心功能不全，多巴胺也无效
- B: 可用于充血性心力衰竭等引起的休克综合征
- C: 对其他拟交感胺类药物高度敏感的患者应该使用多巴胺
- D: 是磷酸二酯酶抑制剂

答案：B

81. 治疗伤寒、副伤寒的首选药是

- A: 诺氟沙星
- B: 氯霉素
- C: 四环素
- D: 青霉素

答案：B

82. 可能引起持续性干咳的抗高血压药是

- A: 阿利克仑（阿利吉仑）
- B: 氨氯地平
- C: 阿托普利
- D: 硝普钠

答案：C

83. 临床最常用的强心苷类正性肌力药是

- A: 米力农
- B: 多巴酚丁胺
- C: 依那普利
- D: 地高辛

答案：D

84. 铂类化合物治疗期间，需要每周检查的项目是

- A: 血钙
- B: 全血计数
- C: 肾功能
- D: 肝功能

答案：B

85. 使用环磷酰胺化疗，以下检查结果可能升高的是

- A: 白细胞计数
- B: 血小板计数
- C: 血红蛋白
- D: 尿酸

答案：D

86. 噻托溴铵平喘的主要机制是 ABCDE

- A: 拮抗 M 胆碱受体
- B: 阻断腺苷受体
- C: 激动肾上腺素 β_2 受体
- D: 抑制白三烯受体

答案：A

87. 抗菌谱广，抗菌活性均类似于头孢噻肟的药物是

- A: 拉氧头孢
- B: 头孢孟多
- C: 氨曲南
- D: 头孢氨苄

答案：A

88. 作用于髓袢升支粗段的利尿剂是

- A: 醛固酮受体阻断剂
- B: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂
- C: 袢利尿剂

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 碳酸酐酶抑制剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/746240042054011030>