

2023 年度主治医师之内科主治 303 易错

题库与答案

单选题（共 55 题）

1、支气管扩张常见痰液性状为

- A. 白色泡沫痰
- B. 黄色脓痰，久置分层
- C. 粉红色泡沫痰
- D. 砖红色胶冻状痰
- E. 铁锈色痰

【答案】 B

2、诊断早期糖尿病肾病的指标（ ）

- A. 尿微量白蛋白
- B. OGTT
- C. GAD65
- D. 糖化血红蛋白
- E. 尿糖

【答案】 A

3、疟疾的典型热型为

- A. 波状热
- B. 弛张热

- C. 间歇热
- D. 不规则热
- E. 稽留热

【答案】 C

4、抢救肾上腺危象，下列说法正确的是

- A. 补液治疗
- B. 立即进行病因治疗
- C. 静脉滴注糖皮质激素，补充盐水、葡萄糖及治疗存在的应激状态
- D. 进行基础治疗
- E. 立即手术治疗

【答案】 C

5、对结核性腹膜炎有确定诊断价值的是

- A. 血沉快
- B. 腹膜炎体征
- C. 腹胀，腹痛
- D. 发热，乏力
- E. 消瘦，贫血

【答案】 B

6、男性，50岁，体重80kg，身高165cm，平素体健，近被疑似糖尿病。此患者首选

- A. 饮食控制后行 OGTT 检查

- B. 尿酮
- C. 复查血糖及尿糖
- D. OGTT检查
- E. 饮食控制后复查血糖及尿糖

【答案】 D

7、女性，8岁，因贫血、脾大入院。检验：HGB90g/L WBC $8.8 \times 10^9/L$

- A. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- B. 自身免疫性溶血性贫血
- C. 珠蛋白生成障碍性贫血
- D. 遗传性球形红细胞增多症
- E. G6PD缺乏症

【答案】 C

8、蛛网膜下腔出血合并急性肾衰竭首选

- A. 间歇性血液透析
- B. CRRT
- C. 腹膜透析
- D. 血液灌流
- E. 血浆置换

【答案】 B

9、男，7岁，偷吃家里腌制的咸菜，10分钟后口唇、耳廓青紫，身边老人叙述是“乌鸦嘴”送到医院，首先给予的治疗是

- A. 多饮水
- B. 静脉滴注葡萄糖
- C. 吸氧
- D. 洗胃、催吐和导泻
- E. 给镇静剂

【答案】 D

10、锥体外病变可表现为

- A. 折刀样强直
- B. 静止性震颤
- C. 腱反射亢进
- D. 共济失调步态
- E. 肢体瘫痪

【答案】 B

11、肺结核

- A. 咳嗽、咳痰伴喘息持续 3 个月，连续 2 年以上常见于
- B. 慢性咳嗽、大量脓痰，反复咯血常见于
- C. 劳力性呼吸困难伴咳嗽、咯血常见于
- D. 午后低热、盗汗、咳嗽、咳痰、痰中带血常见于
- E. 寒战、高热、胸痛、铁锈色痰常见于

【答案】 D

12、慢性支气管炎

- A.咳嗽、咳痰伴喘息每年持续3个月，连续2年以上
- B.午后低热、盗汗、咳嗽、咳痰、痰中带血
- C.寒战，高热，脓痰，白细胞升高，胸部X线：肺气囊肿，脓胸，肺脓肿
- D.寒战，高热，胶冻样痰，胸部X线：肺脓肿，叶间裂下坠
- E.寒战、高热、胸痛、铁锈色痰

【答案】 A

13、骨质疏松症的临床表现为

- A.桡骨骨折是最常见的并发症
- B.疼痛是最常见、最主要的症状
- C.椎体骨折危害最大
- D.肋骨骨折可引起驼背和身材变矮
- E.无明显症状

【答案】 B

14、下述哪一点不符合神经内分泌细胞特征

- A.属于一些特化的神经细胞
- B.通过胞突接受神经冲动
- C.由轴突释放神经递质
- D.由轴突释放激素物质
- E.释放的激素经血运输后，发挥作用

【答案】 C

15、属于生产工艺过程的化学因素的是

- A.X射线
- B.过度心理紧张
- C.附于皮毛上的炭疽杆菌
- D.矽尘、煤尘、有机粉尘
- E.有毒工段与无毒工段设在同一车间

【答案】 D

16、女性，23岁，牙龈出血伴月经过多1年，体检双下肢可见散在出血点及紫癜，肝脾不大，血红蛋白90g/L，白细胞 $5.5 \times 10^9/L$

- A.免疫抑制剂
- B.肾上腺皮质激素
- C.脾切除
- D.输血小板浓缩液
- E.抗纤溶药物

【答案】 B

17、轻度急性氨基甲酸酯类农药中毒时，首选的解毒方法是

- A.阿托品和氯解磷定联合使用
- B.小剂量阿托品加对症治疗
- C.使用氯解磷定加对症治疗
- D.单独使用氯解磷定
- E.单独大剂量使用阿托品，并达阿托品化

【答案】 B

18、女性，47岁，因尿频、尿痛1周入院，尿常规蛋白(-)，白细胞++ / HP，红细胞3~4个 / HP，尿培养有大肠杆菌生长，临床考虑急性尿路感染，为进一步行上下尿路感染的鉴别，以下检查具有一定的参考价值的是

- A.内生肌酐清除率
- B.V-PCO
- C.酚红排泄试验
- D.连续测定尿渗透压
- E.NH

【答案】 D

19、女性患者，70岁，3年来出现发作性右侧面颊部烧灼样疼痛，每次发作持续时间数十秒，发作间期如常人

- A.卡马西平
- B.泼尼松
- C.丙戊酸钠
- D.B族维生素
- E.心得安

【答案】 A

20、女性，36岁，主诉头晕、乏力，3年来月经量多，浅表淋巴结及肝、脾无肿大，血红蛋白58g/L，白细胞 $8.0 \times 10^9/L$

A.MCV MCH MCHC

B.染色体检查

C.血清铁蛋白检查

D.血清铁和总铁结合力

E.骨髓检查

【答案】 B

21、高血压的流行病学调查中，以下因素未确定与发病有关的是

A.体重

B.钠盐

C.遗传

D.膳食中的脂肪

E.精神应激

【答案】 D

22、在功能性垂体瘤中，最常见的是

A.生长激素瘤

B.生长激素泌乳素混合瘤

C.泌乳素瘤

D.促甲状腺素瘤

E.促肾上腺皮质激素瘤

【答案】 C

23、我国流行最广、易变成慢性腹泻的菌株

- A.志贺痢疾杆菌
- B.鼠伤寒沙门菌
- C.福氏痢疾杆菌
- D.副溶血性弧菌
- E.轮状病毒

【答案】 C

24、下列不是胃恶性溃疡的征象的是

- A.胃液分析见胃酸正常或偏低，但无真性缺酸
- B.粪便隐血持续阳性
- C.龛影常 $>2.5\text{cm}$ ，边不整，位于胃腔轮廓之内
- D.形状不规则，底凹凸不平，边缘结节隆起，污秽苔
- E.龛影周围胃壁僵直，呈结节状，向溃疡聚集的皱襞有融合中断现象

【答案】 A

25、胃溃疡首选的检查方法是

- A.腹部 CT
- B.肠镜
- C.腹部 B超
- D.胃镜
- E.粪便潜血

【答案】 D

14岁。身高132cm，体重24kg，形体均匀矮小，头颅无畸形，智力发育一般

- A.GH降低，骨龄延迟，ACTH水平正常
- B.GH升高，骨龄延迟，ACTH水平正常
- C.GH正常，骨龄延迟，ACTH水平正常
- D.GH下降，骨龄正常，ACTH水平增高
- E.GH降低，骨龄延迟，ACTH水平稍低

【答案】 B

27、()是城市区域性的交通干道，为区域交通集散服务，兼有服务功能。

- A.快速路
- B.主干路
- C.次干路
- D.支路

【答案】 C

28、男性，54岁，因用力后出现胸背部疼痛就诊，查体：肝脾不大，血常规未见异常。胸片见肋骨及胸骨多处溶骨性破坏。骨髓异常浆细胞0.54，血清蛋白电泳出现窄底高峰，尿蛋白(+++)，最可能的诊断为

- A.淋巴瘤
- B.多发性骨髓瘤

D. 类风湿关节炎

E. 骨髓转移癌

【答案】 B

29、男性农民，于12月中旬来诊，发热4天，体温38~39.5℃，畏寒、头痛、周身酸痛、食欲缺乏、腹胀，咽部不适、轻咳。查体：神清，面部及上胸部皮肤潮红，腋下有2~3个出血点，眼结合膜充血，心肺正常，肝脾未及，肾区叩击痛(+)。血压80/60mmHg 尿蛋白(+++)，红、白血细胞各3~5个/HP，颗粒管型1~2个/HP。血红蛋白156g/L，白细胞 $14.8 \times 10^9 / L$ ，N0.79，L0.21。

A. 中毒性休克

B. 感染性休克

C. 失血浆性休克

D. 心源性休克

E. 以上都不是

【答案】 C

30、男性，25岁，胸痛憋气。胸部X线检查发现右下肺野有巨大(8cm×9cm)、境界较清晰的囊腔性病变，双弓征阳性

A. 局限性胸膜间皮细胞瘤

B. 含液支气管肺囊肿

C. 巨大肺包虫囊肿

E. 肺癌伴组织坏死

【答案】 C

31、预防肺结核的最主要措施是

A. 隔离和有效治疗排菌患者

B. 禁止随地吐痰

C. 加强登记管理

D. 健全防痨组织

E. 接种卡介苗，化疗

【答案】 A

32、某男，年龄 37 岁，建筑工人，长期从事使用各种振动工具搅拌水泥等工作。因手指麻木和感觉异常等症状而就诊。此工人可能患

A. 风湿性关节炎

B. 骨关节病

C. 局部振动病

D. 周围神经炎

E. 末梢神经炎

【答案】 C

33、原发性肝细胞癌

A. AFP 阳性

B. CEA 明显升高

D.CA125增高

E.CA19-9 增高

【答案】 A

34、 皮肤型囊尾蚴病

A.先进行降低颅内压治疗

B.必须手术治疗

C.首选阿苯达唑治疗

D.首选喹诺酮治疗

E.首选吡喹酮治疗

【答案】 C

35、 在传染性肝炎流行区，确定肝炎的原因比较困难，如肝炎严重，肺结核又必须治疗，可考虑使用的方案为

A.2SHE/ 10HE

B.3SHE/ 9H

C.1SHR/ 8HE

D.2SHZ/ 10HZ

E.4SHE/ 10HE

【答案】 A

36、 老年男性患者，大量蛋白尿、低蛋白血症，已确诊肾病综合征。

对于感染并发症，防治措施不恰当的是

生素积极治疗

- B.有明确感染灶者应尽快去除
- C.严重感染难控制时应考虑减少或停用激素
- D.通常在激素治疗时需应用抗生素预防感染，否则达不到预防目的
- E.在激素治疗时无需应用抗生素预防感染，可能诱发真菌二重感染

【答案】 D

37、十二指肠球部溃疡可出现

- A.多为上腹正中或偏右节律性疼痛
- B.上腹持续性剧痛、放射至背后
- C.多为剑突下正中或偏左节律性疼痛
- D.上腹疼痛无典型节律性、呕吐多见
- E.右上腹节律性疼痛，夜间痛和背部疼痛多见且突出

【答案】 A

38、类风湿关节炎的遗传易感基因是

- A.HLA-B27
- B.HLA-DR3
- C.HLA-DR4
- D.HLA-DR5
- E.HLA-DR2

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/747102026002006156>