病理学试题库

第一部分　组织和细胞的损伤与修复

一、是非题`

1．湿性坏疽属液化性坏死，而干性坏疽属凝固性坏死。（ 1 ）

2．坏死细胞核的改变为核固缩，核碎裂，核溶解。（ 1 ）

3．不完全再生早期常以肉芽组织代替坏死组织。（　　）

4．纤维素样变性实质上就是纤维素样坏死。（　　）

5．肉芽组织及肉芽肿内均有较多的纤维母细胞。（　　）

6．脂肪变性有时也可以见于细胞外。（　　）

7．气球样变性是脂肪变性的一种类型，制片过程中脂肪溶解，细胞呈气球样。（　　）

8．脑组织坏死多属凝固性坏死。（　　）

9．由于实质细胞数量增多而造成组织器官体积的增大称肥大。（ ）

10．干酪样坏死的镜下特征是组织轮廓保持一段时间。（　　）

11．骨再生能力弱，因此骨折后须固定。（　　）

12．坏疽是组织坏死后继发腐败菌感染而形成的特殊形态。（　　）

13．萎缩的器官其体积均缩小。（　　）

14．变性是指细胞内出现了异常物质或正常物质数量增多。（　　）

15．凡是组织器官的体积变小都称为萎缩。（　　）

16．气球样变，水变性、脂肪变性和纤维素样变性均属可复性的病变。（　　）

17．结缔组织玻变在镜下可见一片模糊的颗粒状无结构的红染物质。（　　）

18．生理性再生属完全再生，而病理性再生属于不完全再生。（　　）

19．外周神经纤维损伤时，如其相连神经细胞未受损，可完全再生。（　　）

20．骨和软骨的再生能力很强．故损伤后一般均能完全再生。（　　）

21．机体组织细胞的死亡称坏死．是一种不可逆性的损伤。（　　）

22．干酪样坏死及脂肪坏死均属凝固性坏死。（　　）

23．骨折后骨组织可通过完全再生而修复。（　　）

24．肺出血性梗死并腐败菌感染即为湿性坏疽。（　　）

25．二期愈合见于组织缺损大，创缘不整，伴感染的伤口。（　　）

26．支气管粘膜上皮出现鳞状上皮化生，属于适应性改变。（　　）

二、填空题

1．骨折愈合的过程可分为血肿形成、纤维性骨痂形成、骨性骨痂形成、骨痂改建或重塑四个阶段。

2．鳞状上皮化生最常见于气管、支气管。

3．Mallory小体是指肝细胞玻璃样变。

4．坏死的结局有溶解吸收、分离排出、机化包裹、钙化。

5．常见的变性有玻璃样变、水变性、脂肪变、_____、_____。

6．常见病理性萎缩有_____、_____、_____、_____、_____五种。

7．机体的适应性改变有_____、_____、_____、_____四种类型。

8．形态学上可将坏死分为_____、_____、_____、_____四种类型。

9．玻璃样变性有_____、_____和_____三种。

10．按再生能力，可将人体组织或细胞分为_____、_____、_____三类。

11．苏丹III染色可将_____。

12．水变性和脂变的原因常是_____、_____、_____。

13．肉芽组织镜下主要由_____和_____构成。

14．水变性、脂肪变性最常见于_____、_____、_____等脏器。

15．坏死细胞的细胞核改变有_____、_____和_____。

16．再生能力最强的细胞有_____、_____等．不能再生的细胞有_____。再生力弱或不能再生的组织或细胞损伤后通过_____修复。

17．常见的细胞内变性有_____、_____、_____、_____。

18．伤口愈合的过程是_____、_____、_____和_____。

三、名词解释

化生(Metaplasia)变性；虎斑心；萎缩；酶解性组织坏死；机化；肉芽组织；坏死；瘢痕组织(iscar tissue)；坏疽；水变性；肥大与增生；再生；Mallory小体；凝固性坏死；干酪样坏死；核碎裂(karyopyknosis)；气球样变性(ballooning degeneration)

四、选择题

1．易发生干性坏疽的器官是：D

A．肺　　B．阑尾　　C．膀胱

D．四肢　　E．子宫

2．细胞水肿和脂变常发生在：E

A．肺、脾、肾　　B．心、脾、肺

C．心、肝、肠　　D．肝、肾、脾

E．心、肝、肾

3．下列哪种组织再生能力最强A

A．腺体　　B．骨骼肌　　C．神经细胞

D．软骨　　E．平滑肌

4．缺碘所致的甲状腺肿大属于E　A

A．过再生性增生　　B．再生性增生

C．甲状腺肥大　　D．内分泌障碍性增生

E．甲状腺增生合并肥大

5．“肥大”是指：D

A．实质细胞数目增多

B．实质细胞体积增大

C．组织、器官体积的增大

D．是细胞、组织、器官体积的增大

E．间质增生

6．在组织学上看到有细胞核固缩、碎裂、溶解时．说明：D

A．细胞正开始死亡　　B．细胞的功能还有可能恢复

C．细胞的功能虽然可能恢复．但已极为困难

D．细胞已经死亡了一段时间

E．细胞浆可能还没有发生改变

7．肉芽组织是由……组成：A　B

A．吞噬细胞和成纤维细胞

B．新生毛细血管和成纤维细胞

C．新生毛细血管和单核细胞

D．单核细胞、巨细胞和淋巴细胞形成的结节

E．以上都不是

8．一种成熟的组织变成另一种成熟组织的过程称：D　C

A．机化　　B．钙化　　C．分化

D．化生　　E．适应

9．四肢骨折石膏固定后引起的骨骼肌萎缩．主要属于：B

A．神经性萎缩　　B．废用性萎缩　　C．压迫性萎缩

D．营养不良性萎缩　　E. 生理性萎缩

10．液化性坏死主要发生于：C

A．肺　　B．肾　　C．脑　　D．心　　E．肝

11．细胞水肿发生的机理是：　B

A．内质网受损　　B．线粒体受损

C．高尔基氏器受损　　D．核糖体受损

E．中心体受损

12．按组织再生能力的强弱来比较．下列各组的排列哪个是正确的

A．结缔组织＞神经细胞＞肝细胞

B．软骨＞腱＞肾小球　　C．骨＞平滑肌＞神经细胞

D．鳞状上皮细胞＞横纹肌＞周围神经纤维

E．肾小管上皮细胞＞骨髓细胞＞脂肪细胞

13．细胞萎缩在电镜下最显著的特点是C:　E

A．肌丝增多　　B．线粒体增多

C．滑面内质网增多　　D．粗面内质网增多

E．自噬泡增多

14．组织损伤后由结缔组织增生来修补的过程称：B　　E

A．再生　　B．增生　　C．化生

D．机化　　E．不完全再生

15．细胞缺氧．细胞膜受损．细胞内出现：E　　A

A．钠多，钾多，水多　　B．钠少，钾多，水少

C．钠多，钾少，水多　　D．钠多，钾少，水少

E．钠少，钾多，水多

16．全身营养不良时．首先发生萎缩的组织或器官是：A　　B

A．骨骼肌　　B．脂肪组织　　C．肝

D．脑　　E．心肌

17．大块疤痕可引起：E

A．关节运动障碍　　B．器官表面凹陷　　C．器官变形

D．腔室狭窄　　E．以上均可

18．虎斑心见于：E

A．白喉　　B．中毒　　C．严重贫血

D．肥胖　　E．高脂血症

19．下列肾小管变性中．哪种损害最早?B

A．气球样变　　B．水变性　　C．脂变

D．细胞内钙盐沉着　　E．细胞内玻变

20．下列各项中哪个是错误的?D

A．机化乃是用肉芽组织来取代坏死组织或异物的过程

B．单核细胞的溶酶体如果功能发生异常则不能很好的将异物排除或机化

C．包裹从本质上说也是一种机化过程

D．机体对外界侵入体内的异物．总是以机化的方式加以处理

E．机化对机体是有利的．但有时也可带来不良后果

21．支气管粘膜上皮出现鳞状上皮化生．常属于下列哪一种改变　D　E

A．分化不良　　B．不典型增生　　C．不完全再生

D．癌前期改变　　E．适应性改变

22．下列各种组织哪一种再生能力最强?A　D

A．骨骼肌　　B．神经节细胞　　C．心肌

D．神经胶质细胞　　E．软骨

23．以下哪一项原因不引起萎缩? D

A．肾盂积水　　B．慢性肝淤血　　C．垂体功能低下

D．四氯化碳中毒　　E．脊髓前角神经细胞坏死

多选题：

1．在萎缩的器官中，体积变小或数量减少的细胞主要是：　D

A．血管内皮细胞　　B．脂肪细胞

C．纤维结缔组织　　D．实质细胞

2．健康的肉芽是：　　A B C

A．鲜红色　　B．对细菌的侵入有抵抗力

C．触之易出血　　D．分泌物多

3．下列哪些情况可以出现机化过程?　　A B C D

A．手术中所使用的缝线残留于组织中　　B．较大的血肿

C．组织内死亡的寄生虫虫卵　　D．心肌梗死

4．下列情况有增生性改变的有：ABCD

A．再生　　B．机化　　C．化生　　D．肿瘤

5．下列记述中哪些是错误的?　　C B A

A．移行上皮可现鳞状上皮化生

B．胃粘膜上皮可出现肠上皮化生

C．宫颈腺上皮可出现鳞状上皮化生

D．呼吸道粘膜可出现小肠上皮化生

五、问答题

1．细胞坏死与细胞凋亡在形态学上如何鉴别?

2．试述肉芽组织的形态和功能。

3．试以断肢再植为例说明组织的再生能力和类型，并根据所学习的病理学知识分析影响断肢再植成功的病理学因素。

（肖德胜）

第二部分　局部血液循环障碍

一、是非题

1．1.　肾贫血性梗死晚期仍可见其组织粗略轮廓。（　　）

2．2.　DIC 是指微血管内有广泛的纤维素性血栓形成。（　　）

3．3.　含铁血黄素是在巨细胞内形成的。（　　）

4．4.　含铁血黄素是血红蛋白衍生物，它都在吞噬细胞内形成。（　　）

5．5.　脑缺血性梗死属凝固性坏死。（　　）

6．6.　痰液中含有含铁血黄素的巨噬细胞均称为心衰细胞。（　　）

7．7.　肾贫血性梗死一段时间内镜下仍可保存其组织轮廓。（　　）

8. 8.　肺褐色硬化是由于慢性右心衰所致。（　　）

9. 9.　肺与肠多发生出血性梗死。（　　）

10. 10.　心脏或血管内血液凝固形成固体质块的过程称为血栓形成,所形成的固体质块称为血栓。（　　）

11. 11.　透明血栓主要由血小板构成。（　　）

12. 12.　肺褐色硬化是由慢性左心衰所致。（　　）

13. 13.　左心衰时．肺组织内出现的含有含铁血黄素的巨噬细胞叫尘细胞。（　　）

14. 14.　贫血性梗死是凝固性坏死．而出血性梗死多是液化性坏死。（　　）

15. 15.　主要由白细胞构成的血栓称白色血栓。（　　）

16. 16.　血栓形成的前提是心血管内膜的损伤。（　　）

17. 17.　微血栓由纤维素构成．只能在显微镜下观察到。（　　）

18. 18.　血栓形成对机体有害无利。（　　）

19. 19.　胃肠道动脉性充血时．可致腺体分泌增加．消化功能增强。（　　）

20. 20.　潜水员病就是因为血液中重新释放的 CO_2 和氮气所造成的栓塞。（　　）

二、填空题

1．血栓形成的条件有_____、_____、_____。

2．淤血可造成的后果有_____、_____、_____、_____。

3．血栓可有_____、_____、_____和_____四种类型。

4．出血性梗死的条件_____、_____。

5．出血可分为_____和_____两类。

6．栓塞类型有_____、_____、_____、_____等。

7．长骨骨折的病人可能发生_____栓塞。

三、名词解释

槟榔肝(Nutmeg liver)心衰细胞；血栓形成；贫血性梗死(Anemic infarct)

淤血(Congestion)静脉石；栓子；肺褐色硬化；梗死；栓塞；

出血性梗死；透明血栓(hyaline thrombus)漏出性出血；羊水栓塞；出血；

四、选择题

单选题

1．1．槟榔肝是由_D___ 引起的：

A．肝脂变　　B．肝水变性

C．门脉性肝硬化　　D．慢性肝淤血

E．坏死后性肝硬化

2．2．下列哪项不是慢性淤血的后果：A

A．实质细胞的增生　　B．出血

C．含铁血黄素沉积　　D．间质细胞增生

E．可并发血栓形成

3．下列哪个器官易发生出血性梗死？　C

A．心　　B．肾　　C．肺　　D．脑　　E．脾

4．股静脉血栓脱落常栓塞：　　B　　E

A．下腔静脉　　B．右下肢大静脉　　C．右心房

D．右心室　　E．肺动脉

5．下列梗死中，哪项属于液化性坏死？　B

A．肺梗死　　B．脑梗死　　C．肠梗死

D．肾梗死　　E．脾梗死

6．右心衰竭时引起淤血的器官主要是：　B

A．肺、肝及胃肠道　　B．肝、脾及胃肠道

C．脑、肺及胃肠道　　D．肾、肺及胃肠道

E．脾、肺及胃肠道

7．肺栓塞的后果包括以下几点，但除外　C

A．急死　　B．肺梗死　　C．间质性肺炎

D．肺动脉高压　　E．右心房扩大

8．右上肢静脉血栓脱落主要栓塞于　A

A．肺动脉　　B．脑动脉　　C．肝动脉

D．心冠状动脉　　E．以上均不是

9．栓子是:E　C

A．循环血液内脱落的血栓　　B．循环血液内脱落的菌落

C．循环血液内不溶于血液的异物　　D．循环血液内脂肪和空气

E．以上都不是

10．右下肢静脉血栓脱落主要栓塞于：C　A

A．肺动脉　　B．下腔静脉　　C．右心房

D．右心室　　E．右下肢大静脉

11．下述关于肺淤血的描述．哪一项是错误的 ？D　B

A．肺泡壁毛细血管扩张

B．肺泡内中性白细胞和纤维素渗出

C．肺泡腔内有水肿液

D．可发生漏出性出血

E．常可见心衰细胞

12．股静脉血栓形成时．下述哪种结局不易发生?　A　E

A．阻塞血流　　B．机化　　C．脱落

D．钙化　　E．血流完全恢复正常

13．有关慢性肝淤血的叙述中，下列哪一项不妥?　D

A．中央静脉扩张　　B．肝窦扩张

C．肝细胞有萎缩　　D．门静脉扩张

E．部分肝细胞脂变

14．循环血液中的凝血块，随血流运行至相应大小的血管，引起管腔阻塞的过程叫做：　B　C

A．血栓　　B．血栓形成　　C．血栓栓塞

D．梗塞　　E．血栓栓子

15．下述因素哪种与血栓形成无关?　D　E

A．血管内膜损伤　　B．血流缓慢

C．血小板数量增多　　D．癌细胞崩解产物

E．纤维蛋白溶酶增加

16．下述哪项是错误的？　B

A．双重血液循环的器官不易发生梗死

B．全身血液循环状态对梗死的形成无影响

C．动脉痉挛促进梗死的形成

D．有效的侧支循环的建立可防止梗死的发生

E．梗死多由动脉阻塞引起

17．心衰细胞是由于：A

A．心衰时肺泡内巨噬细胞吞噬了红细胞

B．心衰时肺泡内巨噬细胞吞噬了尘埃颗粒

C．心衰时肺泡内巨噬细胞吞噬了纤维素样坏死物

D．心衰时巨噬细胞的集聚　　E．以上都不是

18．慢性肺淤血的镜下改变，下列哪一项应该除外？　E

A．肺泡腔内有心衰细胞　　B．肺泡壁增宽

C．肺泡壁毛细血管扩张充血　　D．切面为棕红色

E．肺内支气管扩张

多选题

1．肺梗死常为出血性梗死，其原因是：

A．双重血循环　　B．组织疏松

C．淤血　　D．动脉树枝状分布

2．血管内膜损伤容易形成血栓，其原因是：

A．损伤内皮细胞释放组织因子

B．损伤内皮释放二磷酸腺苷

C．裸露的胶原纤维吸附血小板

D．裸露的胶原纤维激活第III因子

3．淤血的病理变化及后果

A．淤血性水肿　　B．淤血性出血

C．实质细胞变性　　D．血压降低

4．脾贫血性梗死的肉眼形态：

A．梗死灶为灰白色　　B．切面呈扇形或楔形

C．梗死灶尖向脾门，底向器官的表面

D．梗死灶周围有充血出血带

五、问答题

1．1．试用槟榔肝的镜下改变解释其肉眼病变特征。

2．2．试用肺褐色硬化的镜下改变，解释其肉眼病变特征。

3．静脉淤血、血栓形成、栓塞及梗死之间有何联系？

（肖德胜）

第三部分　炎症

一、是非题

1．发生在粘膜的纤维素性炎症又称假膜性炎。（　　）

2．炎症局部的基本病变是变质、渗出、增生。（　　）

3．表面化脓是指浆膜或粘膜组织的化脓性炎症。（　　）

4．绒毛心的进一步发展机化，可引起心包纤维素性粘连。（　　）

5．发生在浆膜的浆液性炎称浆液性卡他。（ ）

6．蜂窝织炎是弥漫性化脓性炎，脓肿是局限性化脓性炎。（　　）

7．细菌性痢疾及大叶性肺炎均为纤维素性炎症。（ ）

8．乙型脑炎是一种以渗出为主的炎症。（ ）

9．在慢性炎症中，嗜中性粒细胞最常见。　（　　）

10．阿米巴肝脓肿属于一种变质性炎症。　（ ）

11．炎症病灶中血管腔内白细胞称之为炎症细胞。　（ ）

12．脑脓肿是一种以渗出为主的炎症。　（ ）

13．化脓性炎症不一定是化脓菌所引起。　（ ）

14．纤维性粘连就是结缔组织引起的粘连。　（ ）

15．阿米巴肝脓肿是一种以变质为主的非化脓性炎症。（　　）

16．阿米巴肝脓肿是肝组织的局限性化脓性炎症。（　　）

17．喉白喉为一种纤维素性炎症。（ ）

18．细菌性痢疾的基本病变是纤维素性炎症。　（ ）

19．绒毛心是发生于心外膜的纤维素性炎症。（　　）

20．增生为主的炎症多见于慢性炎症。　（　　）

21．脓肿属于一种变质性炎。　（　　）

22．血管反应是炎症过程的中心环节。（　　）

23．肉芽肿就是肉芽组织。（　　）

24．乙型脑炎属于一种变质性炎症。　（　　）

25．肉芽肿主要是由巨噬细胞增生形成境界清楚的结节状病灶。（　　）

26．炎症病灶血管腔内的白细胞并非炎性细胞。（　　）

27．发生在粘膜的纤维素渗出为主的炎症，称为纤维素性卡他性炎症。（　　）

二、填空题

1．发生在心外膜的纤维素性炎症又称_____。

2．肉芽肿大致可分为_____和_____两类。

3．急性炎症过程主要有_____、_____、_____三个方面的变化。_____是炎症过程的中心环节。_____是血液动力学的主要变化。

4．体液中产生的炎症介质可归为_____、_____、_____三种。

5．渗出性炎症分为_____、_____、_____、_____四类。

6．根据渗出物的主要成分及炎症发生的部位．可以从形态学上将炎症分为_____、_____、_____和_____炎症。

7．炎症局部的基本病变为_____、_____、_____。

8．化脓性炎症的病理类型有_____、_____、_____。

9．化脓性炎症以_____为主．慢性炎症以_____、_____细胞为主；寄生虫感染时以_____细胞为主。

10．根据炎症病变特点，急性菌痢属_____炎症；阿米巴痢疾属_____炎症；乙脑属_____炎症；流脑属_____炎症。

11．举例：以变质为主的炎症有_____、_____、_____。以渗出为主的炎症有_____、_____、_____。以增生为主的炎症有_____、_____、_____。

12．慢性炎症病变是以_____为主，浸润的炎症细胞主要是_____、_____、_____。

13．常见炎症性疾病举例：

变质性炎：_____、_____、_____。假膜性炎：_____、_____。化脓性炎：_____、_____、_____。

急性增生性炎_____、_____、_____。肉芽肿性炎：_____、_____、_____、_____。

14．纤维素性炎症好发部位为_____、_____、_____。

15．急性炎症中以增生病变为主的疾病有_____和_____。

16．在不同的炎症病灶中．巨噬细胞可转化为_____、_____、_____、等细胞。

17．纤维素性炎症发生在粘膜时称_____ 炎症。

18．炎症的局部临床表现为_____、_____、_____、_____和_____。

19. 巨噬细胞在不同疾病时可表现为不同态. 如_____、_____、_____、_____、_____、_____。

20. 炎症局部引起疼痛的炎症介质可能有_____、_____和_____。

21. 根据基本病变，病毒性肝炎是以_____为主的炎症；伤寒病是以_____为主的炎症，脓肿是以_____为主的炎症。

三、名词解释

肉芽肿；栓塞性脓肿；绒毛心；化脓性炎症；脓肿；蜂窝织炎；渗出；积脓；菌血症；假膜；炎性息肉；炎细胞浸润；脓毒败血症；脓性卡他；化脓；炎性肉芽肿；败血症；假膜性炎；炎症介质

四、选择题

单选题

1. 在慢性炎症中，下列哪种细胞最常见? E B

A. 嗜酸性粒细胞　　B. 淋巴细胞　　C. 嗜中性粒细胞

D. 肥大细胞　　E. 巨噬细胞

2. 下列哪项是变质性炎症? D

A. 肾盂肾炎　　B. 菌痢

C. 大叶性肺炎　　D. 阿米巴肝脓肿

E. 阑尾炎

3. 下列哪一种不是渗出性炎症 B

A. 卡他性炎症　　B. 乙型脑炎　　C. 流行性脑膜炎

D. 肾盂肾炎　　E. 脓肿

4. 在葡萄球菌感染的炎症反应中所见到的主要细胞是: E

A. 淋巴细胞　　B. 单核细胞　　C. 嗜酸性粒细胞

D. 肥大细胞　　E. 嗜中性粒细胞

5. 炎症的渗出主要由于: B

A. 血液动力学改变　　B. 血管壁通透性改变

C. 小静脉血栓形成　　D. 循环血量增加

E. 组织间液比重降低

6. 哪一项不属于渗出性炎症? D

A. 浆液性炎　　B. 假膜性炎　　C. 化脓性炎

D．感染性肉芽肿性炎　　E．出血性炎

7．下列哪项不属于渗出性炎症? D

A．假膜性炎症　　B．大叶性肺炎　　C．卡他性炎症

D．阿米巴肝脓肿　　E．流脑

8．溶血性链球菌最常引起：A

A．蜂窝织炎　　B．假膜性炎　　C．坏死性炎

D．脓肿　　E．出血性炎

9．下列关于炎症描述，哪一项不正确?E

A．嗜中性粒细胞浸润通常是急性炎症的标志

B．慢性炎症细胞主要是淋巴细胞、巨噬细胞和浆细胞

C．淋巴细胞浸润并非总是慢性炎症的特征

D．嗜中性粒细胞游出后必然引起局部单核细胞增多

E．白细胞渗出只见于急性炎症早期

10．巨噬细胞、纤维母细胞和淋巴细胞最常见于：D

A．急性炎症　　B．肉芽组织　　C．伤口愈合处

D．慢性炎症　　E．化脓性炎症

11．下列哪项不属于渗出性炎症 ?D

A．假膜性炎症　　B．卡他性炎症　　C．肾盂肾炎

D．乙型脑炎　　E．流行性脑炎

12．下列哪项不属于渗出性炎症?E

A．淋病　　B．绒毛心　　C．肾盂肾炎　　D．菌痢　　E．肠伤寒

13．关于炎症的概念，较恰当的说法是：

A．白细胞对细菌的一种作用　　B．由损伤引起的细胞变化

C．细胞生长异常的一种形式　　D．充血、水肿的一种形式

E．组织对损伤的一种防御为主的反应

14．急性炎症时血液动力学的变化一般按下列顺序发生：C

A．血流速度减慢→血管扩张，血流加速→细动脉短暂收缩→白细胞附壁

B．血管扩张，血流加速→细动脉短暂收缩→白细胞附壁→血流速度减慢

C．细动脉短暂收缩→血流加速→血管扩张，血流速度减慢→白细胞附壁

D．细动脉短暂收缩→血管扩张，血流加速→白细胞附壁→血流速度减慢

E．细动脉短暂收缩→血流速度减慢→血管扩张，血流加速→白细胞附壁

15．以变质为主的炎症，其实质细胞的主要变化是：　C

A．增生和再生　　B．萎缩和变性

C．变性和坏死　　D．增生和变性

E．坏死和萎缩

16．下列哪一项不属于渗出性炎症?B

A．卡他性炎症　　B．阿米巴肝脓肿

C．假膜性炎　　D．绒毛心

E．大叶性肺炎

17．多核巨细胞不见于下列哪种疾病?A

A．伤寒　　B．结核　　C．霍奇金病

D．血吸虫虫卵结节　　E．异物肉芽肿

18．下列哪项不是渗出性炎?E

A．大叶性肺炎　　B．钩体病　　C．阑尾炎

D．绒毛心　　E．Pautrie微脓肿

19．下列有关炎症的理解，哪项不正确?D

A．血管反应是炎症的中心环节

B．对机体损害的任何因素均可为致炎因子

C．炎症对机体有利，又有潜在危害性

D．凡是炎症都运用抗菌素抗炎

E．炎症既有局部反应，又有全身反应

五、问答题

1、1、炎症的基本病变有哪些？举例说明它们之间的相互关系。

2、2、炎性渗出物中含有哪些成分？各有何意义？

3、3、纤维素性炎症常发生在哪些部位？各有何特点？

4、4、试以皮肤生疖为例简述炎症的结局。

（李景和）

第四部分　肿瘤

一、是非题

1．1．　“癌症”是癌与肉瘤的统称。　（　　）

2. 2. 癌珠就是角化物质。 （ ）

3. 3. 肝癌转移到肺称肺转移性肝癌。（ ）

4. 4. 肿瘤的异型性愈小，表示其恶性程度愈高。（ ）

5. 5. 间变细胞一般是指缺乏分化状态的恶性肿瘤细胞。（ ）

6. 6. 肝癌转移到肺称肝转移性肺癌。（ ）

7. 7. 恶性肿瘤细胞一旦侵入淋巴管或血管就称为转移。（ ）

8. 8. 肾母细胞瘤、肝母细胞瘤、神经母细胞瘤为恶性肿瘤，黑色素瘤、精原细胞瘤为良性肿瘤。（ ）

9. 9. 肿瘤细胞异型性越大，分化就越好，恶性度就越小。（ ）

10. 10. 癌常沿淋巴道转移而肉瘤多经血道转移。（ ）

11. 11. 由动脉发生的良性肿瘤称动脉瘤。 （ ）

12. 12. 癌珠是指高分化鳞癌癌巢中呈同心圆层状排列的角化物。（ ）

13. 13. 癌前病变是一种良性病变。（ ）

14. 14. 霍奇金淋巴瘤是一种恶性肿瘤。（ ）

15. 15. 肿瘤异型性越小，说明分化程度越高。（ ）

16. 16. 浸润性生长的肿瘤全为恶性肿瘤。（ ）

17. 17. 血管瘤呈膨胀性生长。（ ）

18. 18. 肿瘤的特点取决于肿瘤的实质。（ ）

19. 19. 尤文氏瘤、室壁瘤和创伤性神经瘤均是肿瘤。（ ）

20. 20. 肿瘤的异型性是指肿瘤在细胞形态及组织结构上与其起源组织所存在的差异性。（ ）

21. 21. 霍奇金淋巴瘤中，淋巴细胞为主型愈后最好。（ ）

22. 22. 霍奇金淋巴瘤中，结节硬化型愈后最好。（ ）

23. 23. 肿瘤均表现为局部肿块。（ ）

24. 24. 霍奇金淋巴瘤中，淋巴细胞消减型的愈后最差。（ ）

25. 25. R-S 细胞是诊断霍奇金淋巴瘤的重要依据。（ ）

26. 26. 单纯癌属于一种低分化腺癌。（ ）

27. 27. 肿瘤的分级就是肿瘤的分期．二者意义相同。（ ）

28. 28. 所有的良性肿瘤均呈膨胀性生长。（ ）

29. 29. 蕈样霉菌病是由于真菌感染而引起的慢性肉芽肿性炎症。（ ）

30. 30.　神经母细胞瘤，精原细胞瘤．骨母细胞瘤均为恶性肿瘤。（　　）

二、填空题

1. 肿瘤的生长方式有_____、_____、_____三种。

肿瘤的转移途径有_____、_____、_____

2．常见的癌前病变有_____、_____、_____、_____、_____。

3．肝癌转移到肺称_____。

4．恶性淋巴瘤包括_____、_____二大类。

5．肿瘤的异型性表现包括_____和_____。

6．来源于被覆上皮发生的良性肿瘤．称为_____。

7.经典型霍奇金淋巴瘤的组织学类型有_____、_____、_____、_____四型。其中_____型预后最差。

8．肿瘤命名的原则是_____、_____、_____。

9．肿瘤的分类是以肿瘤的_____和_____为依据。

10．良性肿瘤最常见的生长方式为_____和_____。

11．恶性肿瘤最常见的生长方式为 _____。

三、名词解释

继发瘤；实性癌；转移与继发瘤；单纯癌；异质化；间变；非典型增生；肌纤维母细胞；癌肉瘤(Carcinosarcoma)肿瘤的异型性；癌前病变；肉瘤；　原位癌；镜影细胞；交界性肿瘤；畸胎瘤；恶病质；乳头状瘤；Teratoma；蕈样霉菌病；APUD　瘤；Red-Sternberg cell；霍奇金淋巴瘤(Hodgkin’s disease)；绿色瘤；恶性组织细胞增生症

四、选择题

单选题

1．来源于三个胚层组织的肿瘤称：

A．癌肉瘤　　B．混合瘤　　C．畸胎瘤

D．错构瘤　　E．胚胎瘤

2．下列哪项不是肉瘤的特征：B

A．多见于青少年　　B．瘤细胞呈巢状

C．多经血道转移　　D．切面呈鱼肉状

E．瘤细胞间有网状纤维

3．诊断恶性肿瘤的主要依据是：D

A．肿瘤的肉眼形态　　B．肿瘤对机体的影响

C．肿瘤的大小　　D．肿瘤的异型性

E．肿瘤的继发改变

4．下列哪项不是真正的肿瘤?C

A．霍奇金淋巴瘤　　B．白血病

C．结核瘤　　D．Ewing’s瘤

E．黑色素瘤

5．下列哪种是来源于上皮细胞的肿瘤?C

A．毛细血管瘤　　B．淋巴管瘤

C．乳头状瘤　　D．畸胎瘤

E．神经鞘瘤

6．下列哪项是来源于间叶组织的肿瘤？D

A．白血病　　B．恶性神经鞘瘤

C．恶性黑色素瘤　　D．恶性间质瘤

E．恶性畸胎瘤

7．下列哪种形态的肿块癌的可能性大?B

A．乳头状　　B．火山口状溃疡　　C．质硬

D．灰白色　　E．肿块大

8．下列哪项不是肿瘤组织的继发改变?C

A．钙化　　B．粘液变　　C．囊性变　　D．玻变　　E．恶性变

9．良性肿瘤的异型性表现为：C

A．瘤细胞多形性　　B．瘤细胞核的多形性

C．瘤实质及间质排列紊乱　　D．病理性核分裂

E．核浆比例异常增大

10．肿瘤的特殊性决定于：　　E

A．肿瘤的实质　　B．肿瘤的间质

C．肿瘤的转移　　D．肿瘤细胞的代谢特点

E．肿瘤细胞的核分裂

11．下列哪一种不属于真正的肿瘤 ？　D

A．蕈样霉菌病　　B．白血病　　C．葡萄胎

D．动脉瘤　　E．类癌

12. 肿瘤分化越高：C

A．恶性程度越高　　B．转移越早　　C．恶性程度越低

D．对放射治疗敏感　　E．预后越差

13. 肿瘤代谢的特点不包括C

A．DNA 和 RNA 合成增强　　B．蛋白质合成与分解均增强

C．与正常母组织代谢相比具有质的差别

D．肿瘤组织内氧化酶↓和蛋白质分解酶↓

E．主要是无氧糖酵解获取能量

14. 下列哪项不是真正的肿瘤?E

A．蕈样霉菌病　　B．霍奇金淋巴瘤

C．白血病　　D．Paget’s病

E．室壁瘤

15. 下列哪种是来源于间叶组织的恶性肿瘤?D

A．恶性淋巴瘤　　B．恶性神经鞘瘤

C．恶性黑色素瘤　　D．恶性间皮瘤

E．恶性畸胎瘤

16. 关于粘液癌的描述．下列哪项除外?E

A．是一种低分化腺癌　　B．可有不同程度的粘液池形成

C．可有印戒细胞　　D．肉眼往往呈半透明的胶冻状

E．对放疗不敏感但化疗效果好

17. 诊断恶性肿瘤的主要依据是：B

A．肿瘤有出血坏死　　B．肿瘤的异型性

C．肿瘤的大小　　D．肿瘤的肉眼形态

E．肿瘤有溃疡形成

18. 下列哪种不是恶性肿瘤?A

A．肾母细胞瘤　　B．krukenberg瘤

C．软骨母细胞　　D．Ewing 瘤

K．蕈样霉菌病

19. 下列哪项是来源于间叶组织的恶性肿瘤？D

A．恶性神经鞘瘤　　B．恶性黑色素瘤

C．癌肉瘤　　D．恶性间皮瘤

E．甲状腺乳头状癌

20. 良性肿瘤的异型性主要表现在　A

A．瘤细胞大　　B．瘤细胞核大

C．核仁大　　D．核浆比例失常

E．实、间质排列紊乱

21. 肺转移性癌指的是：E

A．肺癌转移至肝　　B．肺癌转移至肺

C．肝癌和肺癌同时转移到它处　　D．肝癌和肺癌互相转移

E．它处的癌转移到肺

22. 诊断恶性肿瘤的依据是：D

A．恶病质　　B．局部淋巴结肿大

C．肿块增大快　　D．细胞异型性明显

E．局部红、肿、痛

23. 下列哪些符合鳞状细胞癌的特征？ D

A．多经淋巴道转移　　B．浸润性生长

C．有癌珠形成　　D．可发生于原来没有鳞状上皮覆盖的组织

E.菜花状肿块

24. 下列哪一项是恶性肿瘤细胞的形态特点?E

A．核大　　B．多核　　C．核仁大

D．有核分裂　　E．出现病理性核分裂

25. 下列除哪一项外．其余均属于癌前病变?E

A．纤维囊性乳腺病　　B．十二指肠溃疡

C．粘膜白斑　　D．结肠多发性腺瘤性息肉

E．小腿慢性溃疡

26. 下列哪项肿瘤最常转移到肝 C

A．乳腺癌　　B．膀胱癌

C．结肠癌　　D．前列腺癌

E．肛管癌

27．下列哪项不是胃粘液癌形态特点？E

A．半透明、胶冻状　　B．　印戒细胞

C．溃疡状　　D．　息肉状

E．癌珠

28．肿瘤血道播散最常见的部位是：D

A．肺、胸膜．脑　　B．肺、肾、胃、脾

C．肝．腹膜、骨、肾　　D．肝、肺

E．肝、腹膜、脑

29．肿瘤是局部组织的 D

A．变性　　B．化生　　C．畸形　　D．异常增生　E．再生

30．下列哪个不是恶性肿瘤?　　C

A．无性细胞瘤　　B．精原细胞瘤

C．畸胎瘤　　D．淋巴瘤

E．白血病

五、问答题

1．1．试以结肠腺瘤及结肠腺癌为例，说明良、恶性肿瘤的区别。

2．2．试述良、恶性肿瘤的区别。

3．根据食道的正常组织结构，写出其可能发生的肿瘤名称。

4．简述癌与肉瘤的区别。

5．在切片中，高分化鳞癌与高分化腺癌各有何形态特征?

6．以高分化鳞癌和纤维肉瘤为例，说明癌和肉瘤的区别。

7．抹片中正常细胞与恶性肿瘤细胞如何区何。

8．何谓转移瘤？简述肝脏和肺脏转移肿瘤的临床病理特点。

9．如何正确区别良恶性肿瘤? 并举例说明。

10．根据结肠的正常组织结构，分析可能发生哪些肿瘤，写出其名称。

11．何为癌、肉瘤？试举例说明两者的区别。

12．试以纤维瘤、纤维肉瘤为例，详述良、恶性肿瘤的区别。

13．试述肿瘤的命名原则，并各举一例说明之。

14．试述脱落细胞涂抹片中癌细胞的诊断指标。

15．在脱落细胞学中，如何鉴别鳞癌与腺癌细胞?

（周建华）

第五部分　心血管系统疾病

一、是非题

1．动脉粥样硬化的病变发生在大、中型动脉。（　　）

2．风湿性心内膜炎时，瓣膜上赘生物容易脱落引起栓塞。（　　）

3．风湿性心肌炎时在心脏间质有风湿小体形成。（　　）

4．高血压性肾萎缩称原发性肾萎缩。（　　）

6．亚急性细菌性心内膜炎常发生在已有病变的瓣膜上。（　　）

6．风湿性关节炎反复发作也可以导致关节畸形。（　　）

7．二尖瓣狭窄也可引起左、右房室扩张，肥大。（　　）

8．风湿病是一种由A 组溶血性链球菌直接引起的疾病，常累及全身结缔组织。（　）

9．高血压主要引起全身大、中动脉硬化。（　　）

10．凡是血压超过140／90mmHg　者，统称高血压。（　　）

11．特发性高血压就是高血压病。（　　）

12．主动脉狭窄可引起左心室向心性肥大。（　　）

13．亚急性细菌性心内膜炎之赘生物脱落后可引起栓塞性小脓肿。（　　）

14．高血压脑溢血常发生于内囊部。（　）

15．二尖瓣狭窄病人心脏病变以左室肥大为主。（　　）

16．急性风心病时瓣膜上的疣状赘生物实质上是析出性血栓。

17．低密度脂蛋白(LDL)与动脉粥样硬化症的发生密切相关。

18．高血压主要累及病人的细小动脉。（　　）

19．风湿性心包炎形成绒毛心，纤维素在心包脏壁两层间形成粘连而导致缩窄性心包炎。（　　）

20．风湿病是链球菌直接引起的炎症性疾病。（　　）

21．二尖瓣瓣膜病和高血压病时，可导致肺淤血而引起右心衰竭。（　　）

二、填空题

1．风湿病的基本病变分为_____、_____、_____三个期。

2．粥样斑块的继发性变化有_____、_____、_____、_____、_____。

3．高血压常见死因有_____、_____、_____。

4．心肌梗死的合并症及后果可能为____、____、____、____、___、_____。

5．动脉粥样硬化症，根据病变发展经过，可分为_____、_____、_____、_____、_____。

6．心肌梗死最常累及的病变分为_____及_____。

9．心肌梗死的继发改变有_____、_____、____、____、_____、_____、_____。

10．动脉粥样硬化的基本病变分为_____、_____、_____和_____四个时期。

11．风心病最常受累的瓣膜是 _____，其次是_____。

12．可使左心室壁增厚的心脏病有 _____、_____、_____、_____等。

13．高血压可分为 _____、_____、_____三个时期。

14．动脉粥样硬化症病变主要累及的是_____动脉，而高血压的病变主要累及_____动脉。

15．风湿病按病变过程可分为_____、_____、_____三期．变质性病变以_____为特征；增生性病变以_____为特征。

16．心肌梗死的原因_____、_____、_____。

三、名词解释

疣状心内膜炎；Anitschow细胞；颗粒性固缩肾；阿少夫小体(Aschoff小体)； 风湿小体；高血压脑病；绒毛心；心绞痛；冠心病(Coronary heart disease)

原发性固缩肾；室壁瘤；高血压

四、选择题

单选题

1．良性高血压病晚期会引起

A．继发性固缩肾　　B．肾水变性　　C．原发性固缩肾

D．肾凹陷性瘢痕　　E．肾盂积水

2．高血压的血管壁玻变主要发生于

A．细小动脉　　B．毛细血管　　C．大动脉

D．中动脉　　E．细小静脉

3．下列关于风湿性心内膜炎的描述中哪项是正确的

A．瓣膜赘生物牢固相连　　B．瓣膜赘生物内有细菌

C．受累瓣膜易穿孔　　D．受累瓣膜以三尖瓣为主

E．赘生物位于房室瓣的心室面

4．动脉粥样硬化主要发生在

A．细、小动脉　　B．大、中动脉　　C．细、小静脉

D．大、中静脉　　E．毛细血管

5．关于风湿病的论述中哪一项是不正确的

A．风湿病是累及全身结缔组织的变态反应性疾病

B．心脏病变对患者危害最大

C．风湿性心内膜炎引起的慢性心瓣膜病严重影响心脏功能

D．风湿性关节炎常可导致关节畸形

E．皮下结节和环形红斑对临床诊断风湿病有帮助

6．动脉粥样硬化合并血栓形成的主要原因是：

A．血液凝固性增高　　B．血流旋涡形成　　C．血流缓慢

D．内膜损伤　　E．以上都不是

7．高血压病最常累及的血管是：

A．全身小静脉　　B．全身细小动脉　　C．全身中、小动脉

D．大动脉　　E．中动脉

8．高血压心脏的主要改变是：

A．心肌间质有肉芽肿形成　　B．心肌有梗死灶

C．左心室有疤痕形成

D．左心室心肌肥大，心室壁增厚，心脏缩小

E．以上都不是

9．马氏斑（MacCallum’s patch）位于

A．右心房　　B．左心房　　C．右心室

D．左心室　　E．心外膜

10．关于慢性风湿性心脏瓣膜病的描述中．下列哪一项是错误的？

A．瓣膜硬化　　B．瓣叶互相粘连　　C．腱索增粗缩短

D．瓣膜增厚蜷曲　　E．瓣膜穿孔

11．高血压脑出血常见的血管是

A．小脑小动脉　　B．脊髓前动脉

C．豆纹动脉　　D．大脑前动脉

12．下述哪项关于风湿病的记述是错误的?

A．抗菌素的广泛应用，降低了风湿病的发病率

B．抗体滴定度增高提示本病是由溶血性链球菌直接作用下引起的

C．多见于温带、亚热带

D．是一种结缔组织病

E．早期咽部培养，溶血性链球菌阳性率达70-90%

13．下述哪种成分是粥样斑块中所不具备的?

A．胶原纤维　　B．胆固醇结晶　　C．坏死物质

D．泡沫细胞　　E．中性白细胞

14．下述关于慢性心瓣膜病的记述中，哪一项是错误的?

A．多由风湿性和亚急性细菌性心内膜炎引起

B．表现为瓣膜口狭窄和/或瓣膜关闭不全

C．二尖瓣最常受累，其次是主动脉瓣

D．可引起血液动力学和心脏的变化

E．一般不会同时累及两个以上的瓣膜

15．心冠状动脉粥样硬化，最常受累的动脉分支是哪个?

A．右冠状动脉主干　　B．左冠状动脉主干

C．右冠状动脉内旋支　　D．左冠状动脉内旋支

E．左冠状动脉前降支

16．关于二尖瓣狭窄的记述中．哪一项是错误的?

A．左心室肥大、扩张　　B．右心室肥大、扩张

C．左心房肥大、扩张　　D．右心房肥大、扩张

E．肺淤血、水肿

17．高血压脑出血常见部位是

A．小脑　　B．蛛网膜下腔　　C．大脑皮质

D．内囊及基底节　　E．脑室

18．血管玻变常见于

A．慢性肾小球肾炎　　B．风湿性心脏病　　C．高血压病

D．动脉粥样硬化　　E．高血压病及慢性肾小球肾炎

19．高血压失代偿期心脏变为

A．左心室向心性肥大　　B．左心室明显扩张

C．左心室乳头肌明显增粗　　D．左心室肌收缩力加强

E．心肌出现弥漫性纤维化

多选题

1．纤维素样坏死可见于

A．风湿病　　B．大叶性肺炎

C．恶性高血压　　D．纤维素性炎症

2．良性高血压时血压持续性升高是因为

A．小动脉壁发生玻变

B．细动脉发生玻变

C．细动脉发生纤维素样坏死

D．小动脉内膜因纤维增生而增厚

3．风湿病的特征性病变是

A．结缔组织的纤维素样坏死

B．抗原抗体复合物在结缔组织中沉积

C．肉芽组织最后形成的疤痕

D．肉芽肿的形成

4．二尖瓣狭窄时心脏的病理改变有

A．左心室大小接近正常

B．右心室大小接近正常

C．肝淤血

D．左心房大小接近正常

5．典型的风湿小体由下列成分构成

A．阿少夫细胞　　B．纤维母细胞

C．纤维素样坏死　　D．上皮样细胞

6．动脉粥样硬化症有以下特征

A．腹主动脉最为严重　　B．可形成夹层动脉瘤

C．内膜下脂质沉着伴有纤维组织增生

D．病灶可伴发溃疡、钙化、出血和血栓形成

7．有关风湿病正确的论述是

A．常有皮下结节及环形红斑

B．常有细菌性栓塞小脓肿

C．常有动脉炎

D．常导致关节畸形。

8．动脉粥样硬化斑块发生的继发改变有：

A．斑块内出血　　B．溃疡形成

C．血栓形成　　D．化脓

五、问答题

1．慢性风湿性二尖瓣狭窄伴心衰患者，全身各脏器可能有哪些变化？

2．风湿性心瓣膜病患者出现栓塞症状，试分析其可能的原因，并简述心、肝、肺、脑等重要脏器的主要病变。

3．试以二尖瓣狭窄为例，简述血流动力学改变及主要脏器可能发生的病理变化。

4．病例：田 XX ，28 岁，女性，因心慌、心悸伴下肢浮肿十余年，加重 15 天，于 94 年 3 月 6 日急诊入院。

二年前患者有膝、肘、肩、踝等关节疼痛史，继而出现心慌、心悸、以剧烈活动及体力劳动后加剧，伴有下肢及面部浮肿，以后病情反复发作，经多次住院治疗。近半月来症状加重，因咳嗽、气促、吐铁锈色痰，左上腹胀痛而急诊入院。

过去史：经常有喉痛、扁桃体炎的病史。

体查：T 36.4℃　R18 次/5分　BP100／70mmHg　　心率 120 次／分。心率不齐。心尖区可闻及III级收缩期吹风性杂音及舒张期隆隆性杂音，听诊心界扩大。

实验室检查：抗“0” 800μ(正常＜500μ)

血沉 40mm ／hr(正常＜20mm ／hr)

请回答：（1）诊断是什么病，有何根据？

（2）推测全身主要器官有何病变?

5．某人因脑出血死亡，分析死者生前可能患什么病：尸解后，各主要脏器可能有哪些病理学改变?

（郑长黎）

第六部分　呼吸系统疾病

一、是非题

1. 1. 燕麦细胞癌属于 APUD 瘤，其组织学来源为支气管粘膜上皮细胞。（ ）

2. 2. 慢性肺源性心脏病发病的主要环节是由于肺动脉高压。（ ）

3. 3. 小叶性肺炎是细支气管及其周围肺组织的急性纤维素性炎。（ ）

4. 4. 慢性支气管炎病变特点包括是管壁内粘液腺增生、肥大、功能亢进。（ ）

5. 5. 鼻咽癌的组织学类型中低分化鳞癌最常见。（ ）

6. 6. 中央型肺癌组织学类型镜下通常是鳞状细胞癌。（ ）

7. 7. 硅肺的基本病变是矽结节形成和肺组织的弥漫性纤维化。（ ）

8. 8. 鼻咽癌的组织学类型中，以泡状核细胞癌最多见。（ ）

9. 9. 慢性支管炎长期反复发作可致肺气肿、肺心病。（ ）

10. 10. 小叶性肺炎是以细支气管为中心的化脓性炎症。（ ）

11. 11. 肺癌以中央型常见，且组织学类型多为鳞癌。（ ）

12. 12. 泡状核细胞癌是鼻咽癌中较常见的高分化肿瘤。（ ）

13. 13. 支气管扩张症是指中小气管管腔的持久不可复性扩大。（ ）

14. 14. 肺心病时，由于肺动脉瓣狭窄使血液回流至肺受到限制从而导致右心室肥大。（ ）

15. 15. 大叶性肺炎是以中性白细胞渗出为主的急性化脓肿炎症。（ ）

16. 16. 鼻咽癌的最常见好发部位为咽隐窝。（ ）

二、填空题

1. 1. 大叶性肺炎分为_____、_____、_____、_____四期。

2. 2. 肺癌的肉眼类型有_____、_____、_____。

3. 3. 硅肺的基本病变是_____和_____。

4. 4. 肺心病的原因有_____、_____、_____。

5. 5. 硅肺常见的并发症有_____、_____、_____、_____。

6. 6. 根据病理学变化，大叶性肺炎为_____炎症，小叶性肺炎为_____炎症。

7. 7. 肺癌的主要组织学类型有_____、_____、_____。

8. 8. 鼻咽癌最常见的组织学类型是_____。

9. 9. 小叶性肺炎的主要病变特征是以_____炎症。

10. 10. 在肺癌，特别是_____癌，可出现副肿瘤性综合征。

三、名词解释

泡状核细胞癌；肺肉质变；肺心病；硅结节；燕麦细胞癌(oat cell carcinoma)

灰色肝样变期；中央型肺癌；肺气肿；肺透明膜

四、选择题

单选题

1．1．下列哪项不符合小叶性肺炎

A．A．多由致病力弱的肺炎球菌引起

B．B． 好发于老人、儿童、久病卧床者

C．C．以细支气管为中心的纤维素性炎症

D．D．常作为其它疾病的并发症出现

E．E． 病灶可互相融合

2．2．鼻咽癌的常见组织学类型

A．高分化鳞癌　　B．泡状核细胞癌　　C．未分化癌

D．腺癌　　E．低分化鳞癌

3．3．大叶性肺炎的病变性质是：

A．纤维素性炎　　B．变态反应性炎　　C．化脓性炎

D．浆液性炎　　E．出血性炎

4．4．鼻咽癌常发生在

A．鼻咽后部　　B．鼻咽顶部　　C．鼻咽侧壁

D．鼻咽前壁　　E．鼻咽底部

5．5．肺源性心脏病最常见的原因是

A．支气管哮喘　　B．支气管扩张　　C．慢性支气管炎

D．肺结核病　　E．矽肺

6．6．小叶性肺炎的病变范围

A．以呼吸性细支气管为中心　　B．以终未细支管为中心

C．以细支气管为中心　　D．以支气管为中心

E．以肺泡管为中心

7．7．二氧化硅尘致病力最强的是

A．＜5 微米　　B．＞5 微米　　C．＜3 微米

D．1-2微米　　E．3-4微米

8．8．鼻咽泡状核细胞癌哪一项是错的?

A．胞体大，胞浆丰富　　B．细胞多边形境界清楚

C．核大、染色质小，空泡状　　D．核仁肥大、可 1-2个

E．癌细胞间有淋巴细胞浸润

9．9．某男，60 岁、胸痛、咳嗽、咯血痰两个月，胸片见右上肺周边一直径为 5cm 结节状阴影，边缘毛刺状。应首先考虑：

A．肺结核球　　B．周围型肺癌　　C．团块状矽结节

D．肺脓肿　　E．肺肉质变

10．　10．　硅肺的并发症有

A．肺脓肿　　B．肺结核　　C．肺癌

D．肺炎　　E．肺结核＋肺心病

11．　11．　下列低分化鼻咽癌的临床病理特征中，哪一项不正确　？

A．原发灶往往很小　　B．早期可有同侧颈淋巴结转移

C．对放射治疗不敏感　　D．以低分化鳞癌最常见

E．易侵犯颅底及颅神经

12．　12．　肺心病发病的主要环节是：

A．慢性支气管炎　　B．慢性阻塞性肺气肿

C．肺纤维化　　D．肺血管床减少

E．肺循环阻力增加和肺动脉高压

13．　13．　大叶性肺炎的肉质变是由于

A．中性白细胞渗出过多　　B．中性白细胞渗出过少

C．纤维蛋白原渗出过多　　D．红细胞漏出过多

E．红细胞漏出过少

14．　14．　大叶性肺炎的病变特点．下列哪项除外

A．病变中可有大量细菌　　B．较多的红细胞漏出

C．大量纤维素渗出　　D．常有肉质变

E．大量中性白细胞渗出

15.　15.　小叶性肺炎的病变性质多为：

A．出血性纤维素性炎症　　B．卡他性炎症

C．增生性炎症　　D．化脓性炎症

E．变质性炎症

16.　肺癌最常见的组织学类型是：

A．腺样囊性癌　　B．巨细胞癌　　C．鳞状细胞癌

D．腺癌　　E．未分化癌

多选题

1．慢性支气管炎可导致

A．支气管扩张症　　B．支气管管腔狭窄

C．肺气肿　　D．支气管性哮喘

2．鼻咽癌的特点是

A．早期就可发现鼻咽部明显肿块

B．以低分化鳞癌最为多见

C．未分化癌大多来自粘膜上皮的嗜银细胞

D．往往早期发生淋巴道转移

3．肺源性心脏病是由下列疾病所引起

A．间质性肺炎所致的间质纤维化

B．反复发作的慢性细支气管炎及细支气管周围炎

C．间质性肺气肿

D．支气管扩张症

4．硅肺对人的危害在于

A．引起肺心病　　B．并发肺结核

C．引起肺纤维化影响气体交换　　D．晚期常发肺癌

5．哪些是慢性支气管炎的典型病变

A．粘膜腺体肥大增生　　B．平滑肌肥大

C．杯状细胞增生　　D．支气管壁内嗜酸性白细胞浸润

五、问答题

1．试述大叶性肺炎的病理变化及临床病理联系?

2．试述大、小叶性肺炎的区别。

3．病例分析：周××，男，吸烟（20 支/天），伴咳嗽 30 余年，每年冬天咳嗽加剧，时有畏寒发热，反复发作至今未愈。近年来，体力劳动后气促，一个月前发现双足水肿，最近几天出现尿少。医师检查发现肝脾肿大，颈静脉怒张。请思考，病人患什么病？并简述发生发展经过。

（胡忠良）

第七部分　消化系统疾病

一、是非题

1．1．门脉性肝硬化后期可导致门静脉高压和肝功能不全的后果。（ ）

2．2．胃癌组织浸润到粘膜肌层时，属中晚期胃癌。（ ）

3．3．慢性肝炎分为黄疸型肝炎及无黄疸型肝炎两种。（ ）

4．4．甲型病毒性肝炎的病理切片(HE)中从不出现毛玻璃样肝细胞。（ ）

5．5．肠上皮化生常见于慢性萎缩性胃炎。（ ）

6．判断胃癌的早、晚期主要根据其是否有转移。（ ）

7．原发性肝癌是指肝细胞发生的恶性肿瘤。（ ）

8．由肝细胞和肝内胆管上皮细胞发生的恶性肿瘤均称为原发性肝癌。

9．毛玻璃样肝细胞多见于 HBsAg 携带者及慢性肝炎患者的肝组织中。

10．当肝细胞灶性坏死，并有肝细胞再生及纤维组织增生时称肝硬化。（ ）

11．十二指肠溃疡病很少癌变或不癌变。（ ）

12．卵巢的 krukenberg瘤，原发灶应首先考虑在胃肠道等器官。（ ）

13．慢性胃溃疡肉眼形态通常是直径2cm 以内，圆形或椭圆形，边缘似刀割状。（ ）

14．胃癌最主要的转移途径为直接蔓延。（ ）

15．有门静脉高压症的肝硬化，称为门脉性肝硬化。（ ）

16．胃癌最多见的是种植性转移。（ ）

17．慢性浅表性胃炎时最有诊断意义的是炎性细胞浸润粘膜浅层甚至全层，但不累及固有腺体。（ ）

18．根据胃癌组织是否有转移将胃癌分成早期胃癌和中晚期胃癌。（ ）

19．胃癌只要有转移的均不能称为早期胃癌。（ ）

20．中晚期食道癌肉眼分型有平坦型、溃疡型、髓质型及缩窄型。（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/747105153150006165