

口服给药法作业习题

一、选择题

单选题

1. 执行给药原则中，哪项是最重要的()
A. 遵医嘱给药 B. 给药途径要准确 C. 给药时间要准确 D. 注意用药不良反应 E. 给药中要经常观察疗效
2. 服磺胺药物需多饮水的目的是()
A. 避免损害造血系统 B. 减轻服药引起的恶心 C. 避免尿中析出结晶 D. 避免影响血液酸碱度 E. 增加药物疗效
3. 服用毛地黄制剂的病人（成人），心率每分钟少于多少次时不可使用()
A. 30 次 / 分钟 B. 40 次 / 分钟
C. 50 次 / 分钟 D. 60 次 / 分钟
E. 70 次 / 分钟
4. 护士发药时，下列哪项做法不符合要求(...)
A. 服铁剂药后需漱口 B. 危重病人及小儿应喂服 C. 服毛地黄前需测心率 D. 服安眠药应防成瘾 E. 遇病人有疑问时，应说服其服药
5. 剧毒药及麻醉药的最主要保管原则是()

- A. 药名用中、外文对照 B. 装密封瓶中保存
C. 应加锁并认真交班
D. 于阴凉处存放 E. 药物分类放置
6. 应避免与牙齿接触的药物是 ()
- A. 止咳合剂 B. 棕色合剂
C. 1%稀盐酸 D. 碳酸氢钠
E. 颠茄合剂

多选题

1. 药物在保管时，药瓶的标签上应标明 ()
- A.浓度 B.剂量 C.名称 D.不良反应
E.禁忌证
2. 容易氧化和遇光变质药物保存时应 ()
- A.远离明火处 B.装入有色瓶中 C.放阴凉处
D.应放在冰箱内
E.加盖密封
3. 应放入冰箱内保存的药物有 ()
- A.地塞米松 B.破伤风抗毒素 C.胎盘球蛋白
D.胰岛素 E.氢化可的松
4. 分发药物时应做到 ()
- A.发给患者后离开 B.仔细查对患者与药物
C.向病人解释眼药方法

D.病人不在，查对正确放床头柜上 E.危重病人帮助服药

二、问答题

(一) 三查七对一注意的内容是什么？

(二) 简述药疗的原则。

注射法作业习题

一、选择题

单选题

1. 婴儿接种卡介苗正确的部位及方法
()

A. 前臂掌侧下段，皮内注射 B. 三角肌下缘，皮内注射
C. 三角肌下缘，皮下注射 D. 三角肌，肌肉注射
E. 股外侧，皮下注射

2. 臀大肌注射的连线定位法正确的一项是
()

A. 髂嵴和尾骨联线的外上 1 / 3 处 B. 髂嵴和尾骨联线的下 1 / 3 处
C. 髂前上棘和尾骨联线的中 1 / 3 处 D. 髂前上棘和尾骨联线的下 1 / 3 处
E. 髂前上棘和尾骨联线的外上 1/3 处

3. 为 2 岁以下婴幼儿作肌肉注射的不恰当

做法是（ ）

- A. 宜选用臀大肌
- B. 注射时固定肢体，以防断针
- C. 切勿把针梗全部刺入
- D. 需长期注射者，注射部位应交替更换
- E. 两种药物同时注射时，需注意配伍禁忌

4. 为某病员静脉推注高渗葡萄糖时有阻力，但无肿胀，抽之有回血，用局部热敷无效应考虑是（ ）

- A. 针头滑出血管外
- B. 针头部分阻塞
- C. 针头斜面紧贴血管壁
- D. 针头斜面一部分穿透下面血管壁
- E. 静脉痉挛

5. 股静脉的穿刺部位在（ ）

- A. 股动脉内侧
- B. 股动脉外侧
- C. 股神经内侧
- D. 股神经外侧
- E. 股神经和股动脉之间

6. 两岁以下的婴幼儿肌肉注射时最好选用（ ）

- A. 臀大肌
- B. 股外侧肌
- C. 臀中、小肌
- D. 前臂外侧
- E. 上臂三角肌

7. 下列哪项不符合无痛注射法（ ）

- A. 分散病人的注意力
- B. 使肌肉松弛
- C. 注射时做到“二快一慢”
- D. 注射刺激强的药浓针头要长

E. 先注射刺激性强的药物，后注射刺激性弱的药物

8. 有关皮内注射的论述，哪项是错误的（ ）

A. 部位是前臂掌侧 B. 消毒忌用碘酊

C. 进针角度为5度

D. 拔针时勿按压 E. 只用于药物过敏试验

9. 灭菌注射器及针头哪部分手可接触（ ）

A. 针尖 B. 活塞 C. 乳头 D. 针梗

E. 针栓

10. 各种注射的定位法哪项是对的（ ）

A. 臀大肌注射法→髂嵴和尾骨联线的外上1/3

B. 皮内（ID）→前臂掌侧上段

C. 皮下（H）→肩峰下2~3横指的三角肌处

D. 股静脉→股三角区外上方

E. 臀中肌注射法→髂前上棘外侧三横指处

多选题

1. 为小儿作肌肉注射应（ ）

A. 固定针梗部位 B. 防止针头脱出、药

- 液外流 C. 不可选择臀小肌注射
D. 必要时可快进针、快射药 E. 可选择臀大肌注射
2. 静脉注射选择的血管应 ()
A. 较粗直 B. 靠关节处 C. 弹性好
D. 靠静脉瓣处
E. 无脂肪肌肉处
3. 肌肉注射部位应选择 ()
A. 肌肉较肥厚 B. 远离大神经
C. 远离大血管
D. 皮肤无发炎、化脓、硬结 E. 无皮肤病处
4. 皮下注射部位 ()
A. 上臂三角肌下缘 B. 上臂外侧 C. 腹部
D. 后背 E. 大腿外侧方

二、问答题

- (一) 阐述注射原则.
- (二) 在静脉注射的过程中, 应注意哪些事项?
- (三) 静脉注射常见的失败原因有哪些
- (四) 2 岁以下婴幼儿为何不宜选臀大肌注射?

过敏试验作业习题

选择题

单选题

1. 引起青霉素过敏反应的生物活性介质中，错误的是（ ）

A 组织胺 B 缓激肽 C 白三烯 D 5-羟色胺 E 多巴胺

2. 青霉素过敏性休克的临床表现中，不符的是（ ）

A. 呼吸道阻塞症状 B. 循环衰竭症状 C. 发热、关节疼痛症状

D. 中枢神经系统症状 E. 皮肤过敏症状

3. 青霉素过敏性休克在抢救时首先采取的措施是（ ）

A. 立即通知医生抢救 B. 静脉注射 0.1% 盐酸肾上腺素

C. 立即停药，平卧，皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素

D. 立即吸氧，行胸外心脏按摩

E. 静脉输液，给氢化考的松

4. 引起青霉素过敏性休克的抗体是（ ）

A. IgA B. IgM C. IgG D. IgE E. IgD

5. TAT 需重做皮试的时间是（ ）

A. 停药 1 天 B. 停药 3 天 C. 停药 7 天 D.

停药 14 天 E. 停药 20 天

6. 以下应做青霉素过敏试验的项目中哪项不符 ()

A. 首次使用青霉素 B. 停止使用青霉素 24h, 需再用时

C. 停止使用青霉素三天后, 需再用时

D. 在青霉素使用过程中, 更换批号时

E. 在青霉素使用过程中, 转换医院后需再用时

7. 患者张某, 患股部脓肿, 需用青霉素治疗, 在做青霉素皮试时突然发生

了过敏性休克, 其原因是 ()

A. 病人体内已有特异性抗体 B. 病人对青霉素耐受性差

C. 病人从未接触过青霉素 D. 青霉素剂量过大

E. 病人对青霉素分子过于敏感

8. 关于青霉素使用时的注意点, 哪项是错误的 ()

A. 先作皮试, 阴性者方可注射 B. 皮试后护士须守候观察病人 15~20 分钟

C. 停用一周需再用时, 要重作皮试 D. 确为阳性, 要做阳性标记

E. 注射时应备盐酸肾上腺素

9. 过敏性休克出现中枢神经系统症状是由

于（ ）

- A. 肺水肿
- B. 有效循环血量锐减
- C. 脑组织缺氧
- D. 肾功能衰竭
- E. 毛细血管扩张，通透性增加

10. 青霉素过敏性休克，以下哪些临床表现不是因循环衰竭而引起（ ）

- A. 紫钳
- B. 血压下降
- C. 脉搏细弱
- D. 面色苍白、出冷汗
- E. 幻觉、谵妄

多选题

1. 使用青霉素引起血清病型反应的表现有（ ）

- A. 胸闷气短
- B. 脉细弱，血压下降
- C. 发热、关节肿疼
- D. 皮肤瘙痒、荨麻疹
- E. 淋巴结肿大、腹痛

2. 过敏性休克出现中枢神经系统症状的表现是（ ）

- A. 胸闷、气促
- B. 头晕、眼花
- C. 脉细弱，血压下降
- D. 意识丧失
- E. 面部及四肢麻木

3. 做过敏试验前应询问的内容是（ ）

- A. 用药史
- B. 过敏史
- C. 现病史

D. 家族史 E. 生活史

4. 抢救过敏性休克时，使用肾上腺素的目的是（ ）

A. 升高血压 B. 收缩血管，减低其通透性 C. 兴奋心肌，增加心输出量
D. 松弛支气管平滑肌 E. 脱敏

5. 发生药物过敏性休克时，病人表现胸闷，气促伴濒死感是由于以下哪些原因引起（ ）

A. 脑缺氧 B. 循环衰竭 C. 喉水肿
D. 心力衰竭 E. 肺水肿

二、问答题

（一）如何观察青霉素过敏试验阳性结果？

（二）青霉素过敏性休克有哪些临床表现？

（三）综合分析题

患者王三妹，体温 39°C ，诊断为化脓性扁桃腺炎。医嘱肌肉注射青霉素 80 万 u q6h，护士在做青霉素皮试后约 5 分钟，病人突然感到胸闷、气促，面色苍白，出冷汗，脉细弱，测血压 10.66/6.67kpa，呼之不应，请问王三妹是什么情况？如何急救？

。

口服给药法作业习题答案

一、选择题

单选题

1. 执行给药原则中，哪项是最重要的
(A)
 - A. 遵医嘱给药
 - B. 给药途径要准确
 - C. 给药时间要准确
 - D. 注意用药不良反应
 - E. 给药中要经常观察疗效

2. 服磺胺药物需多饮水的目的是
(C)

- A. 避免损害造血系统
- B. 减轻服药引起的恶心
- C. 避免尿中析出结晶
- D. 避免影响血液酸碱度
- E. 增加药物疗效

3. 服用毛地黄制剂的病人（成人），心率每分钟少于多少次时不可使用(D)

- A. 30 次 / 分钟
- B. 40 次 / 分钟
- C. 50 次 / 分钟
- D. 60 次 / 分钟
- E. 70 次 / 分钟

4. 护士发药时，下列哪项做法不符合要求
(E. ..)

- A. 服铁剂药后需漱口
- B. 危重病人及小儿应喂服
- C. 服毛地黄前需测心率
- D. 服安眠药应防成瘾
- E. 遇病人有疑问时，应说服其服药

5. 剧毒药及麻醉药的最主要保管原则是
(C)

- A. 药名用中、外文对照

- B. 装密封瓶中保存
 - C. 应加锁并认真交班
 - D. 于阴凉处存放
 - E. 药物分类放置
6. 应避免与牙齿接触的药物是（ C ）
- A. 止咳合剂
 - B. 棕色合剂
 - C. 1%稀盐酸
 - D. 碳酸氢钠
 - E. 颠茄合剂

多选题

1. 药物在保管时，药瓶的标签上应标明（ABC）
- A.浓度
 - B.剂量
 - C.名称
 - D.不良反应
 - E.禁忌证
2. 容易氧化和遇光变质药物保存时应（ BCE ）
- A.远离明火处
 - B.装入有色瓶中

C.放阴凉处

D.应放在冰箱内

E.加盖密封

3. 应放入冰箱内保存的药物有（ BCD ）

A.地塞米松

B.破伤风抗毒素

C.胎盘球蛋白

D.胰岛素

E.氢化可的松

4. 分发药物时应做到（ BCE ）

A.发给患者后离开

B.仔细查对患者与药物

C.向病人解释眼药方法

D.病人不在，查对正确放床头柜上

E.危重病人帮助服药

二、问答题

（一）三查七对一注意的内容是什么？

三查：操作前、操作中、操作后查。

七对：对床号、姓名、药名、浓度、剂量、方法、时间。

注意：注意用药后

（二）简述药疗的原则。

药疗的原则：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/748014021141006033>