

2024 年重庆市成考（专升本）大学医学综合预测试卷

一、单选题

1、Brudzinski征阳性的表现是（）

- (A)趾背伸四趾屈曲
- (B)颈部抵抗增强
- (C)股四头肌收缩
- (D)伸膝受阻伴疼痛
- (E)髋关节及膝关节屈曲

2、女，54岁。查体：肝脏于剑突下 1.5cm 可触及，质地如触口唇，无触痛。最可能的情况是（）

- (A)肝左叶癌
- (B)慢性肝炎
- (C)正常肝脏
- (D)肝淤血
- (E)肝脓肿

3、两侧同时收缩，使脊柱后伸的肌是（）

- (A)背阔肌
- (B)竖脊肌
- (C)胸大肌
- (D)斜方肌
- (E)腹直肌

4、具有上行唤醒作用的神经结构被称为（）

- (A)特殊感觉传入纤维

(B)本体感觉传入通路

(C)内脏感觉传入神经

(D)感觉的非特异性投射系统

5、根据烧伤早期补液的原则，第一个8小时内，应该输入第一天总液体量的【】

(A) 1 / 6

(B) 1 / 3

(C) 1 / 4

(D) 1 / 5

(E) 1 / 2

6、三尖瓣所在的位置是（）

(A)左房室口

(B)肺动脉口

(C)主动脉口

(D)冠状窦口

(E)右房室口

7、增加冠脉血流量最主要的因素是（）

(A)交感神经兴奋

(B)迷走神经兴奋

(C)血管紧张素II分泌增多

(D)心肌代谢增强

(E)血管升压素分泌增多

8、大量胸腔积液患者不易出现的体征是（）

(A)患侧闻及胸膜摩擦音

- (B)气管向健侧移位
- (C)患侧语音震颤减弱
- (D)患侧胸廓扩张度减弱
- (E)患侧肋间隙增宽

9、代谢性碱中毒常同时存在的电解质紊乱是()

- (A)高钾血症
- (B)低钠血症
- (C)高钠血症
- (D)低钾血症

10、女，62岁。诊断为胃癌。查体：血压：150/100mmHg，消瘦，重度贫血。下列术前准备中，不必要的项目是()

- (A)纠正贫血
- (B)血压降至正常
- (C)检测肝功能
- (D)改善营养状态

11、某心悸患者查体所见：脉率89次/分，心率113次/分，心律绝对不齐。最可能的诊断是（）

- (A)房性期前收缩
- (B)室上性心动过速
- (C)心房颤动
- (D)室颤
- (E)室性期前收缩

12、男，45岁。因突发上腹痛并迅速向全腹蔓延3小时就诊。查体：T38.8℃。全腹压痛及反跳痛阳性，肝浊音界消失。最可能的诊断是（）

(A)急性胃穿孔

(B)急性胃肠炎

(C)急性肠梗阻

(D)急性胰腺炎

(E)急性胆管炎

13、男，70岁。有慢性支气管炎病史30年。受凉后突发气促、烦躁3天。查体：口唇发绀，呼吸36次/分，脉率100次/分，双肺闻及哮鸣音。首选的辅助检查是（）

(A)心电图

(B)血常规

(C)血气分析

(D)肺功能

14、男，66岁。反复咯血3年。查体：双下肺固定湿啰音。胸部X线片提示双下肺纹理粗乱。最可能的诊断是（）

(A)支气管扩张症

(B)结核性胸膜炎

(C)支气管肺炎

(D)肺脓肿

15、输血的目的不包括（）

(A)杀灭细菌，抗感染

(B)纠正贫血

(C)改善凝血功能

(D)对出血患者补充血容量

(E)提高血浆蛋白

16、女，32岁。低热、盗汗、腹胀2个月。腹水检查结果：比重1.018，蛋白27g/L，WBC $600\times 10^6/L$ ，L0.55。普通细菌培养阴性。最可能的诊断是（）

(A)结核性腹膜炎

(B)化脓性腹膜炎

(C)肝硬化腹水

(D)恶性腹水

(E)自发性细菌性腹膜炎

17、动脉血压升高时心动周期主要的变化是【】

（A）等容收缩期延长

（B）房缩期延长

（C）快速射血期延长

（D）减慢射血期延长

（E）心室舒张期延长

18、心脏内兴奋传导最慢的组织是（）

(A)窦房结

(B)浦肯野纤维

(C)房室结

(D)心室肌

19、下列属于内耳结构的是【】

（A）鼓室

（B）鼓膜

- (C) 乳突小房
- (D) 咽鼓管
- (E) 耳蜗

20、某患者因上腹痛就诊。查体：按压右肋弓与腹直肌外缘交界处，患者深呼气因疼痛而受限。最可能的诊断是【】

- (A) 十二指肠溃疡
- (B) 下尿路感染
- (C) 急性胆囊炎
- (D) 急性胰腺炎
- (E) 胆管结石

21、光期引起视杆细胞膜发生的变化是（）

- (A)超极化
- (B)极化
- (C)反极化
- (D)去极化
- (E)复极化

22、男，40岁。发现高血压半年。查体时于脐部偏右上闻及血管杂音。最可能的诊断是（）

- (A)主动脉夹层
- (B)原发性肝癌
- (C)缺血性肠病
- (D)门静脉血栓
- (E)肾动脉狭窄

23、肺气肿患者可能出现的体征是（）

- (A)双侧肋间隙变窄
- (B)肝上界下移
- (C)心界向两侧扩大
- (D)双肺语音震颤增强
- (E)肺部叩诊呈鼓音

24、两侧同时收缩，使脊柱后伸的肌是（）

- (A)背阔肌
- (B)竖脊肌
- (C)胸大肌
- (D)斜方肌
- (E)腹直肌

25、最常见于老年人额头部的灰黑色斑块是（）

- (A)乳头状疣
- (B)黑色素瘤
- (C)老年斑
- (D)黑痣
- (E)皮肤癌

26、二尖瓣关闭不全典型的体征是（）

- (A)心尖部闻及收缩期吹风样高调杂音
- (B)胸骨左缘第2肋间闻及 GrahamStell 杂音
- (C)心尖部闻及舒张中期杂音
- (D)胸骨左缘第3肋间闻及收缩期粗糙杂音

(E)胸骨左缘第 2 肋间闻及连续性杂音

27、下列最符合内环境稳态概念的描述是()

(A)组织液理化性质相对稳定

(B)血浆各成分保持恒定

(C)细胞质渗透压稳定

(D)细胞内液 pH 相对稳定

28、支配小腿后群肌的神经是【】

(A) 胫神经

(B) 股神经

(C) 腓浅神经

(D) 闭孔神经

(E) 腓深神经

29、与组织液中含量基本相同的血浆成分是（）

(A)球蛋白

(B)纤维蛋白原

(C)清蛋白

(D)透明质酸

(E)电解质

30、属于腹膜内位器官的是()

(A)横结肠

(B)直肠

(C)降结肠

(D)升结肠

31、测量血压时舒张压的判定为（）

(A)听到声音变短促前的压力

(B)听到柔和吹风样杂音时的压力

(C)听到响亮拍击音时的压力

(D)拍击音重新出现时的压力

(E)声音消失时的压力

32、污染伤口是指（）

(A)有细菌存在，但尚未发生感染的伤口

(B)有细菌存在，并已发生感染的伤口

(C)局部红肿并有分泌物的伤口

(D)腹股沟疝手术切口

(E)已化脓的伤口

33、迷走神经背核属于【】

（A）一般内脏运动柱

（B）一般躯体运动柱

（C）特殊内脏运动柱

（D）一般躯体感觉柱

（E）特殊躯体感觉柱

34、男，50岁。间断反酸，规律性剑突下疼痛2年，排柏油样便2天。最可能的诊断是

【】

（A）急性糜烂出血性胃炎

（B）胃癌伴消化道出血

（C）消化性溃疡并出血

）贲门黏膜撕裂综合征

(E) 食管静脉曲张破裂出血

35、参与应激反应的最主要激素是【】

(A) 胰岛素

(B) 催产素

(C) 醛固酮

(D) 皮质醇

(E) 促黑激素

36、女，51岁。下列问诊中属于个人史的是()

(A)出生地与居住地

(B)闭经日期，绝经年龄

(C)结婚年龄，配偶健康状况

(D)妊娠与生育次数

37、胆囊窝位于肝下面“H”形沟的部位是（）

(A)右纵沟后部

(B)右纵沟前部

(C)左纵沟前部

(D)左纵沟后部

(E)横沟

38、男，23岁。因发热、呼吸困难2周就诊。查体：颈静脉怒张，心音遥远，心界向两侧扩大。最可能的诊断是【】

(A) 感染性心内膜炎

(B) 结核性心包炎

）风湿性心脏瓣膜病

(D) 原发性高血压

(E) 肥厚型心肌病

39、某患者的检验报告如下，导致其发生猝死最可能的原因是（）

(A)血磷 0.8mmol/L

(B)血钾 7.0mmol/L

(C)血钠 158mmol/L

(D)血氨 87 μ mol/L

(E)血钙 19mmol/L

40、主动脉瓣关闭不全心脏杂音的特点是【】

(A) 胸骨左缘第 2 肋间最明显

(B) 向下颌及左上肢传导

(C) 为递减性叹气样杂音

(D) 多在舒张晚期出现

(E) 左侧卧位时听诊最清楚

二、多选题

41、CO₂在血液中运输的形式有【】

(A) 和水结合形成碳酸

(B) 物理溶解

(C) 形成碳酸氢盐

(D) 形成碳氧血红蛋白

(E) 形成氨基甲酰血红蛋白

42、可引起肾性急性肾衰竭的病因有()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/748115074001006140>