N2级护理人员理论考核模拟习题与参考答案

一、单选题（共104题，每题1分，共104分）

1.叶某,男,38 岁。近半年来常于劳累或精神紧张后头痛、头晕.休息后好转,未予治疗。最近体检发现血压升高,三次不同时间测血压分别为140/190mmHg 、150/95mmHg 、155/95mHg 对其诊断与处理最重要的考虑应为()

A、继续在不同时间内测血压,以帮助确诊

B、注意休息,缓解精神紧张

C、确定是原发性还是继发性高血压

D、试用利尿药治疗,观察其用药反应

E、暂不处理,3个月后复查血压

正确答案：C

2.下列关于PICC置管术不正确的是( )

A、经外周静脉穿刺置入

B、是中心静脉导管

C、其尖端位于上腔静脉

D、其尖端位于颈内静脉

正确答案：D

3.王菜,男,45 岁。上腹部胀痛不适已有多年.曾多次到医院就诊.拟诊为胃溃疡或慢性胃炎。当他向您咨询时,您认为最好的鉴别方法是建议他作下列检查中的()

A、X线钡剂检查

B、纤维胃镜检查

C、粪便隐血试验

D、胃黏膜脱落细胞检查

E、胃液分析

正确答案：B

4.方某,男,58 岁,因“肝炎后肝硬化失代偿期”收人院,该病人每天的进水量,应限制在()

A、1500ml 以内.

B、200ml 以内

C、3000ml 以内

D、2500ml 以内

E、1000ml 以内

正确答案：E

5.吸痰时密切观察患者心率、血压和( )的变化，及时发现患者缺氧的症状

A、呼吸

B、口唇

C、血氧饱和度

D、面色

正确答案：C

6.厌氧菌感染用( )

A、0.2%醋酸溶液

B、0.08%甲硝唑溶液

C、碳酸氢钠

D、0.1%醋酸溶液

正确答案：B

7.对肝性脑病病人要注意水、电解质平衡,但下列哪项不妥()

A、水不宜摄入过多

B、正确记录出入水量

C、限制钠盐

D、不需补钾

E、根据需要测定血电解质

正确答案：D

8.糖尿病最常见的神经病变是()

A、脑神经病变

B、脊髓病变

C、周围神经病变

D、神经根病变

E、自主神经病变

正确答案：C

9.误吸和吸入性肺炎临床表现神清者表现为咳嗽、气急。神志不清时常无明显症状，但 1-2 小时后可出现呼吸困难，发绀、低血压，咳出浆液性或( )。

A、咖啡色泡沫痰

B、粉红色泡沫痰

C、血性泡沫痰

D、淡红色泡沫痰

正确答案：C

10.急性心肌梗死最突出的症状是()

A、心律失常

B、心前区痛

C、休克

D、胃肠道症状

E、充血性心力衰竭

正确答案：B

11.致命性心律失常指的是()

A、阵发性室性心动过速

B、心室扑动和心室颤动

C、房性心动过速

D、完全性房室传导阻滞

E、心房颤动

正确答案：B

12.以下选项不属于左心衰竭的表现的是()

A、咯血

B、恶心、呕吐

C、疲乏无力

D、咳嗽、咳痰

E、呼吸困难

正确答案：B

13.尿酸结晶发生于( )

A、喜食腌制食品者

B、部分健康人群

C、尿路造口患者

D、饮酒后

正确答案：C

14.股静脉在股动脉内侧约( )处，在进行股静脉采血时，用消毒液消毒食指和中指，于股三角区扪及股动脉，并用手指加以固定

A、1.5

B、0.5

C、0.6

D、1

正确答案：B

15.孕妇最易并发哪种贫血()

A、缺铁性贫血

B、珠蛋白生成障碍性贫血

C、再生障性贫血

D、溶血性贫血

E、恶性贫血

正确答案：A

16.栓塞患者应立即予以吸氧，氧浓度达( )以上。必要时气管插管行呼吸机治疗，并采用呼气末正压呼吸模式。

A、30%

B、40%

C、20%

D、50%

正确答案：D

17.目前糖尿病主要死亡原因是()

A、高渗性非酮症糖尿病昏迷

B、神经病变

C、糖尿病酮症酸中毒昏迷

D、感染

E、心血管并发症

正确答案：E

18.肝性脑病患者禁用( )，充血性心力衰竭和水钠潴留患者禁用生理盐水灌肠

A、温开水

B、肥皂液灌肠

C、生理盐水

D、清水

正确答案：B

19.钱某,女.20 岁,学生。诊断为病毒性心肌炎。下列健康指导内容最恰当的是()

A、保持卧床休息.减少心肌耗氧,利于心功能恢复

B、高蛋白、高脂肪、富含维生素饮食

C、遵医嘱长期应用抗病毒药,预防感染

D、注意保暖,预防感冒,1 年内避免剧烈运动或重体力劳动

E、避免生冷食物、妊娠等

正确答案：D

20.发现血钾不足及时静脉补充 10%氯化钾注射液，静脉滴注药液含钾浓度一般不超过( )。

A、0.2%

B、0.4%

C、0.3%

D、0.1%

正确答案：C

21.肾结核最常见的症状是()

A、肾积水

B、尿频

C、贫血

D、肾区疼痛

E、潮热、盗汗

正确答案：B

22.采取个性化透析，年老体弱纳差者，透析液钾浓度应相对略高，一般为( )

A、3.0—3.5mmol /L

B、2.0—3.5mmol /L

C、3.3—3.5mmol /L

D、3.4—3.5mmol /L

正确答案：A

23.若出现窦性心动过缓、窦性停搏、窦房传导阻滞或房室传导阻滞，症状轻能自行恢复者可( )

A、安装心脏起搏器

B、使用阿托品以提高心率

C、使用异丙肾上腺素以提高心率

D、不做特殊处理

正确答案：D

24.患者出现静脉炎时常规给予硫酸镁眼血管方向湿敷，持续时间( )小时

A、6-8

B、6-7

C、7-8

D、5-4

正确答案：C

25.PICC 导管从( )穿刺置入，可在直视或超声引导下进行操作。操作程序比颈内静脉、锁骨下静脉穿刺简单，安全、易于掌握和成功。

A、外周静脉

B、中心静脉

C、外周动脉

D、主动脉

正确答案：A

26.以下药物静脉推注前务必要稀释的是()

A、腺苷

B、毛花苷 C

C、利多卡因

D、普罗帕酮

E、呋塞米

正确答案：B

27.再生障碍性贫血引起贫血最主要的原因是什么()

A、红细胞破坏过多

B、失血

C、骨髓造血功能低下

D、造血原料缺乏

E、无效性红细胞生成

正确答案：C

28.引起尿路感染的最常见病原微生物是()

A、变形杆菌

B、肠球菌

C、克雷伯菌

D、大肠埃希菌

E、葡萄球菌

正确答案：D

29.脑室引流管滑脱时，协助患者保持( )，避免大幅度活动，不可自行

将滑脱的导管送回

A、半卧位

B、右侧卧位

C、左侧卧位

D、平卧位

正确答案：D

30.( )肌萎缩变平坦，拇指不能内收

A、大鱼际

B、小鱼际

C、环指间

D、掌骨间

正确答案：B

31.社区获得性肺炎最常见的致病菌是()

A、金黄色葡萄球菌

B、铜绿假单胞菌

C、乙型溶血性链球菌

D、肺炎链球菌

E、肺炎克雷伯杆菌

正确答案：D

32.肋骨骨折最常见于()

A、9~10 肋骨

B、1~3 肋骨

C、11~12 肋骨

D、4~7 肋骨

E、7~9 肋骨

正确答案：D

33.肝硬化形成门静脉高压的病理基础是()

A、肝内血流紊乱

B、门静脉分支阻塞

C、门静脉血流量增加

D、肝内血管血检形成

E、门静脉狭窄

正确答案：A

34.彭某,女,38 岁。维持性血液透析治疗 2 年。血液透析过程中出现出冷

汗、头晕、心悸,病人最可能发生了( )
A、心力衰竭
B、透析器反应
C、低血钙
D、低血压
E、感染
正确答案：D
35.对于心血管功能不稳定者，透析时血流量不宜过大，宜维持在( )
A、180ml /min
B、150ml /min
C、160ml /min
D、156ml /min
正确答案：A
36.鼻饲患者需加强口腔护理，保持局部湿润，给予雾化吸入，口服( )及激素治疗，以减轻水肿，营养神经，促进康复。
A、维生素 A
B、B 族维生素
C、维生素 C
D、维生素 D
正确答案：B
37.夏某,男,25 岁。上呼吸道感染后发生急进性肾小球肾炎入院,该病人在实验室指标方面应重点监测( )
A、外周血白细胞计数
B、ASO 滴度
C、血肌酐
D、尿蛋白
E、尿菌计数
正确答案：C
38.肝性脑病避免使用的药物有()
A、甲硝唑,门冬氯酸钾镁,吗啡
B、利福昔明、新霉素.苯巴比妥纳
C、水合氯醛、新霉素、苯巴比妥钠
D、门冬氯酸钾镁、利福昔明,哌替啶
E、吗啡、水合氯醛、哌替啶

正确答案：E

39.除颤易使心腔内新形成的栓子脱落而造成栓塞。左心腔栓子脱落易造成( )，一般在电除颤 24-48 小时或 2 周后发生。

A、脑循环栓塞

B、肺循环栓塞

C、下肢栓塞

D、体循环栓塞

正确答案：D

40.徐某,男,85 岁。诊断为支气管扩张症。目前病人持续咳嗽,咳嗽无力,听诊左肺底湿啰音明显。护士给予的护理措施中错误的是( )

A、经鼻腔进行吸痰

B、吸痰前后适当调高吸氧浓度

C、每天饮水 1500ml 以上

D、遵医嘱给予雾化吸入

E、采取左侧卧位进行体位引流

正确答案：E

41.白某,男,48 岁,诊断为 COPD。病人诉咳痰费力,医生拟行纤维支气管镜检查。病人询问护士为什么要做该项检查,下列回答正确的是( )

A、明确病因及出血部位

B、清除粘稠的分泌物

C、灌洗支气管肺泡

D、局部止血治疗

E、引导气管导管进行经鼻气管插管

正确答案：B

42.污染的伤口消毒待干后(如需用药的伤口则正常用药)，用无菌敷料覆盖伤口，防水敷料可作为二级敷料固定( )

A、一级敷料

B、三级敷料

C、敷料

D、位置

正确答案：A

43.下述项不属常见诊断失误的原因

A、病人欠合作

B、主观臆断

C、体查不细致、不全面

D、医学知识不足

E、病史资料不完整、不准确

正确答案：A

44.高压氧治疗时临床上常用的压力单位是()

A、绝对压

B、大气压

C、附加压

D、氧压

E、表压

正确答案：A

45.避免放射性肺炎发生的重要措施是

A、大面积照射时,放射剂量应控制在 40Gy 以下

B、大剂量联合化疗

C、一般不用抗生素

D、大剂量博来霉素

E、防止癌细胞扩散,不用激素

正确答案：A

46.造口旁疝教育患者术后 6-8 周避免做( )

A、增加腹压的工作

B、卧床休息

C、深蹲动作

D、剧烈运动

正确答案：A

47.指导患者定期更换造口底盘。回肠造口( )更换。如造口底盘渗漏，应及时更换。

A、3-5 天

B、1-3 天

C、5-7 天

D、7-8 天

正确答案：A

48.下列不属于 PICC 导管异位临床表现的是( )

A、导管推送困难或导管无法置入预定长度

B、推注盐水困难

C、导管尖端到达颈内、外静脉
D、导管尖端到达对侧锁骨下静脉
E、拔除导丝困难
正确答案：E
49.李某,男,82 岁。因肺部感染、慢性肺源性心脏病、II 型呼吸衰竭入院。病人意识不清,已行机械通气治疗。护士在对其进行开放式气管内吸痰操作时,下列不妥的是()
A、吸痰时帮助病人平卧且头偏向一侧
B、每次吸引持续时间不超过 15 秒
C、采用负压进行吸痰
D、吸痰中加大给氧流量
E、两次抽吸间隔时间大于 3 分钟
正确答案：D
50.张某,男,78 岁。咳嗽、咳痰,痰多粘稠。身体评估:P 90 次/分.R 18 次/分,BP 89/53mmHg,双下肢水肿明显。为促进排痰,拟进行体位引流。护士对该病人的指导中,错误的是（）
A、坐位引流
B、头低位引流
C、饭后 2 小时进行
D、每次引流时间 I5 分钟
E、每天 2 次
正确答案：B
51.机械通气过程中因( )，回心血量减少而导致血压下降
A、腹腔内压
B、胸膜内压
C、肺内压
D、胸内压升高
正确答案：D
52.蔡某、男.70 岁。因 COPD 急性加重出现极度呼吸困难.张口呼吸,医嘱给予无创呼吸机进行正压通气,护士评估时发现病人一口义齿,仅在进食时佩戴。护士在实施无创正压通气时,操作正确的是( )
A、通气模式选择 CPAP
B、人机连接选用鼻罩
C、协助病人取半卧位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/748143130031007045