2023-24年黑龙江省红岗区《执业药师之西药学专业二》考试必背200题大全附解析答案

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.为鲨烯环氧酶的非竞争性、可逆性抑制剂，用于手癣、足癣、体癣及皮肤念珠菌病的药物是

A：特比萘芬

B：联苯卡唑

C：阿莫罗芬

D：制霉菌素

答案：A

2.单纯疱疹病毒感染的首选药是

A：干扰素

B：金刚烷胺

C：阿昔洛韦

D：碘苷

答案：C

3.强心苷中毒最早出现的症状是

A：房室传导阻滞

B：眩晕、乏力和视力模糊

C：厌食、恶心和呕吐

D：色视

答案：C

4.巨幼细胞贫血应首选

A：叶酸+维生素B12

B：维生素B12

C：亚叶酸钙

D：维生素B6

答案：A

5.维生素A的适应症不包括

A：角膜软化

B：干眼病

C：夜盲症

D：甲状旁腺功能不全引起的低钙血症

答案：D

6.主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

A：氟维司群

B：来曲唑

C：他莫昔芬

D：依西美坦

答案：C

7.能治疗强心苷中毒引起的窦性心动过缓的是

A：苯妥英钠

B：哌替啶

C：利血平

D：阿托品

答案：D

8.属于助消化药的是()

A：胃蛋白酶

B：莫沙必利

C：奥美拉唑

D：胶体果胶铋

答案：A

9.哮喘急性发作首选的药物是

A：沙丁胺醇气雾剂

B：羧甲司坦口服液

C：孟鲁司特片

D：布地奈德福莫特罗吸入剂

答案：A

10.属于促凝血因子合成的药物是()

A：蛇毒血凝酶

B：卡巴克络

C：甲萘氢醌

D：鱼精蛋白

答案：C

11.壬二酸的作用特点不包括

A：局部使用能显著减少滤泡内丙酸杆菌的生长

B：可直接抑制皮肤表面的细菌

C：可竞争性抑制产生二氢睾酮的酶过程

D：对厌氧茵无抑制和杀灭作用

答案：D

12.治疗厌氧菌引起的严重感染的药物是

A：克林霉素

B：万古霉素

C：红霉素

D：克拉霉素

答案：A

13.耐青霉素酶青霉素类的是

A：氨苄西林

B：苯唑西林

C：哌拉西林

D：青霉素V

答案：B

14.氯霉素属于

A：酰胺醇类

B：β-内酰胺类

C：四环素类

D：氨基糖苷类

答案：A

15.头孢曲松

A：肾毒性较大

B：口服，肌内注射或静脉注射均可用于全身感染

C：脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

D：与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

答案：C

16.导致胃肠道溃疡及出血风险较其他传统非甾体抗炎药低的是

A：吲哚美辛

B：塞来昔布

C：对乙酰氨基酚

D：布洛芬

答案：B

17.（2021年真题）能抑制外周（甲状腺外）T4转化为T3的抗甲状腺药物是（）

A：卡比马唑

B：美托洛尔

C：甲巯咪唑

D：丙硫氧嘧啶

答案：D

18.甲氧苄啶与磺胺合用是因为

A：减少泌尿道损害

B：相互对抗不良反应

C：抗菌谱相似

D：双重阻断细菌的叶酸代谢

答案：D

19.克林霉素与红霉素合用()

A：后者血药浓度下降，药效降低

B：不良反应叠加

C：药理作用拮抗

D: 后者血药浓度升高，不良反应增加

答案：C

20.降低肾素活性最强的药物是

A: 普萘洛尔

B: 硝苯地平

C: 可乐定

D: 卡托普利

答案：A

21.男性，70岁，进食后饱胀不适伴反酸5年余，黑便1天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1期）伴出血。13C呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史8年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0．9%氯化钠注射液100ml+注射用埃索美拉唑钠40mg，静脉滴注，2次／日；阿莫西林胶囊1g，口服，2次／日；克拉霉素缓释胶囊0．5g，口服，2次／日；注射用蛇毒血凝酶1KU，静脉注射，1次／日；替米沙坦40mg，口服，1次／日；硝苯地平缓释片30mg，口服，1次／日；美托洛尔12．5mg，口服，2次／日；胶体果胶铋胶囊100mg，口服，3次／日。

A: 胶体果胶铋胶囊

B: 克拉霉素

C: 埃索美拉唑

D: 硝苯地平缓释片

答案：C

22.以下属于袢利尿剂禁忌证的是

A: 高钾血症

B: 对磺胺过敏的患者

C：高血糖

D：高血压

答案：B

23.（2021年真题）通过直接抑制凝血因子Xa而发挥作用的抗凝血药物（）

A：氯吡格雷

B：利伐沙班

C：依诺肝素

D：华法林

答案：B

24.阿斯综合征患者禁用

A：卡马西平

B：氨已烯酸

C：苯妥英钠

D：丙戊酸钠

答案：C

25.噻嗪类利尿药发挥利尿作用的作用点是

A：Na^+-Cl^-共转运子

B：Na^+-K^+-2Cl^-同向转运子

C：碳酸酐酶

D：磷酸二酯酶

答案：A

26.止吐方案：每日化疗前，联合应用5-HT3受体阻断剂和口服地塞米松12mg，化疗后从第2日到第3日口服地塞米松或应用5-HT

A：低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
B：中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
C：重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
D：微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
答案：B

27.消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是
A：塞来昔布
B：阿司匹林
C：对乙酰氨基酚
D：吲哚美辛
答案：A

28.利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可用于慢性心力衰竭治疗的利尿药是
A：呋塞米
B：螺内酯
C：乙酰唑胺
D：氢氯噻嗪
答案：B

29.下列药物中不属于治疗疥疮的是
A：克罗米通
B：林旦霜
C：过氧苯甲酰
D：硫黄软膏
答案：C

30.糖尿病患者、颅内活动性出血患者禁用()

A: 乳果糖

B: 甘油

C: 硫酸镁

D: 聚乙二醇4000

答案：B

31.增加维生素B

A: 乙胺丁醇

B: 红霉素

C: 吡嗪酰胺

D: 异烟肼

答案：D

32.下列唯一被批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂是

A: 盐酸

B: 瑞舒伐他汀

C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案：D

33.可用于单纯疱疹性角膜炎的药物是

A: 碘苷

B: 奥布卡因

C: 阿托品

D: 20%甘露醇

答案：A

34.用于绝经期妇女骨质疏松的治疗药()

A: 雌二醇

B: 地塞米松

C: 黄体酮

D: 米非司酮

答案：A

35.羟甲唑啉滴鼻剂使用期间，可能发生的不良反应是

A: 血压下降

B: 流量

C: 鼻衄

D: 心率加快

答案：D

36.下列对外用糖皮质激素的叙述，不正确的是

A: 丁酸氢化可的松是中效外用糖皮质激素

B: 醋酸氢化可的松是弱效外用糖皮质激素

C: 糠酸莫米松是中效外用糖皮质激素

D: 氟轻松是强效外用糖皮质激素

答案：C

37.甲氨蝶呤抗肿瘤作用机制是抑制

A: 四氢叶酸还原酶

B: 四氢叶酸合成酶

C: 二氢叶酸合成酶

D: 二氢叶酸还原酶

答案：D

38.葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

A：高钾血症

B：低钠血症

C：高钠血症

D：低钾血症

答案：A

39.患者。男，42岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A：预期性恶心呕吐

B：爆发性恶心呕吐

C：急性恶心呕吐

D：延迟性恶心呕吐

答案：C

40.吡喹酮的抗虫作用首选用于

A：蛔虫

B：牛肉绦虫

C：血吸虫

D：丝虫

答案：C

41.下列药物中属于抗纤维蛋白溶解药的是

A：维生素K1

B：氨甲环酸

C：酚磺乙胺

D：卡巴克络

答案：B

42.（2020年真题）患者，女，26岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素(FT3、FT4)增高、促甲状腺素(TSH)降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

A: 普萘洛尔

B: 丙硫氧嘧啶

C: 碳酸锂

D: 甲巯咪唑

答案：D

43.（2015年真题）易导致血糖异常的药品是（）。

A: 加替沙星

B: 多西环素

C: 头孢哌酮

D: 庆大霉素

答案：A

44.属于事后避孕药的是

A: 壬苯醇醚

B: 氯地孕酮

C: 左炔诺孕酮

D: 米非司酮

答案：D

45.（2019年真题）长期大量使用可致泌尿系统尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石的维生素是（）

A：维生素

B：维生素A

C：维生素B2

D：维生素B6

答案：A

46.甲状腺功能亢进的内科治疗宜选用

A：甲巯咪唑

B：小剂量碘

C：大剂量碘

D：甲状腺素

答案：A

47.利血平与布洛芬合用

A：首剂量低血压反应

B：降压效应减弱

C：钠水潴留

D：口干、便秘、发热

答案：B

48.可引起巨幼红细胞性贫血的药物是()

A：氯喹

B：伯氨喹

C：甲氟喹

D：乙胺嘧啶

答案：D

49.存在中度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 多西他赛

B: 泼尼松

C: 卡莫司汀

D: 表柔比星

答案：D

50.()与利福平合用时，在用利福平前和疗程中不需调整剂量

A: 糖皮质激素

B: 氨茶碱

C: 地高辛

D: 氯霉素

答案：C

51.可导致视神经炎，治疗期间应监测眼部视力的抗结核药是

A: 乙胺丁醇

B: 利福喷丁

C: 吡嗪酰胺

D: 利福平

答案：A

52.可降低极低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油，主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

A: 瑞舒伐他汀

B: 利血平

C: 依折麦布

D: 阿昔莫司

答案：D

53.（2016年真题）易发生持续性干咳不良反应的药品是

A：福辛普利

B：氢氯噻嗪

C：硝苯地平

D：硝酸甘油

答案：A

54.属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的药品是

A：他莫昔芬

B：乙烯雌酚

C：氟他胺

D：托瑞米芬

答案：C

55.会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性(感觉障碍、痉挛)的行为是()。

A：冷水浴

B：接触塑料制品

C：日光浴

D：饮用热饮

答案：A

56.与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是

A：柔红霉素

B：阿糖胞苷

C：甲氨蝶呤

D：右雷佐生月德

答案：A

57.单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

A: 帕洛诺司琼

B: 劳拉西泮

C: 甲氧氯普胺

D: 氯丙嗪

答案：B

58.患者，男，19岁，既往有癫痫病史2年，长期服用苯妥英钠控制良好。1周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4次/日。

A: 抑制H

B: 中和胃酸

C: 保护胃黏膜

D: 阻断组胺H

答案：D

59.肾上腺皮质功能不全采用

A: 抗菌药物与糖皮质激素合用

B: 抗结核药与糖皮质激素合用

C: 糖皮质激素替代疗法

D: 早期、大剂量、短期应用糖皮质激素

答案：C

60.甲亢术前准备的正确给药方法是()

A：先给碘化物，术前2周再给硫脲类

B：只给碘化物

C：先给硫脲类，术前2周再给碘化物

D：只给硫脲类

答案：C

61.（2019年真题）以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者，宜使用的药物是（）

A：甘草酸二铵

B：还原型谷胱甘肽

C：多烯磷脂酸胆碱

D：葡醛内酯

答案：C

62.关于地高辛的说法不正确的是

A：激动Na

B：减慢传导

C：加强心肌收缩力

D：减慢心率

答案：A

63.抗炎作用较强，水钠潴留最强的激素是

A：泼尼松

B：氢化可的松

C：倍他米松

D：地塞米松

答案：B

64.成人口服左甲状腺素替代治疗，开始剂量每日25～50μg，每2周增加

A: 4μg/kg

B: 25μg

C: 6μg/kg

D: 5μg/kg

答案：B

65.甲状腺素

A: 可导致粒细胞缺乏症

B: 可诱发心绞痛和心肌梗死

C: 可导致甲状腺功能低下

D: 可导致血管神经性水肿、上呼吸道水肿及喉头水肿

答案：B

66.（2018年真题）可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是（）

A: 塞来昔布

B: 双氯芬酸

C: 阿司匹林

D: 对乙酰氨基酚

答案：C

67.使用痤疮治疗药物不会出现

A: 眼周局部刺激

B: 肝脏氨基转移酶AST降低

C: 红斑

D: 皮肤色素沉着

答案：B

68.通过阻断血管紧张素II受体而逆转心肌肥厚，减轻心力衰竭的药物是

A: 氯沙坦

B: 美托洛尔

C: 地高辛

D: 氨力农

答案：A

69.与单胺氧化酶抑制剂合用有发生高血压危象的潜在风险的是

A: 酚酞

B: 双八面体蒙脱石

C: 地芬诺酯

D: 莫沙必利

答案：C

70.患者男性，25岁。咽炎，注射青霉素后1分钟，呼吸急促，面部发绀，心率130次/分，血压60/40mmHg。

A: 曲安西龙+异丙肾上腺素

B: 地塞米松+肾上腺素

C: 地塞米松+去甲肾上腺素

D: 地塞米松+多巴胺

答案：B

71.氟尿嘧啶、卡培他滨属于()

A: 胸腺核苷合成酶抑制剂

B: 二氢叶酸还原酶抑制剂

C: 核苷酸还原酶抑制剂

D: DNA多聚酶抑制剂

答案：A

72.抗菌谱较窄，对放疗有增敏作用

A: 放线菌素D

B: 环磷酰胺

C: 阿霉素

D: 丝裂霉素

答案：A

73.安全性高，几乎无不良反应的是

A: 非那雄胺

B: 十一酸睾酮

C: 多沙唑嗪

D: 舍尼通

答案：D

74.对抗杆菌属等厌氧菌具有抗菌活性，属于头霉素类的抗菌药物是()。

A: 头孢吡肟

B: 头孢美唑

C: 氨曲南

D: 亚胺培南

答案：B

75.头孢曲松()

A: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
B: 用于非典型致病原感染
C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎
D: 肾毒性较大
答案：C

76.氯磺丙脲的降糖作用机制是
A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
B: 降低靶组织对胰岛素的敏感性
C: 能明显降低空腹血糖、胰岛素和C肽水平
D: 防治遗传性血管神经性水肿
答案：A

77.（2016年真题）华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是
A: 依诺肝素
B: 维生素B12
C: 维生素B2
D: 维生素B1
答案：A

78.（2021年真题）可干扰转录过程和阻止RNA合成的抗肿瘤药物是（）
A: 顺铂
B: 多柔比星
C: 丝裂霉素
D: 塞替派
答案：B

79.硫脲类药物的基本作用是

A：抑制甲状腺蛋白水解酶

B：抑制Na+-K+泵

C：抑制甲状腺过氧化酶

D：抑制碘泵

答案：C

80.患者，男性，45岁。有支气管哮喘病史20余年。因阵发性室上性心动过速入院治疗，出院后又多次发作，应选用预防反复发作的治疗药物是

A：普萘洛尔

B：利多卡因

C：美西律

D：维拉帕米

答案：D

81.属于嘌呤类抗代谢类药物的是

A：甲氨蝶呤

B：巯嘌呤

C：长春瑞滨

D：吉西他滨

答案：B

82.对地高辛中毒出现心动过缓者可静脉注射

A：阿托品

B：氯化钾、葡萄糖注射液

C：利尿剂

D: 苯妥英钠

答案：A

83.不易导致便秘或腹泻不良反应的药物是

A: 三硅酸镁

B: 铝碳酸镁

C: 氢氧化铝

D: 碳酸钙

答案：B

84.是碘与表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮经反应生成的复合物。含有效碘9%～12%。从载体中释出碘，可直接卤化菌体蛋白质，与细菌蛋白质的氨基酸结合，破坏菌体的蛋白质和酶，使微生物代谢功能发生障碍而死亡的广谱强效杀菌药是

A: 依沙吖啶

B: 过氧乙酸

C: 聚维酮碘

D: 氯己定

答案：C

85.属于阴道杀精药的是

A: 壬苯醇醚

B: 氯地孕酮

C: 米非司酮

D: 左炔诺孕酮

答案：A

86.（2021年真题）兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/755024303131012033