

## 2023-24 年山东省临清市《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题内部题库（考试直接用）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 铜绿假单胞菌性结膜炎常用

- A: 夫西地酸滴眼剂
- B: 金霉素眼膏
- C: 多黏菌素 B 滴眼液
- D: 1%泼尼松滴眼液

答案：C

2. 作用强而持久，不仅对子宫底，而且对子宫颈部都有很强的收缩作用，剂量稍大即产生强直性收缩，不适用于催产或引产，主要用于产后子宫出血或子宫复原不佳的是

- A: 缩宫素
- B: 地诺前列酮
- C: 麦角新碱
- D: 普拉睾酮

答案：C

3. （2020 年真题）曲妥珠单抗的适应证是

- A: 晚期恶性黑色素瘤
- B: 人表皮生长因子受体-2（HER-2）过度表达的乳腺癌
- C: 转移性结直肠癌
- D: 表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌

**答案：B**

4. 抑制细菌叶酸合成的抗菌药物是

- A: 头孢吡肟
- B: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶
- C: 头孢米诺
- D: 利福喷丁

**答案：B**

5. 可用于防治夜盲症的维生素是()

- A: 维生素 K
- B: 叶酸
- C: 维生素 A
- D: 维生素 B

**答案：C**

6. 毒性大，不能注射用的抗真菌药是

- A: 咪康唑
- B: 制霉菌素
- C: 灰黄霉素
- D: 克霉唑

**答案：B**

7. 催眠药应()

- A: 睡前内服
- B: 饭前内服
- C: 定时内服
- D: 空腹内服

**答案：A**

8. 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是()。

- A: 罗红霉素
- B: 头孢他啶
- C: 头孢曲松
- D: 利奈唑胺

**答案：B**

9. 血浆半衰期最长的强心苷类药物是

- A: 多巴酚丁胺
- B: 米力农
- C: 地高辛
- D: 洋地黄毒苷

**答案：D**

10. 双香豆素应用过量可选用的拮抗药是()

- A: 鱼精蛋白
- B: 氨甲苯酸
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 维生素 K1

**答案：D**

11. 对肾功能影响较小的抗高血压药是

- A: 胍乙啶
- B: 利血平
- C: 肼屈嗪
- D: 卡托普利

**答案：C**

12. 主要治疗双相情感障碍躁狂发作，宜选用的药物是

- A: 碳酸锂
- B: 氯氮平
- C: 阿立哌唑
- D: 利培酮

**答案：D**

13. (2021 年真题) 属于乙酰胆碱酯酶抑制剂，用于改善脑功能及抗记忆障碍的药物 ( )

- A: 多奈哌齐
- B: 尼莫地平
- C: 依达拉奉
- D: 吡拉西坦

**答案：A**

14. (2018 年真题) 关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法，错误的是 ( )

- A: 甲硝唑半衰期比奥硝唑短
- B: 甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物
- C: 甲硝唑有致突变和致畸作用
- D: 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深

**答案：B**

15. 胺碘酮抗心律失常的作用机制是

- A: 阻滞多种钾通道，延长动作电位的时程和有效不应期
- B: 提高窦房结和浦肯野纤维的自律性

C: 缩短心房和浦肯野纤维的动作电位时程、有效不应期

D: 加快浦肯野纤维和窦房结的传导速度

**答案：A**

16. (2018 年真题) 可用于 1 岁以下婴幼儿急、慢性腹泻, 具有固定和清除多种病原体和毒素药物是 ( )

A: 洛哌丁胺

B: 番泻叶

C: 地芬诺酯

D: 蒙脱石散

**答案：D**

17. 下列药物中属于抗纤维蛋白溶解药的是

A: 卡巴克络

B: 氨甲环酸

C: 酚磺乙胺

D: 维生素 K

**答案：B**

18. 属于短效口服避孕药的是

A: 左炔诺孕酮

B: 氯地孕酮

C: 壬苯醇醚

D: 米非司酮

**答案：A**

19. (2020 年真题) 通过抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 吗氯贝胺
- B: 阿米替林
- C: 舍曲林
- D: 度洛西汀

**答案：A**

20. 一日 2 次，早餐和晚餐前 60 分钟内给药，餐后不能给药，每次给药剂量固定，不需要根据血糖水平作随时调整的药物是

- A: 艾塞那肽
- B: 瑞格列奈
- C: 格列齐特
- D: 利拉鲁肽

**答案：A**

21. 庚酸炔诺酮()

- A: 促进蛋白质合成
- B: 抗着床
- C: 抑制排卵作用
- D: 减少精子数目

**答案：C**

22. (2016 年真题) 可抑制细菌的 DNA 依赖性 RNA 多聚酶的是

- A: 利福平
- B: 替考拉宁
- C: 磷霉素

D: 舒巴坦

**答案：A**

23. (2021 年真题) 促进尿酸排泄的抗痛风药物是 ( )

A: 秋水仙碱

B: 双醋瑞因

C: 双氯芬酸

D: 苯溴马隆

**答案：D**

24. 中度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A: 5-HT<sub>3</sub> 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

B: 奥美拉唑+口服地塞米松

C: 5-HT<sub>3</sub> 受体阻断剂+口服地塞米松

D: 每日化疗前，应用 5-HT<sub>3</sub> 受体阻断剂或口服地塞米松

**答案：C**

25. 甲氨蝶呤、培美曲塞属于 ( )

A: DNA 多聚酶抑制剂

B: 核苷酸还原酶抑制剂

C: 胸腺核苷合成酶抑制剂

D: 二氢叶酸还原酶抑制剂

**答案：D**

26. (2019 年真题) 患者，女，52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日 1 次，每次 2mg。

- A: 体重增加
- B: 突破性出血
- C: 白带增多
- D: 乳房触痛或增大

**答案：B**

27. (2018 年真题) 肾结石患者禁用的药物是 ( )

- A: 苯溴马隆
- B: 秋水仙碱
- C: 别嘌醇
- D: 非布索坦

**答案：A**

28. (2016 年真题) 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是

- A: 头孢他啶
- B: 头孢曲松
- C: 罗红霉素
- D: 利奈唑胺

**答案：A**

29. 与其他 NSAID 合用时疗效并不增强，但可增加其他部位出血风险的是

- A: 塞来昔布
- B: 吲哚美辛
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

**答案：C**

30. (2015 年真题) 通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是 ( )。

- A: 哌嗪
- B: 青蒿素
- C: 氯喹
- D: 噻嘧啶

**答案：A**

31. 以下不属于强心苷的禁忌症的选项是

- A: 室性心动过速、心室颤动
- B: 预激综合征伴心房颤动或扑动
- C: 慢性收缩性心力衰竭
- D: 梗阻性肥厚型心脏病

**答案：C**

32. 精神病患者及神经中毒症状者慎用

- A: 利巴韦林
- B: 四环素可的松
- C: 氯霉素
- D: 更昔洛韦

**答案：D**

33. 患者女，59 岁，既往高脂血症病史 5 年，心功能 II 级。因发现血压升高 7 天入院。入院查体血压 172/95mmHg，心率 62 次 / 分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀。

- A: 洛伐他汀
- B: 阿托伐他汀
- C: 辛伐他汀

D: 普伐他汀

**答案: B**

34. 利福平与口服避孕药合用()

A: 子宫内膜突破性出血

B: 代谢加速而导致意外怀孕

C: 抑制排酸作用

D: 代谢加快而失效

**答案: B**

35. 普芦卡必利为泻药的作用机制是

A: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

B: 选择性、高亲和力的 5-HT<sub>4</sub> 受体激动剂，可通过 5-HT<sub>4</sub> 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性

C: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快

D: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便

**答案: B**

36. 属于润滑性泻药的是

A: 甘油（开塞露）

B: 乳果糖

C: 聚乙二醇 4000

D: 酚酞

**答案：A**

37. 促进微管的装配，抑制其解聚

- A: 长春碱
- B: 紫杉醇
- C: 他莫昔芬
- D: 羟喜树碱

**答案：B**

38. 使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

- A: 氯化钾
- B: 氯化钙
- C: 果糖
- D: 硫酸镁

**答案：B**

39. 下列哪种维生素可用于慢性铁中毒的治疗

- A: 维生素 E
- B: 维生素 C
- C: 维生素 B
- D: 维生素 B

**答案：B**

40. 治疗敏感菌所致成人伤寒、副伤寒的应选药物是()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 氯霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 呋喃妥因

**答案：C**

41. 青霉素在体内的主要消除方式是

- A: 肾小球滤过
- B: 肝脏代谢
- C: 被血浆酶破坏
- D: 肾小管分泌排泄

**答案：D**

42. 患者，男性，55 岁。每年冬春季常有哮喘发作，近日来上呼吸道感染，咳嗽加哮喘，门诊测血压亦升高，治疗方案：给予抗感染及平喘治疗外，尚考虑给予降压药，其中欲选择一种  $\beta$  肾上腺素受体阻断药，应选用

- A: 纳多洛尔
- B: 吲哚洛尔
- C: 美托洛尔
- D: 普萘洛尔

**答案：C**

43. 左旋多巴除了用于抗震颤麻痹外，还可用于

- A: 肝性脑病
- B: 心血管疾病
- C: 乙型肝炎
- D: 脑膜炎后遗症

**答案：A**

44. 在体内消除缓慢，有蓄积性的药物是

- A: 利多卡因

B: 阿托品

C: 洋地黄毒苷

D: 哌替啶

**答案：C**

45. 与  $\alpha_1$  受体阻断剂无相互作用的药物是

A: 西咪替丁

B: 地尔硫

C: 卡马西平

D: 第三代头孢菌素

**答案：D**

46. 哮喘急性发作首选的治疗药物是()。

A: 短效  $\beta$

B: 白三烯受体阻断剂

C: 吸入性糖皮质激素

D: 磷酸二酯酶抑制剂

**答案：A**

47. 长期慢性便秘者不宜长期大量使用的药物是

A: 多库酯钠

B: 欧车前

C: 番泻叶

D: 利那洛肽

**答案：C**

48. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

- A: 未做皮肤过敏试验
- B: 使用药物缺乏针对性
- C: 给药方式错误
- D: 药物剂量过大

**答案：A**

49. 聚乙二醇 4000 可用于

- A: 哺乳期便秘
- B: 果糖不耐受儿童
- C: 炎症性肠病患者
- D: 成人及 1 岁以上儿童（包括 1 岁）便秘

**答案：A**

50. 以下关于非磺酰脲类促胰岛素分泌药使用的叙述，错误的是

- A: 对磺酰脲类敏感性差或效果不佳者可换此类药物，也可与磺酰脲类联合应用
- B: 可以作为初始治疗，用于不能耐受二甲双胍或磺酰脲类药物或存在使用这些药物的禁忌证患者，尤其是有低血糖风险的慢性肾脏病患者
- C: 瑞格列奈无肾脏功能不全者使用的禁忌，在体内无蓄积，适用于老年和糖尿病肾病者
- D: 常见不良反应是低血糖和体重增加

**答案：A**

51. 关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述错误的是()

- A: 利妥昔单抗主要用于淋巴瘤的治疗

- B: 对癌细胞和正常体细胞都有"杀灭"作用
- C: 静脉滴注可致过敏样反应
- D: 贝伐珠单抗作用于血管内皮生长因子

**答案：B**

52. 坦洛新与华法林合用，华法林游离药物浓度增加，这是因为二者竞争

- A: UGT287
- B: CYP3A4
- C: p-糖蛋白
- D: 血浆蛋白

**答案：D**

53. 患者。男，42岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

- A: 预期性恶心呕吐
- B: 爆发性恶心呕吐
- C: 急性恶心呕吐
- D: 延迟性恶心呕吐

**答案：C**

54. 大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿液呈黄色

- A: 维生素 C
- B: 维生素 B
- C: 维生素 B
- D: 维生素 B

**答案：D**

55. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: M 受体阻断剂
- B:  $\beta$  受体激动剂
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

**答案：C**

56. 螺内酯临床常用于()

- A: 脑水肿
- B: 急性肾衰竭
- C: 醛固酮升高引起的水肿
- D: 尿崩症

**答案：C**

57. 下列药物中，不能增强他莫昔芬活性和疗效的是

- A: 长春新碱
- B: 甲氨蝶呤
- C: 氟尿嘧啶
- D: 西咪替丁

**答案：D**

58. 属于叶酸类抗代谢类药物的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 吉西他滨
- C: 巯嘌呤
- D: 长春瑞滨

**答案：A**

59. 噻嗪类利尿药发挥利尿作用的作用点是

- A:  $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$  同向转运子
- B: 碳酸酐酶
- C:  $\text{Na}^+-\text{Cl}^-$  共转运子
- D: 磷酸二酯酶

**答案：C**

60. 氨苯蝶啶的作用部位在

- A: 远曲小管和集合管
- B: 髓袢升支粗段皮质部
- C: 近曲小管
- D: 髓袢升支粗段

**答案：A**

61. 服用华法林过量可用下列哪种药物对抗

- A: 维生素 A
- B: 糜蛋白酶
- C: 维生素 K
- D: 鱼精蛋白

**答案：C**

62. 应用硝普钠时的注意事项及用药监护不包括()

- A: 避光使用
- B: 缓慢静脉注射
- C: 监测血压
- D: 血硫氰酸盐水平

**答案：B**

63. 高效抑菌药是

- A: 头孢菌素
- B: 氯霉素
- C: 异烟肼
- D: 磺胺嘧啶

**答案：D**

64. 血管紧张素转化酶 I 抑制剂是()

- A: 地高辛
- B: 米力农
- C: 依那普利
- D: 多巴酚丁胺

**答案：C**

65. (2018 年真题) 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴性杆菌感染的药物是 ( )

- A: 头孢呋辛
- B: 头孢米诺
- C: 头孢他啶
- D: 头孢唑林

**答案：B**

66. 利奈唑胺最常见的不良反应是

- A: 腹部不适
- B: 血小板减少
- C: 静脉炎
- D: 黄疸

**答案：B**

67. 治疗钙缺乏症 ()

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 阿法骨化醇
- C: 依降钙素
- D: 葡萄糖酸钙

**答案: D**

68. (2019 年真题)  $\beta$ -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是  
( )

- A: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸
- B: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦
- C: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸
- D: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦

**答案: D**

69. 严重肝病时应减量慎用、肾功能减退时可按原治疗量使用的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 红霉素
- C: 异烟肼
- D: 青霉素

**答案: B**

70. 可预防环磷酰胺所致泌尿系毒性的药物是

- A: 美司钠
- B: 糖皮质激素
- C: 呋塞米
- D: 维生素

**答案：A**

71. 属于高致吐风险的抗肿瘤药物是（）

- A: 顺铂
- B: 吉非替尼
- C: 氟尿嘧啶
- D: 奥沙利铂

**答案：A**

72. 关于帕罗西汀的描述，错误的是

- A: 停药时直接停药
- B: 停药时应缓慢减量至停药
- C: 本品为选择性 5-HT 再摄取抑制剂
- D: 用于治疗抑郁症、强迫症、惊恐障碍及社交恐怖障碍等

**答案：A**

73. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片 20mg/d 治疗。服药期间应监测血生化指标，其中超过正常值上限 10 倍，应立即停药的指标是()。

- A: CK
- B: Hcy
- C: Cr
- D: BUN

**答案：A**

74. 患者，女，62 岁。有高血压病史 14 年，伴变异型心绞痛，最近频繁发生阵发性室上性心动过速，宜选用()

- A: 维拉帕米
- B: 硝苯地平
- C: 尼莫地平
- D: 普萘洛尔

**答案：A**

75. 作用机制是有丝分裂抑制剂的是

- A: 枸橼酸他莫昔芬
- B: 吉非替尼
- C: 紫杉醇
- D: 巯嘌呤

**答案：C**

76. 可促进白细胞增生的药物是

- A: 叶酸
- B: 维生素 B
- C: 红细胞生成素
- D: 粒细胞集落刺激因子

**答案：D**

77. 专供糖尿病患者使用的肠内全营养制剂的是

- A: 视黄醇
- B: TPF-D
- C: TP
- D: 视黄酸

**答案：B**

78. 下述保肝药在静脉滴注时必须用不含电解质的溶液稀释的是

- A: 门冬氨酸钾镁
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 复方甘草酸苷

**答案：B**

79. 有关纤维蛋白溶解药的叙述，错误的是

- A: 主要代表药有链激酶、尿激酶
- B: 主要不良反应为凝血障碍
- C: 能使纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶酶
- D: 该药也称为血栓溶解药

**答案：B**

80. (2019 年真题) 患者，男，15 岁，因咳嗽、咳痰，发热 3 天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠 10 分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是 ( )

- A: 肾上腺素
- B: 地塞米松
- C: 多巴胺
- D: 去甲肾上腺素

**答案：A**

81. 可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物是

- A: 壬二酸
- B: 过氧苯甲酰
- C: 维 A 酸
- D: 阿达帕林

**答案：A**

82. (2019 年真题) 患者，女，52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日 1 次，每次 2mg。

A: 应在绝经后 6 年之内开始

B: 可以降低绝经后妇女心脑血管病发生风险

C: 激素替代疗法应结合患者情况个体化制定

D: 绝经后使用雌激素可缓解更年期症状，但增加患糖尿病的风险

**答案：D**

83. 硫酸亚铁临床应用

A: 缺铁性贫血

B: 失去药效

C: 缺血性脑卒中

D: 急性中性粒细胞减少症

**答案：A**

84. 属于抗纤维蛋白溶解药的是

A: 氨甲环酸

B: 酚磺乙胺

C: 甲萘氢醌

D: 艾曲泊帕乙醇胺

**答案：A**

85. 属于头孢二代的是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

A: 头孢呋辛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/756004025111011030>