2024年河北省内丘县《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库【夺分金卷】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.放线菌素D的主要作用环节在

A：M期

B：G

C：G

D：S期

答案：C

2.关于氢氧化铝叙述正确的是

A：减少胃酸分泌

B：不易引起便秘

C：与胃液混合形成凝胶保护膜

D：促进肠道磷酸盐的重吸收

答案：C

3.（2015年真题）属于延长动作电位时程药（第Ⅲ类）的抗心律失常药的是（）。

A：美西律

B：拉贝洛尔

C：维拉帕米

D：胺碘酮

答案：D

4.与长春新碱合用可增强神经系统及血液系统毒性

A：替尼泊苷

B：异烟肼

C：非格司亭

D：铂类

答案：B

5.（2018年真题）不易发生“双硫仑样”反应的药物是（）

A：头孢他啶

B：头孢曲松

C：头孢哌酮

D：头孢替安

答案：A

6.患者,女,55岁诊断为“甲癣”宜使用的药物是

A：特比萘芬

B：卡泊芬净

C：氟胞嘧啶

D：氟康唑

答案：A

7.高血压合并痛风者不宜使用

A：阿替洛尔

B：氢氯噻嗪

C：依那普利

D：硝苯地平

答案：B

8.（2016年真题）没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是

A：右美沙芬

B：可待因

C：氯化铵

D：苯丙哌林

答案：D

9.患者，女，42岁。双掌指关节、腕关节肿痛伴晨僵1月，诊断为类风湿关节炎，给予抗风湿药治疗，下列不属于该类药物的是

A：司来吉兰

B：糖皮质激素

C：依那西普

D：萘普生

答案：A

10.叶酸可用于巨幼细胞贫血治疗时，为改善神经症状，应同时并服

A：叶酸

B：维生素B6

C：维生素B12

D：烟酸

答案：C

11.甲氧苄啶联用环孢素使

A：白细胞减少风险增加

B：抗凝作用增强

C：肾毒性增加

D：半衰期缩短

答案：C

12.紧急降低眼压首选的药物是

A: 20%甘露醇

B: 碳酸酐酶抑制剂

C: β-受体阻断剂

D: 拟M胆碱药

答案：A

13.长期大量使用林旦后可导致的不良反应是

A: 中枢神经系统毒性

B: 白细胞减少

C: 眼部水肿

D: 肝脏损害

答案：A

14.可升高高密度脂蛋白胆固醇水平的维生素是

A: 维生素B

B: 叶酸

C: 烟酸

D: 泛酸钙

答案：C

15.与普通肝素相比，低分子肝素的抗凝作用特点是

A: 对凝血因子Ⅱa、Ⅸa灭活作用强，对Xa作用弱

B: 对凝血因子Ⅱa、Ⅶa灭活作用强，对Xa作用弱

C: 对凝血因子Ⅹa、Ⅺa灭活作用强，对Ⅱa作用弱

D: 对凝血因子Ⅹa、Ⅻa灭活作用强，对Ⅱa作用弱

答案：D

16.成人使用美罗培南一日剂量不得超过

A：5g

B：3g

C：4g

D：6g

答案：D

17.考来替泊的降脂作用机制主要是

A：抑制脂肪分解

B：增加脂蛋白酶活性

C：阻滞胆汁酸在肠道的重吸收

D：抑制细胞对LDL的修饰

答案：C

18.属于短效β2受体激动剂的是

A：福莫特罗

B：特布他林

C：异丙托溴铵

D：噻托溴铵

答案：B

19.防止耐药现象的发生，持续用药须有12h以上间歇期

A：硝酸甘油

B：哌唑嗪

C：依那普利

D：氨氯地平

答案：A

20.主要作用是抗革兰阴性杆菌的半合成青霉素是

A：替莫西林

B：哌拉西林

C：替卡西林

D：阿莫西林

答案：A

21.竹红菌甲素属于

A：其他光敏剂

B：肾上腺皮质激类

C：补骨脂素及其衍生物

D：重金属元素及其化合物

答案：A

22.有明显的镇痛作用，可用于肿瘤骨转移所致的高钙血症和痛性骨质疏松症治疗的药物是

A：雷洛昔芬

B：降钙素

C：骨化三醇

D：阿仑膦酸钠

答案：B

23.（2020年真题）患者，女，72岁。持续性心房颤动，为预防脑卒中，宜选用的药物是

A：奥美拉唑

B：华法林

C：氯吡格雷

D: 双氯芬酸

答案：B

24.氯霉素最严重的不良反应是

A: 肝脏损害

B: 胃肠道反应

C: 抑制骨髓造血功能

D: 二重感染

答案：C

25.属于可供静脉注射的胰岛素/胰岛素类似物的是

A: 地特胰岛素

B: 预混胰岛素

C: 普通胰岛素

D: 精蛋白锌胰岛素

答案：C

26.下列不属于治疗前列腺增生的药物是

A: 非那雄胺

B: 坦洛新

C: 特拉唑嗪

D: 西地那非

答案：D

27.属于第一代头孢菌素口服制剂的是()。

A: 头孢克肟

B: 头孢拉定

C: 头孢吡肟

D：头孢克洛

答案：B

28.下列不属于局麻药物作用特点的是

A：对各类组织无损伤性影响

B：可暂时、完全阻断神经传导

C：可逆性阻断神经冲动产生和传导

D：作用消失后神经功能不可完全恢复

答案：D

29.以下关于PPI用法用量的描述，错误的是

A：泮托拉唑静脉给药用于急性上消化道出血时，一次40mg～80mg，每日1～2次

B：艾司奥美拉唑口服用于Hp根除时，一次40mg，一日2次

C：泮托拉唑口服用于Hp根除时，一次40mg，一日2次

D：奥美拉唑口服用于Hp根除时，一次40mg，一日2次

答案：D

30.（2018年真题）关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法，错误的是（）

A：甲硝唑有致突变和致畸作用

B：甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物

C：甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深

D：甲硝唑半衰期比奥硝唑短

答案：B

31.患者，男，50岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148/90mmHg，心率80次/分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

A: 作用于RAAS初始环节，从源头减少血管紧张素Ⅱ的生成

B: 促进缓激肽水解

C: 抑制循环系统的转换酶，减少血管紧张素Ⅱ的生成

D: 阻断AT1受体

答案：C

32.以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者,宜使用的药物是

A: 葡醛内酯

B: 多烯磷脂酸胆碱

C: 甘草酸二铵

D: 还原型谷胱甘肽

答案：B

33.治疗阴道滴虫病的首选药物是()

A: 甲硝唑

B: 多黏菌素

C: 克林霉素

D: 呋喃妥因

答案：A

34.对红霉素的描述，下列不正确的是

A: 抗菌谱与青霉素相似但略广

B: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效

C: 具有肝脏毒性

D: 属繁殖期杀菌剂

答案：D

35.（2019年真题）患者，女，36岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午10点及下午4点，有时夜间痛醒，进食后缓解，X线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是（）

A: 甲氧氯普胺

B: 多潘立酮

C: 颠茄

D: 奥美拉唑

答案：D

36.注射用奥沙利铂的溶媒选择要求是

A: 5%葡萄糖注射液稀释

B: 先用乳酸钠注射液溶解,再用氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液进一步稀释

C: 氯化钠注射液稀释

D: 先用氯化钠注射液溶解,再用5%葡萄糖注射液进一步稀释

答案：A

37.主要用于糖尿病，特别是1型糖尿病的治疗的药物是()

A: 胰岛素

B: A和B均无效

C: 二甲双胍

D: 磺酰脲类

答案：A

38.局麻药吸收过量所引起的症状，错误的是

A: 血压下降

B: 先兴奋，后抑制

C: 心缩力增强

D: 心律失常

答案：C

39.与氯吡格雷合用，竞争CYP2C19，使用氯吡格雷患者血栓不良反应事件增多的药物是

A: 奥美拉唑

B: 西咪替丁

C: 雷贝拉唑

D: 泮托拉唑

答案：A

40.不属于氟喹诺酮类的药物是

A: 莫西沙星

B: 依诺沙星

C: 小檗碱

D: 环丙沙星

答案：C

41.可导致神经毒性(手指、足趾麻木、腱反射消失)的抗肿瘤药是

A: 长春新碱

B: 柔红霉素

C: 紫杉醇

D: 博来霉素

答案：A

42.属于叶酸类抗代谢类药物的是

A: 长春瑞滨

B: 吉西他滨

C: 甲氨蝶呤

D: 巯嘌呤

答案：C

43.促使脓性痰中DNA分解，使脓痰黏度下降的药物是

A: 氨溴索

B: 糜蛋白酶

C: 表面活性剂

D: 乙酰半胱氨酸

答案：B

44.用于降低眼内压的治疗方案是

A: 应用高渗透压的25%-50%葡萄糖注射液滴注，常与20%甘露醇注射液联合应用

B: 一般可给予10%～25%葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液

C: 可予10%～25%葡萄糖注射液滴注，每日100g葡萄糖即可控制病情

D: 一般采用50%葡萄糖注射液20～40ml，快速静脉注射

答案：D

45.（2018年真题）耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）高检出率的医疗机构,进行人工瓣膜置换术时,为预防MRSA感染,可选用（）

A: 氨曲南

B: 万古霉素

C: 头孢唑林

D: 青霉素G

答案：B

46.属于耐酸耐酶的青霉素类药物是()

A：青霉素

B：丙匹西林

C：阿莫西林

D：甲氧西林

答案：D

47.（2018年真题）高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐,宜选用的止吐治疗方案是（）

A：化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予2天的阿瑞吡坦和2~3天的地塞米松

B：化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

C：化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予2天的地塞米松或昂丹司琼

D：化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

答案：A

48.主要治疗躁狂症，对躁狂和抑郁交替发作的双相情感性精神障碍有很好的治疗和预防的药物是

A：氯氮平

B：阿立哌唑

C：碳酸锂

D：利培酮

答案：C

49.下列不属于抗肿瘤药的是

A：长春碱

B：三尖杉酯碱

C: 长春新碱

D: 氟胞嘧啶

答案：D

50.有明显耳毒性的药物是()

A: 磺胺嘧啶

B: 四环素

C: 青霉素

D: 链霉素

答案：D

51.高血压伴有肾功能不全者最好选用

A: 利血平

B: 氢氯噻嗪

C: 胍乙啶

D: 卡托普利

答案：D

52.硫脲类最重要的不良反应是

A: 粒细胞下降

B: 甲状腺素

C: 血管神经性水肿

D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

53.口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

A: 庆大霉素

B: 异烟肼

C: 妥布霉素

D: 新霉素

答案：A

54.下列哪种药物属于抑菌药

A: 四环素

B: 庆大霉素

C: 青霉素G

D: 头孢氨苄

答案：A

55.单纯餐后血糖升高的首选治疗药物是()

A: 阿卡波糖

B: 格列齐特

C: 格列本脲

D: 二甲双胍

答案：A

56.高浓度使细胞膜的渗透性增加，钾离子和其他内容物漏出，细胞死亡的是

A: 环吡酮胺

B: 制霉菌素

C: 特比萘芬

D: 阿莫罗芬

答案：A

57.最易引起严重二重感染的药物是()

A: 诺氟沙星

B: 庆大霉素

C: 青霉素

D: 四环素

答案：D

58.在痛风发作的急性期，应当首选的抗痛风药是

A: 别嘌醇

B: 秋水仙碱

C: 二氟尼柳

D: 苯溴马隆

答案：B

59.口服吸收少，用于肠道感染的是

A: 甲氧苄啶

B: 磺胺嘧啶

C: 呋喃唑酮

D: 氧氟沙星

答案：C

60.关于使用依折麦布的说法，错误的是

A: 成人剂量一次10mg。一日1次

B: 需空腹服用

C: 可单独服用或与他汀类联合应用

D: 剂量超过10mg／d对降低LDL水平无增效作用

答案：B

61.可替代氯霉素用于治疗伤寒的药物是()

A: 青霉素类

B: 氨基糖苷类

C: 氟喹诺酮类

D: 四环素类

答案：C

62.与氯霉素特点不符的是()

A: 口服难吸收

B: 骨髓毒性明显

C: 易透过血脑屏障

D: 适用于伤寒的治疗

答案：A

63.属于5-HT3受体阻断剂的止吐药是

A: 托烷司琼

B: 阿瑞吡坦

C: 维生素B6

D: 甲氧氯普胺

答案：A

64.（2015年真题）单纯饮食控制及体育锻炼无效的2型糖尿病肥胖者首选的降糖药是（）。

A: 格列美脲

B: 瑞格列奈

C: 普萘洛尔

D: 二甲双胍

答案：D

65.（2015年真题）患者，男，56岁。有高血压病史4年。体检：血压156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是（）。

A：低血糖

B：干咳

C：水肿

D：光过敏

答案：B

66.（2021年真题）有关甲氨蝶呤药物相互作用的说法，错误的是（）

A：阿司匹林会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

B：丙磺舒会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

C：与顺铂等肾毒性药物合用，可能减慢甲氨蝶呤的肾排泄

D：碳酸氢钠会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

答案：D

67.属于第四代头孢菌素常用药物的是()。

A：头孢克肟

B：头孢吡肟

C：头孢拉定

D：头孢克洛

答案：B

68.（2017年真题）可导致新生儿药物性黄疸的是（）

A：磺胺嘧啶

B：林可霉素

C：兴孢他啶

D：阿莫西林

答案：A

69.长期服用雌激素可导致

A：高血压

B：阴道出血

C：脱发

D：体重下降

答案：B

70.因全身应用可产生严重的肾毒性、故目前仅限于局部应用的是

A：杆菌肽

B：去甲万古霉素

C：替考拉宁

D：万古霉素

答案：A

71.易导致血糖异常的药品是

A：加替沙星

B：头孢哌酮

C：庆大霉素

D：多西环素

答案：A

72.解救大剂量甲氨蝶呤中毒

A：地塞米松

B：氟他胺

C：昂丹司琼

D：亚叶酸钙

答案：D

73.合并重度感染的糖尿病应使用()

A：正规胰岛素

B：阿卡波糖

C：二甲双胍

D：那格列奈

答案：A

74.假膜性肠炎或食物中毒应首选的微生态制剂是()

A：双歧三联活菌

B：粪肠球菌

C：枯草杆菌

D：酪酸菌

答案：D

75.患者，男，60岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

A：CYP2D6

B：CYP2C19

C：CYP286

D：CYP2E1

答案：B

76.适用于各型高血压，对原发性或肾性高血压均有效的是

A：氢氯噻嗪

B：肼屈嗪

C：拉贝洛尔

D：卡托普利

答案：D

77.下列关于抗M胆碱药作用特点的描述中，错误的是

A：可散大瞳孔，麻痹睫状肌

B：使用眼膏剂可减少药物全身吸收

C：不同药物作用效能基本一致

D：作用时间短

答案：C

78.下列氟喹诺酮类抗菌药物中，原形从肾脏排泄率最高的是

A：氧氟沙星

B：环丙沙星

C：诺氟沙星

D：氟罗沙星

答案：A

79.（2017年真题）应用维生素B12治疗巨幼红细胞性贫血48小时内，应监测的电解质是（）

A：钾

B：锂

C：钙

D：钠

答案：A

80.（2021年真题）促进尿酸排泄的抗痛风药物是（）

A：双氯芬酸

B：苯溴马隆

C：秋水仙碱

D：双醋瑞因

答案：B

81.严重肝病患者应减量慎用、肾功能减退患者应避免使用的是

A：异烟肼

B：青霉素

C：氟胞嘧啶

D：红霉素

答案：C

82.（2021年真题）若无禁忌证，治疗2型糖尿病首选的口服降糖药物（）

A：吡格列酮

B：二甲双胍

C：沙格列汀

D：达格列净

答案：B

83.属于长效β

A：沙丁胺醇

B：多索茶碱

C：沙美特罗

D：布地奈德

答案：C

84.患者，女，66岁，5天前无明显诱因出现发热，最高39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗4日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38．8℃，R21次，BP110／70mmHg，HR110次／分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞13．4×109／L，中性粒细胞82．1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁0．59，每6小时一次。

A: 氟康唑是肝药酶诱导剂

B: 氟康唑用于治疗侵袭性念珠菌感染

C: 氟康唑首次使用不需给予负荷剂量

D: 氟康唑对曲霉菌有效

答案：B

85.治疗蛲虫病的首选药是()。

A: 甲硝唑

B: 噻嘧啶

C: 吡喹酮

D: 阿苯达唑

答案：D

86.抗肿瘤抗生素

A: 丝裂霉素

B: 环磷酰胺

C: 顺铂

D: 喜树碱类

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/756034152101011030