

临床医学概论练习题库与答案

1、女性，30 岁，月经量多已 2 年。近 3 个月来感乏力、头晕、心悸，实验室检查：血红蛋白 65g/L，白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $140 \times 10^9/L$ ，骨髓象：红细胞增生活跃，骨髓含铁血黄素减少，铁粒幼细胞减少。治疗首选：

- A、肌注维生素 B12
- B、口服铁剂
- C、输血
- D、脾切除
- E、口服叶酸

答案：B

2、烧伤患者，男，34 岁。头部、面部、颈部、右上肢、胸腹部有大小不等水泡，剧痛；左手与左前臂呈焦黑色，无痛；其烧伤面积及深度正确的是

- A、浅 II 度 27%，III 度 9%
- B、浅 II 度 32%，III 度 9%
- C、浅 II 度 31%，III 度 5.5%
- D、深 II 度 27%，III 度 6%
- E、深 II 度 31%，III 度 5.5%

答案：C

3、患者，女性，25 岁，2 周前发热、流涕，3 天前出现心悸、气促、胸疼，心率 100 次/分钟，心尖区可闻及舒张期奔马律，心电图可见频发多源室性期前收缩，CK-MB 增高，可能的诊断是

- A、冠心病
- B、扩张型心肌病
- C、急性心肌梗死
- D、肥厚型心肌病
- E、急性病毒性心肌炎

答案：E

4、治疗与抢救休克首要的中心环节是

- A、应用血管活性药物
- B、应用纠酸药物
- C、积极去除病因，补充血容量
- D、应用肾上腺皮质激素
- E、应用肝素防止 DIC

答案：C

5、实体性恶性肿瘤最重要的治疗手段是

- A、手术
- B、放疗
- C、化疗
- D、免疫治疗
- E、中药治疗

答案：A

6、呼吸出现三凹征是()

- A、支气管哮喘
- B、肺癌
- C、大叶性肺炎
- D、肺结核
- E、气道异物

答案：E

7、慢性胃炎的症状特点是：

- A、无规律性上腹部隐痛或不适
- B、上腹饥饿痛，在夜间发作
- C、暖气和反酸
- D、呕吐和体重下降
- E、烧心和反流

答案：A

8、男性, 65 岁, 高血压多年, 血压达 170/100mmHg, 服药可降至正常, 二个月来每于走路或上楼时感心前区闷痛, 休息或口含硝酸甘油 5 分钟内可缓解, 超声心动图示左室腔舒张末内径 5.0cm, 左室后壁 0.8cm, 该病例最可能诊断为

- A、高血压病 1 级
- B、冠心病伴高血压病 2 级
- C、高血压病 3 级
- D、高血压性心脏病伴冠心病
- E、肥厚型梗阻性心肌病

答案：B

9、胸骨右缘第二听诊区为

- A、二尖瓣听诊区
- B、三尖瓣听诊区
- C、肺动脉瓣听诊区
- D、主动脉瓣第二听诊区
- E、主动脉瓣听诊区

答案：E

10、类风湿性关节炎特征性的改变是

- A、游走性大关节肿痛，反复发作
- B、对称性大关节酸痛
- C、对称性小关节肿痛，反复发作
- D、多发性大小关节肿痛，反复发作
- E、指掌及腕关节尺侧偏向畸形

答案：C

11、我国高血压现状中的“三低”是（ ）

- A、发病率低 服药率低 诊断率低
- B、知晓率低 服药率低 控制率低
- C、知晓率低 治愈率低 发病率低
- D、发病率低 服药率低 控制率低
- E、致死率低 知晓率低 治愈率低

答案：B

12、某患者肱骨中下 1/3 骨折伴移位，经手法复位后，小夹板固定，需注意可能出现的并发症是

- A、骨折延迟愈合或不愈合；
- B、桡神经损伤及前臂缺血性肌挛缩；
- C、桡神经损伤及肱动脉损伤；
- D、正中神经损伤及肱动脉损伤；
- E、正中神经损伤及前臂缺血性肌挛缩；

答案：B

13、肿瘤最常见的局部表现是

- A、肿块
- B、溃疡
- C、出血
- D、梗阻
- E、疼痛

答案：A

14、乳腺癌转移到腋下淋巴结属于

- A、血道转移
- B、淋巴道转移
- C、局部浸润性生长
- D、直接蔓延

E、种植性转移

答案：B

15、判断有无脉搏，下列正确的是（ ）

A、同时触摸双侧颈动脉

B、触摸颈动脉时，不要用力过大

C、检查时间不得短于 10 s

D、不能触摸股动脉

E、颈动脉搏动点在胸锁乳突肌外缘

答案：B

16、缺铁性贫血患者骨髓象检查可出现：

A、红系增生活跃

B、红系、粒系均增生活跃

C、红系增生低下

D、红系、粒系均增生低下

E、红系、粒系、巨核系均增生活跃

答案：A

17、低血糖症的典型临床表现是

A、交感神经兴奋症状

B、明显饥饿感

C、意识障碍

D、Whipple 三联症（低血糖反应、血糖 $<2.8\text{mmol/L}$ 、补糖后症状消失）

E、癫痫样症状

答案：D

18、患者近期嗜睡，皮肤粗糙，颜面及双下肢水肿，呈非凹陷性，首先考虑的诊断是

A、硬皮病

B、甲状腺功能低下

C、血管神经性水肿

D、系统性红斑狼疮

E、象皮肿

答案：B

19、谢某，男，52岁。施行直肠癌根治术时发生骶前静脉丛大出血，持续低血压状态1小时。术后继续液体复苏，第2天病人病情平稳，血压 $110/60\text{mmHg}$ ，CVP $4\text{cmH}_2\text{O}$ 。目前病人的CVP监测情况提示

A、静脉血管张力较高

- B、静脉回心血量不足
- C、动脉血管张力增高
- D、右心功能不全
- E、胸腔内压力增高

答案：B

20、病人男性，65岁。咳嗽，痰中带血丝2月余，胸痛半月。消瘦，锁骨上淋巴结未扪及。胸部X线片显示右上肺叶肿块影像，形态不规则，边缘有毛刺。痰细胞学检查为阴性。该病人有35年吸烟史，目前吸烟10~20支/天。该病人为确定诊断，最好采用

- A、CT
- B、血清学检查
- C、B型超声
- D、纤维支气管镜
- E、放射性核素扫描

答案：D

21、治疗中需加用的药物是

- A、阿米卡星
- B、左氧氟沙星
- C、甲硝唑
- D、红霉素
- E、万古霉素

答案：C

22、判断脂肪充实程度最方便、最适宜的部位是

- A、前臂曲侧或上臂背侧下三分之一
- B、手背或上臂内侧
- C、腹部
- D、手背或上臂内侧下三分之一
- E、前臂的曲侧或手背

答案：A

23、深Ⅱ度烧伤创面处理不正确的是

- A、0.1%氯己定清洗创面，去除异物
- B、去除水泡皮
- C、油质纱布包扎创面
- D、面部创面不包扎
- E、创面使用抗生素预防全身感染

答案：B

24、治疗和抢救低血容量性休克的最基本和首要的措施是

- A、积极去除病因
- B、维持呼吸道通畅
- C、应用血管活性药物
- D、迅速补充血容量
- E、改善微循环灌注

答案：D

25、下列关于治疗休克的叙述中，错误的是

- A、失血性休克的治疗是扩容
- B、感染性休克时可用大剂量氢化可的松
- C、失血性休克时，止血是不可忽视的主要手段
- D、感染性休克时，应首先使用升压药
- E、感染性休克应恢复有效循环血量

答案：D

26、HBV 感染最早出现的血清学标志物是：

- A、HBsAg
- B、抗-HBs
- C、HBeAg
- D、抗-HBe
- E、抗-HBc

答案：A

27、筛查早期宫颈癌最常用的方法是

- A、窥器检查
- B、阴道镜检查
- C、宫腔镜检查
- D、宫颈刮片细胞学检查
- E、宫颈活体组织检查

答案：D

28、确定肿瘤性质最可靠的检查是

- A、实验室检查
- B、超声检查
- C、CT 检查
- D、内镜检查
- E、病理学检查

答案：E

29、醉酒步态，即行走时躯干重心不稳，步态紊乱不准确，如同醉酒状，见于

- A、小脑疾病
- B、脊髓疾病
- C、佝偻病
- D、腓总神经麻痹
- E、脑性瘫痪

答案：A

30、男，35岁，严重哮喘已24小时，张口呼吸，大汗，紫绀，双肺哮鸣音，痰粘稠，咳不出来。最有效的祛痰方法是：

- A、使用棕色合剂或氯化铵
- B、使用抗生素
- C、超声雾化吸入
- D、补充液体，纠正失水
- E、使用肾上腺皮质激素

答案：D

31、关于院外获得性肺炎的病原学方面，下列哪项说法正确的一项是：

- A、致病菌以革兰氏阴性球菌为主
- B、在阳性球菌中，肺炎球菌最常见
- C、在阳性杆菌中，流感嗜血杆菌最常见
- D、肺炎支原体罕见
- E、无嗜肺军团菌所引起

答案：B

32、代表心脏实际大小的界限为：

- A、心底界限
- B、左心界
- C、心相对浊音界
- D、心绝对浊音界
- E、右心界

答案：C

33、男性，28岁，有胃溃疡病史，早餐后，突然上腹痛刀割样疼痛，拒按。查体：腹壁呈板状僵硬，可能为

- A、阑尾炎
- B、胰腺炎

- C、胆囊炎
- D、溃疡穿孔
- E、急性胃炎

答案：D

34、下列 HBV 感染标志物均可表示 HBV 复制，但应除外：

- A、HBV-DNA
- B、HBeAg
- C、HBsAg
- D、HBcAg
- E、HBcAb

答案：C

35、最常见的早搏是：

- A、房性早搏
- B、交界性早搏
- C、室性早搏
- D、多源性房性早搏
- E、间位性早搏

答案：C

36、消化性溃疡最常见的原因是

- A、HP 感染
- B、饮酒
- C、长期服用非甾体类抗炎药物
- D、乙型肝炎病毒感染
- E、长期吸烟

答案：A

37、患者，女性，52 岁，手足关节痛 3 年余，查体：双手指间肌肉萎缩，手指向尺侧偏，X 线显示关节腔变窄，关节半脱位，抗“O” 300U，血沉380mm / h。此患者最可能的诊断是

- A、退行性骨关节病
- B、类风湿性关节炎
- C、先天性关节畸形
- D、风湿性关节炎
- E、系统性红斑狼疮

答案：B

38、抢救大面积烧伤患者首要的措施是

- A、迅速扩容
- B、及时清创
- C、及早应用抗生素
- D、及早植皮
- E、及早使用完全胃肠外营养

答案：A

39、新鲜肩关节前脱位病人，治疗上首选的方法是

- A、悬吊牵引；
- B、皮肤牵引；
- C、骨牵引；
- D、手法复位外固定；
- E、手术切开复位内固定；

答案：D

40、病史中最重要的是

- A、个人史
- B、婚姻史
- C、家族史
- D、既往史
- E、现病史

答案：E

41、中重度支气管哮喘控制发作首选治疗药物是

- A、茶碱类
- B、糖皮质激素
- C、 β 受体激动剂
- D、抗胆碱能类
- E、抗过敏类

答案：B

42、下列哪项不是甲亢与糖尿病共同的临床表现：

- A、体重减轻
- B、食欲亢进
- C、多饮多尿
- D、疲乏无力
- E、心脏病变

答案：C

43、男性，70 岁，糖尿病 10 年，以往无心悸，胸痛史，今日早餐后 1 小时，突然胸闷明显，面色苍白，烦躁，出汗恐惧感，2 小时未缓解。体检：心率 100 次/分，血压 86/70mmHg，最可能诊断为

- A、糖尿病酸中毒
- B、不典型心绞痛
- C、低血糖
- D、变异型心绞痛
- E、急性心肌梗死

答案：E

44、我国的围生期定义为

- A、从妊娠满 28 周（出生儿体重 $\geq$ 1000g 或身长 $\geq$ 35cm）至产后 1 周
- B、从妊娠满 20 周（出生儿体重 $\geq$ 500g 或身长 $\geq$ 25cm）至产后 4 周
- C、从妊娠满 28 周至产后 4 周
- D、从胚胎形成至产后 1 周
- E、从胚胎形成至产后 4 周

答案：A

45、肺动脉瓣区听诊位置在

- A、胸骨右缘第二肋间
- B、胸骨左缘第三肋间
- C、胸骨左缘第四肋间
- D、胸骨左缘第二肋间
- E、胸骨右缘第三肋间

答案：D

46、患者浅感觉障碍，可能出现异常的是：

- A、关节觉
- B、位置觉
- C、痛温觉
- D、两点辨别觉
- E、震动觉

答案：C

47、消化性溃疡的主要症状是

- A、厌食消瘦
- B、恶心呕吐
- C、暖气反酸
- D、上腹疼痛

E、呕血、黑便

答案：D

48、下列哪项是稳定型心绞痛特点

A、持续时间为 3-5 分钟

B、每周发作 2 次

C、第一次发作

D、每周 2 次，程度渐加重

E、睡眠中发生

答案：B

49、某患者为肱骨髁上骨折，有移位，骨折线是从前下方斜向后上方，最容易产生的并发症是

A、尺神经损伤；

B、桡神经损伤；

C、肌皮神经损伤；

D、肱动脉损伤；

E、骨化性肌炎；

答案：D

50、关于骨折愈合，下列哪项是错误的

A、反复多次的手法复位不利于骨折的愈合；

B、切开复位时，因需切开软组织和剥离骨膜，对骨折愈合不利；

C、在两骨折端有适当的垂直压力，可干扰骨痂的生长；

D、骨折复位后固定不确实，可使骨折延迟愈合甚至不愈合；

E、过早和不恰当的功能锻炼，亦可干扰骨折固定，影响骨折愈合；

答案：C

51、女性青年患者，进食后上腹部疼痛病史 1 年，伴有反酸，可自行缓解，请问可能是下面哪种疾病？

A、肝硬化

B、腹膜炎

C、消化性溃疡

D、胃癌

E、食管炎

答案：C

52、男性，68 岁，3 月前出现巩膜黄染，呈进行性加深，皮肤瘙痒，消瘦明显，粪色变浅，最可能是

A、病毒性肝炎

- B、肝硬化
- C、胰头癌
- D、胆道蛔虫病
- E、胆石症

答案：C

53、我国肝硬化最常见的病因是

- A、中毒性肝炎
- B、酒精性肝炎
- C、病毒性肝炎
- D、营养不良性肝炎
- E、血吸虫病性肝炎

答案：C

54、黑便并蜘蛛痣和肝掌可见于

- A、直肠癌
- B、胃癌
- C、溃疡性结肠炎
- D、门脉高压胃病
- E、胆管癌

答案：D

55、有助于胃肠道吸收铁剂的维生素是：

- A、维生素 B6
- B、维生素 B1
- C、维生素 C
- D、维生素 B12
- E、维生素 B2

答案：C

56、微循环扩张期的特征是

- A、血液淤滞于毛细血管内
- B、血液粘稠度增加，发生 DIC
- C、毛细血管前括约肌收缩，小静脉收缩
- D、凝血因子耗竭，发生出血倾向
- E、儿茶酚胺分泌增加，微动、静脉收缩

答案：A

57、腹部损伤错误的急救措施是：

- A、还纳脱出的肠管

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/756140022221010154>