

急诊医学测试试题及答案

1、肝硬化患者 Child-Pugh 分级标准中不包括哪一项指标?()

- A、 腹水
- B、 凝血酶原时间
- C、 总胆红素
- D、 转氨酶
- E、 白蛋白

答案：D

2、不属于中暑的疾病是()。

- A、 热痉挛
- B、 热衰竭
- C、 热射病
- D、 热晕厥
- E、 热烫伤

答案：E

3、损伤性休克早期一般会出现()。

- A、 碱中毒
- B、 酸中毒
- C、 血压大幅下降
- D、 皮肤温暖
- E、 合并感染

答案：A

4、患者,男,20岁。上腹痛20天,加剧2小时,急诊入院。既往患胃病史。检查全腹压痛、反跳痛,呈板状腹,肝浊音界缩小,肠鸣音消失,腹腔穿刺抽出黄绿液体10mL, WBC $18 \times 10^9/L$, N 0.85。诊断为腹膜炎,引起此病最可能的原因是()。

- A、 阑尾炎
- B、 肝脓肿穿破
- C、 胃、十二指肠溃疡穿孔
- D、 肠穿孔
- E、 腹腔淋巴结穿破

答案：C

5、在 COPD 治疗中,抗胆碱能药物比 β_2 -受体激动剂有效的原因主要为()。

- A、 与正常气道相比,迷走神经张力对 COPD 患者已经狭窄的气道作用更大
- B、 可增加 COPD 患者的气道黏液分泌

- C、无任何不良反应
- D、起效快
- E、药物剂型使用方便

答案：A

6、去大脑皮层综合征的主要表现是()。

- A、意识丧失,肌张力增高,四肢伸直
- B、意识丧失,肌张力增高,上肢屈曲,下肢伸直
- C、意识丧失,肌张力增高,上肢伸直,下肢屈曲
- D、意识丧失,肌张力增高,四肢屈曲
- E、意识丧失,肌张力降低

答案：B

7、破伤风最先出现下列哪种症状?()

- A、张口困难
- B、苦笑面容
- C、怕听水声
- D、颈强直
- E、四肢痉挛

答案：A

8、在我国,肾衰竭最常见的病因是()。

- A、代谢性疾病
- B、结缔组织疾病性肾损害
- C、肾血管性疾病
- D、IgA 肾病
- E、多囊肾

答案：D

9、女性,40岁,5年来患关节炎,日光过敏,脱发,尿蛋白(++++)。近1个月双下肢可凹性浮肿,尿少,血压168/100mmHg。尿蛋白(++),尿红细胞10~15/HP, Hb 100g/L, Scr 230 μmol/L, ANA 1:640(膜型),抗Sm抗体阳性,最可能的临床诊断是()。

- A、急进性肾炎
- B、急性肾衰
- C、慢性肾炎
- D、系统性红斑狼疮
- E、急性肾炎

答案：D

10、患者男,72岁。排尿困难2年,腹部平片提示膀胱区有2.0cm椭圆形致密影。典型的临床症状包括()。

- A、膀胱刺激症状
- B、进行性排尿困难
- C、血尿
- D、腰痛,血尿,脓尿
- E、尿流中断,改变体位后好转

答案: E

11、男性,45岁,肥胖7年,口渴多饮2个月,伴经常餐后3~5小时心悸、多汗、饥饿感,进餐后缓解,空腹血糖8.3mmol/L,尿糖(+)。诊断最可能是()。

- A、胰岛素性低血糖
- B、胰岛素瘤
- C、糖尿病
- D、胰岛细胞增生症
- E、2型糖尿病,反应性低血糖

答案: E

12、初产妇,27岁,孕32周,头位,阴道出血3天,量少,无腹痛,胎心正常,无明显宫缩,诊断为前置胎盘,恰当的处理是()。

- A、绝对卧床,给予镇静剂,观察病情变化
- B、立即行人工破膜
- C、立即行催产素引产,宫口开大后行碎胎术
- D、立即人工破膜及滴注催产素
- E、立即行剖宫产术

答案: A

13、频发室性期前收缩的诊断是指早搏()。

- A、3次/min以上
- B、10次/min以上
- C、6次/min以上
- D、5次/min以上
- E、8次/min以上

答案: D

14、急性心肌梗死溶栓前必须行哪项检查?()

- A、肌钙蛋白
- B、CK-MB
- C、心电图

- D、 超声心动图
- E、 心脏 PET 检查

答案： C

15、 有关瘀血性肝硬化, 哪项说法不正确?()

- A、 常由右心功能衰竭引起
- B、 Budd-Chiari 综合征亦可引起
- C、 其发生的主要原因为循环障碍
- D、 主要表现为肝大及腹水
- E、 无肝功能异常

答案： E

16、 急性坏死性胰腺炎常发生()。

- A、 血淀粉酶降低
- B、 血清脂肪酶升高
- C、 血钙升高
- D、 血钾升高
- E、 白细胞多数降低

答案： B

17、 胸部挤压伤后出现咯血, 严重呼吸困难, 查体: 颈部可扪及皮下气肿, 首先可以明确的诊断是()。

- A、 肺爆震伤
- B、 张力性气胸
- C、 气管或支气管损伤
- D、 肺挫伤
- E、 多根多处肋骨骨折

答案： B

18、 关于异位妊娠诊断依据, 下列哪一项是错误的?()

- A、 子宫刮出物呈蜕膜样反应
- B、 子宫刮出物见 A-S 反应
- C、 子宫刮出蜕膜组织和绒毛
- D、 子宫刮出物呈增生期并伴有蜕膜样反应
- E、 子宫刮出物呈碎片蜕膜, 镜下未见滋养细胞

答案： C

19、 卵巢肿瘤常见的并发症不包括()。

- A、 蒂扭转
- B、 破裂

- C、 囊内出血
- D、 感染
- E、 恶变

答案： C

20、 男性, 50 岁。 反复上腹痛 8 年, 近 2 个月疼痛加重, 促胃液素刺激试验示胃酸缺乏, 进一步的诊治方案首选()。

- A、 抗溃疡药物治疗 2 个月
- B、 手术治疗
- C、 X 线钡餐检查
- D、 连续粪便隐血检查
- E、 胃镜检查加活检

答案： E

21、 晕厥常发生于以下哪种瓣膜病变?()

- A、 二尖瓣狭窄
- B、 主动脉瓣狭窄
- C、 二尖瓣关闭不全
- D、 主动脉瓣关闭不全
- E、 三尖瓣关闭不全

答案： B

22、 大量输血后可引起()。

- A、 血 Ca 升高
- B、 血 H⁺升高
- C、 血 K⁺升高
- D、 Ca²⁺升高
- E、 血 K⁺降低

答案： C

23、 患者女, 25 岁, 妊娠 7 个月, 发热, 腰痛伴恶心, 呕吐, 尿频、 尿急、 尿痛 1 天。 查体: T 38. 5℃, 左肾区叩击痛, 血常规: WBC 11. 9×10⁹/L, N 0. 82, 尿常规: RBC 5~8/HP, WBC 30~35/HP, 尿蛋白(±), 最可能的诊断是()。

- A、 急性胰腺炎
- B、 急性肾小球肾炎
- C、 急性膀胱炎
- D、 急性肾盂肾炎
- E、 急性胃肠炎合并膀胱炎

答案： D

24、下列支持胸水漏出液的诊断是()。

- A、 胸水比重 <1.018
- B、 血性胸水
- C、 胸水 LDH $>500\text{U/L}$
- D、 胸水细胞数 $>1000 \times 10^9/\text{L}$
- E、 ADA $>50\text{U/L}$

答案：A

25、低钾血症时,心电图的早期改变是()。

- A、 QRS 波增宽
- B、 T 波降低、变平、倒置
- C、 ST 段降低
- D、 PR 间期延长
- E、 出现 U 波

答案：B

26、患者,男,32岁。经常周期性上腹痛3年,空腹发作,夜间加重,进食可缓解,服西咪替丁可止痛。最可能的诊断为()。

- A、 胃溃疡
- B、 十二指肠淤积症
- C、 慢性胃炎
- D、 胃黏膜脱垂症
- E、 十二指肠球部溃疡

答案：E

27、男性,63岁。吸烟40年。反复咳嗽、咳白色泡沫痰20余年,气促10年,近2天因受寒后出现发热伴咳黄脓痰,气喘不能平卧。查体:双肺语颤减弱,可闻及散在干、湿啰音,心界缩小,心率110次/min。肺功能示吸入支气管扩张剂后 $\text{FEV}_1/\text{FVC} < 70\%$, $\text{FEV}_1 < 60\%$ 预计值。该患者最可能的诊断是()。

- A、 慢性支气管炎急性加重期
- B、 支气管哮喘
- C、 支气管扩张
- D、 肺结核
- E、 慢性阻塞性肺疾病急性加重期

答案：E

28、肾小管病变时,易出现()。

- A、 红细胞管型
- B、 颗粒管型

- C、 上皮细胞管型
- D、 蜡样管型
- E、 透明管型

答案： C

29、患者,男,23岁,干咳、乏力2周。近几天来有发热、胸痛伴气促。胸部X线检查,右侧中等量胸腔积液。胸水化验:比重1.023,白蛋白30g/L,白细胞 $380 \times 10^6/L$,红细胞 $2.1 \times 10^9/L$ 。腺苷脱氨酶89U/L,该患者最可能的诊断是()。

- A、 化脓性胸膜炎
- B、 结核性胸膜炎
- C、 风湿性胸膜炎
- D、 病毒性胸膜炎
- E、 癌性胸腔积液

答案： B

30、额面QRS心电图轴右偏可见于以下情况,但不包括()。

- A、 左心室肌萎缩或梗死
- B、 垂位心
- C、 右心室肥大
- D、 心脏左移
- E、 6个月以内的婴儿

答案： D

31、患者男,28岁。一天前出现发热,恶心呕吐,腹泻7次,伴里急后重。大便培养示志贺痢疾杆菌生长。其腹泻的发生机制是()。

- A、 肠黏膜的吸收面积减少或吸收障碍
- B、 黏膜炎症、溃疡等致血浆、黏液、脓血渗出
- C、 肠蠕动亢进致肠内食糜停留时间少
- D、 胃肠黏膜分泌过多的液体
- E、 肠内容物渗透压增高

答案： B

32、患者男,30岁。患出血坏死性胰腺炎2周,经治疗,高热不退,持续腹痛。体检:上腹扪及一块物。血淀粉酶1000U(Somogyi法),血白细胞 $14 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.85(85%),最可能的原因是()。

- A、 并发胰腺脓肿
- B、 合并胆石症
- C、 胰腺炎未能控制
- D、 胰腺假性囊肿形成

E、 膈下脓肿

答案： A

33、 目前治疗颅内高压应用最广泛且效果较好的脱水药物是()。

A、 50%葡萄糖溶液

B、 20%甘露醇

C、 25%山梨醇溶液

D、 浓缩血清白蛋白

E、 30%尿素

答案： B

34、 异位妊娠最常见的发病部位是()。

A、 输卵管峡部

B、 输卵管壶腹部

C、 输卵管间质部

D、 卵巢

E、 子宫残角

答案： B

35、 微循环变化和内脏器官继发性损害较重的是()。

A、 低血容量休克

B、 感染性休克

C、 心源性休克

D、 神经源性休克

E、 过敏性休克

答案： B

36、 患者, 男性, 30 岁, 发作性血压增高, 发作时血压 200/120mmHg, 伴头痛, 面色苍白, 出汗, 心动过速, 持续半个小时, 平时血压正常。有助于诊断的实验是()。

A、 酚妥拉明实验

B、 螺内酯安体舒通实验

C、 地塞米松抑制实验

D、 肾动脉造影

E、 OGTT 实验

答案： A

37、 患者男, 30 岁。因心跳骤停经抢救后心跳恢复, 而后出现呼吸困难, 换气无力。下列患者不会出现的是()。

A、 血 pH 高于 7.45

- B、 血 pH 低于 7.35
- C、 血 HCO⁻] 正常
- D、 血 PaCO₂ 增高
- E、 血 PaO₂ 降低

答案： A

38、 不稳定型心绞痛治疗最重要的措施是()。

- A、 溶栓治疗
- B、 抗凝、抗血小板聚集
- C、 静脉泵入硝酸甘油
- D、 止痛
- E、 抗心力衰竭治疗

答案： B

39、 纠正休克所并发的酸中毒关键在于()。

- A、 充分换气
- B、 吸氧
- C、 改善组织灌注
- D、 提高血压
- E、 应用激素

答案： C

40、 为防止脂肪代谢所致的酮症需补给()。

- A、 葡萄糖
- B、 生理盐水
- C、 林格液
- D、 体用胰岛素
- E、 使用碳酸氢钠液

答案： A

41、 肠外营养制剂中下列有利于维护患者的胃肠功能的是()。

- A、 长链甘油三酯
- B、 精氨酸
- C、 生长激素
- D、 谷氨酰胺
- E、 胰岛素

答案： D

42、 对出血坏死型胰腺炎最具诊断价值的是()。

- A、 血脂肪酶增高

- B、 血淀粉酶增高
- C、 血钙降低
- D、 血胆红素增高
- E、 B 超检查胰腺增大

答案： C

43、 额面 QRS 心电图轴左偏可见于以下情况,但不包括()。

- A、 膈肌高位
- B、 左心室肥大
- C、 左前分支阻滞
- D、 心脏左移
- E、 左心室肌萎缩或梗死

答案： E

44、 室性心动过速的临床症状不包括()。

- A、 低血压
- B、 气促
- C、 晕厥
- D、 多尿
- E、 可无临床症状

答案： D

45、 顽固性心力衰竭伴有传导阻滞患者的最有效治疗方法是()。

- A、 呼吸末正压 PEEP
- B、 利尿剂
- C、 血管扩张剂
- D、 三腔起搏器
- E、 洋地黄

答案： D

46、 患者男, 34 岁。心电图提示 P-R 间期 $<0.12s$, QRS 波群时限 $>0.12s$, P-J 间期正常, 阵发性 ST-T 改变, V1~V6 导联 QRS 波群 主波均向上。该患者诊断是()。

- A、 B 型预激综合征
- B、 C 型预激综合征
- C、 变异性预激综合征
- D、 隐匿性预激综合征
- E、 A 型预激综合征

答案： E

47、患者女,31岁。有先天性心脏病病史,持续发热2周。体格检查:贫血貌,胸骨左缘3~4肋间4/6级粗糙收缩期杂音伴震颤,脾肋下2cm,血培养阳性。入院后第3天突感呼吸困难、胸痛,咯血多次。可能性最大的诊断是()。

- A、室间隔缺损合并急性心力衰竭
- B、室间隔缺损合并肺部感染
- C、室间隔缺损合并支气管扩张症
- D、感染性心内膜炎合并急性肺栓塞
- E、感染性心内膜炎合并肺部感染

答案: D

48、男性,68岁。慢性咳喘20余年,痰多、黏稠而不易咳出。近年来症状加重,动则气急就诊。体检:消瘦,端坐位,双手撑床,双房高耸。吸气时见胸锁乳突肌及上胸部肌肉收缩,两肺哮鸣音,心脏(-)。该患者出现呼吸困难是属于()。

- A、吸气性呼吸困难
- B、呼气性呼吸困难
- C、混合性呼吸困难
- D、劳力性呼吸困难
- E、静息呼吸困难

答案: C

49、患者男,44岁,工伤,左下胸受挤压,左8、9、10后肋骨折,脾破裂:面色苍白、四肢湿冷,脉搏120次/分,血压10.7/8kPa(80/60mmHg)。下列哪项治疗原则是正确的?()

- A、一旦确诊,立即手术
- B、大量快速输液,待血压正常后及早手术
- C、积极抗休克,同时迅速手术
- D、积极抗休克,如病情无好转再手术
- E、积极抗休克,不手术

答案: C

50、外科病人最易发生哪种体液代谢失调?()

- A、等渗性缺水
- B、急性水中毒
- C、高渗性缺水
- D、低渗性缺水
- E、慢性水中毒

答案: A

51、下列与急性盆腔炎不相关的是()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/756153052031010044>