

综合卷 三

型题 (最佳选择题肯定型)

诊断呼吸衰竭的确切依据是

- 发绀, 呼吸困难
- 肺通气功能明显减退
- 呼吸的节律, 频率和幅度发生改变
- 结膜充血、水肿和精神、神经症状

女性, 岁, 浮肿高血压三年, 尿蛋白 ( ), 长期低盐饮食, 并用双氢克尿塞利尿治疗, 近一周尿量减少, 厌食, 恶心, 呕吐, 意识障碍, 血压 , 尿素氮 , 血钾 , 血钠 , 下列哪种处理最为合适?

- 口服氯化钾
  - 速尿 静注
  - 氯化钠 缓慢静脉滴注
  - 冬眠灵 肌注
  - 葡萄糖静脉滴注
- 征阳性最常见于下列哪一个部位病变?

- 同侧脑髓
- 对侧丘脑
- 同侧马尾
- 对侧豆状核
- 大脑中央后回

岁, 男性, 工人, 腹胀, 乏力半年, 体检: 可见蜘蛛痣, 腹膨隆, 肝肋下未及, 脾肋下 , 移动浊音(+), 腹水检查为漏出液, 应选择哪项治疗最好?

- 强利尿剂
- 多次放腹水, 每次在 以上
- 反复输新鲜血
- 大量维生素静脉输注
- 自身腹水回输

下列哪项检查最有助于上、下尿路感染的鉴别?

- 尿沉渣涂片不染色找到细菌
- 尿沉渣镜检有透明管型 高倍
- 尿沉渣抗体包裹细菌阳性
- 中段尿菌落计数
- 一小时尿白细胞 万

临床鉴别肠结核与克隆病, 最可靠的确诊方法是

- 大便多次寻找抗酸杆菌
- 抗结核试验治疗 周观察
- 试验
- 结肠镜检查及活检
- 线胃肠钡餐检查

对特发性肺间质纤维化 ( ) 患者是否应用皮质激素治疗, 最主要的决定条件是

- 病程长短
- 疾病的合并症

- 病情的轻重
- 疾病本身的活动性
- 患者年龄与性别

患者男 岁，患发作性意识障碍 年，拟诊癫痫，服丙戊酸钠治疗，不能满意控制，拟进一步明确癫痫发作类型，下列哪种检查最有帮助？

- 头颅摄片
- 脑电图
- 头颅 扫描
- 脑血管造影
- 脑超声波检查

某患 岁，患发作性气喘病已十年，近一月来犯病，听诊肺有弥漫性哮鸣音， 线胸片示肺透亮度增高，膈肌低平。为判断患者是否并发肺气肿，下列检查中最有意义的是

- 动脉血气分析
- 及其改善率测定
- 残气容积与肺总量
- 肺 扫描
- 肺下界移动度

一个 岁女患者，体重逐渐增加，躯干肥胖，多毛，查体：满月面，多血质面容，向心性肥胖，两侧下腹部紫纹。化验：血浆皮质醇上午 点  $\mu$  （正常值  $\mu$  ）。请回答为确诊首先应进行的是

- 血浆 测定
- 甲吡酮试验
- 兴奋试验
- 地塞米松抑制试验
- 扫描或磁共振显象

某男性患者，现年 岁，上班时突起持续左胸痛 小时，急查心电图示 明显高尖，心室率 次/分，室性期前收缩 次/分，为安全将患者转送某医院急救，以下哪项措施最为重要？

- 静滴硝酸甘油
- 肌注杜冷丁或吗啡
- 静注利多卡因
- 持续高流量吸氧
- 静滴极化液

男性 岁，咳嗽、咳痰、胸闷、气短 年，肺功能检查：残气量增加，残气量占肺总量比值 ，最可能的诊断是

- 支气管哮喘
- 自发性气胸
- 肺部感染
- 肺心病
- 阻塞性肺气肿

女性 岁，腹痛腹泻一年，粘液脓血便，里急后重，乏力消瘦，时有低热， 线钡剂灌肠检查呈铅管状，经用灭滴灵治疗效果不佳，选择下列哪种药物治疗最为适宜？

- 痢特灵
- 异菸肼
- 
- 复方苯乙呱啶
- 氢化可的松

青年男性病人，发热一周，干咳，呼吸困难，胸片示右中下肺野大片状均匀致密阴影，上缘呈外高内低的反抛物线形，治疗首选药物为

- 青霉素 氨基甾类抗生素
- 头孢菌素类抗生素
- 庆大霉素
- 红霉素
- 抗结核药物

岁，男性，因突然呕新鲜血 ， 急诊入院。近 年来常有上腹不适，血压 ， 巩膜轻度黄染。应首先考虑出血来自

- 胃十二指肠溃疡
- 应激性溃疡
- 胆道肿瘤
- 肝癌内出血
- 门静脉高压症

岁女学生，因寒战，发热，右季肋部疼痛 天入院。半个月前因阑尾穿孔伴弥漫性腹膜炎行阑尾切除术。体温 度，巩膜黄染，肝脾未触及，右肋弓下深在压痛，右季肋轻度叩痛，首先考虑是

- 膈下脓肿
- 腹腔残余脓肿
- 细菌性肝脓肿
- 急性胆囊炎
- 右侧渗出性胸膜炎

我国急性胰腺炎的病因最常见为

- 药物诱发（类固醇激素等）
- 腮腺炎合并
- 高血钙症
- 胆囊炎，胆结石
- 壶腹部肿瘤

女性， 岁，头痛二年，发现 ， 检查心肺大致正常，上腹部左侧可闻血管杂音，尿蛋白(+)，超声心动图示左室间隔厚 ， 左室后壁厚 ， 余正常。该病例考虑其诊断最可能为

- 原发性醛固酮增多症
- 嗜铬细胞瘤
- 肾动脉狭窄性高血压
- 慢性肾炎
- 高血压病 级

女， 岁工人，妊娠 月，因尿痛，尿频，尿急二天来诊，无发热与血尿。尿常规蛋白±，沉渣镜检满视野白细胞，首选哪种药物治疗？

- 青霉素 万肌注，每日二次
- 红霉素 每日四次
- 庆大霉素 万 肌注，每日二次
- 氟哌酸 每日二次
- 氨苄青霉素 肌注，每日二次

脑出血病人，出现病灶侧瞳孔散大，昏迷加深提示最可能发生

- 脑室出血
- 枕骨大孔疝

- 小脑幕裂孔疝
- 镰下疝
- 脑桥出血

中年女性，间歇性腹部不适已 年，餐后加重，暖气。胃液分析： 为 ； ； 为 亿个。考虑下列哪种疾病最可能？

- 慢性浅表性胃炎
- 十二指肠球部溃疡
- 十二指肠球后溃疡
- 慢性萎缩性胃炎
- 慢性肥厚性胃炎

引起肝硬化的原因很多，但在我国最常见的原因是

- 病毒性肝炎
- 血吸虫病
- 酒精中毒
- 药物及工业毒物
- 循环障碍

女性， 岁，低热，消瘦，盗汗 个月，母亲有肺结核病史。呼吸急促，颈静脉怒张，心界向两侧扩大，肝大，白细胞计数正常，血沉 小时，心包穿刺抽出淡黄色液体 毫升，心包液常规细胞数 ，分类中性占 ，淋巴占 ，首选的治疗是

- 大剂量广谱抗菌素应用
- 反复多次心包穿刺抽液
- 抗结核药物治疗
- 心包切开引流
- 心包内注入四环素

岁，女工， 周来脸色苍白，巩膜轻度黄染，脾左肋下 ，血红蛋白 ，网织红细胞 ，红细胞脆性试验正常，试验阳性，首选治疗为

- 脾切除术
- 低分子右旋糖苷
- 肾上腺皮质激素
- 维生素
- 紧急输新鲜全血

男， 岁，饮酒后上腹部持续性剧痛，伴呕吐发热 小时，既往有 溃疡病史。查体： 度， 次分， ； 巩膜轻度黄染，腹部稍胀，上腹部有压痛，反跳痛，腹肌紧张， × ，血淀粉酶 索氏单位，腹腔穿刺抽出血性液体。淀粉酶 索氏单位，下列诊断哪项最有可能？

- 十二指肠溃疡急性穿孔
- 急性出血性坏死性胰腺炎
- 绞窄性肠梗阻
- 肝癌自发性破裂
- 肠系膜血管栓塞

肺心病呼吸衰竭患者，入院后急查血气 ， ，立即鼻导管给氧 分， 小时后病人发绀减轻，但神志不清呈昏睡状，复查血气为 ，此时首先应立即给予的处理是：

- 加大吸氧流量
- 降低吸氧流量
- 静脉注射地塞米松
- 静脉滴注头孢菌素
- 继续观察

女性， 岁，因肥胖，嗜睡入院，血糖 。 小时尿 羟 μ μ 正常 μ μ ，尿游离皮质醇 正常 ，小剂量地塞米松抑制试验后 小时尿 羟 μ μ ，尿游离皮质醇 。

下列哪项解释最有可能？

- 皮质醇增多症
- 精神抑郁症

原发性甲减 单纯性肥胖 型糖尿病  
患者男性， 岁，干部，面色苍白 年， 周前患感冒发热并发现巩膜轻度黄染，早晨解浓茶色样尿，检查： ， ×  
，网织红细胞 ， 试验(+)， 试验(+)。选择哪种处理措施最好？

- 输新鲜全血
- 输浓缩血小板
- 输青霉素
- 输维生素
- 地塞米松

女性， 岁，突发剑突下剧烈绞痛间歇发作。检查：巩膜无黄染，腹软，剑下轻压痛，无反跳痛，首先考虑为何病的临床表现？

- 胆囊结石病
- 胆总管结石
- 胆道蛔虫
- 消化性溃疡穿孔
- 急性出血性胰腺炎

小叶中心型阻塞性肺气肿最主要的病理特点是

- 、 、 级呼吸性细支气管扩张，外周正常
- 终末细支气管以下结构全部扩大
- 肺泡管，肺泡囊，肺泡扩张
- 肺小叶和肺泡囊扩大
- 呼吸性细支气管破坏，肺泡孔破裂增大

女性， 岁，多饮，多尿半年，尿糖（ ）。空腹血糖 ，餐后二小时血糖 ，葡萄糖  
糖耐量试验 小时血糖 。二小时血糖 ，尿糖（ ），诊断首先考虑为

- 非胰岛素依赖型糖尿病（ ）
- 胰岛素依赖型糖尿病（ ）
- 肾性糖尿
- 糖耐量异常
- 营养不良性糖尿病

岁女孩，右眼外展不能，左侧上下肢中枢性瘫痪，病变部位在

- 左内囊 · 右内囊 · 左延髓
- 右桥脑 · 左中脑

李某，男， 岁， 小时前生气时突然头痛，呕吐，右侧肢体无力， 分钟后昏迷，入院检查： ，中度  
昏迷，右鼻唇沟浅，右侧肢体肌力 级，右 征(+)。脑 示左基底节区有一个直径为 左右的高密度影。入院 小时  
后，左瞳孔 ，对光反应消失，右瞳 ，光反应存在。首选诊断为

- 脑血栓形成合并脑疝 · 脑栓塞合并脑疝
- 脑出血合并脑疝 · 蛛网膜下腔出血
- 脑出血

王某，女， 岁， 小时前，做饭时突然剧烈头痛，呕吐，肢体活动好，颈强直， 征(+)，腰穿压力 水柱，脑脊液呈  
均匀血性，最重要的检查是

- 脑电图 · 脑磁共振检查
- 脑 · 全脑血管造影 · 复查腰椎穿刺

患者女性， 岁，因心悸，气急，胸闷半月入院。病前两周曾有发热，腹泻史。体检：肺部无罗音，心界向左明显扩大，心率  
次/分，律齐，第一心音减低，心尖可闻及 级收缩期杂音，血沉 ，抗 阴性， ，心电图示 窦性心动过速，I度  
房室传导阻滞，心肌损害 本例诊断最大可能是

- 风湿性心肌炎 · 病毒性心肌炎

- 扩张型心肌病
  - 急性心包炎
  - 先天性心脏病
- 下列哪项最有助于急性肾衰与慢性肾衰的鉴别？
- 年龄
  - 少尿的程度
  - 有无并发症
  - 有无高血钾
  - 影像学检查，肾脏有无萎缩

有关糖尿病代谢紊乱，下列哪一项描述最正确？

- 1型糖尿病，胰岛素分泌第一时相正常
- 肝糖原合成降低，分解减少，葡萄糖异生增加
- 肝等组织对氨基酸摄取增加，合成蛋白质减少
- 胰岛素极度缺乏时，激素敏感性脂酶活性减弱
- 有些2型病人空腹血糖正常

女性，30岁，昨日晨起感右眼闭合不全，口角左歪，进食滞留在右颊部，今日感右耳部疼痛，查见右侧周围性面瘫，右舌前味觉丧失，右侧外耳道小疱疹，触及疼痛，该病变部位最可能在

- 脑干
- 右侧内听道
- 右侧膝状神经节
- 右面神经管内
- 右侧茎乳突孔内

男，45岁，自右背部放射至右腋下疼痛1月，右下肢乏力1月，加重伴小便费力半月。查体：双下肢肌张力增高，右下肢肌力III级，左下肢IV级，腱反射右亢，左正常，双下肢病理征(+)；左下肢以下痛觉减退，左侧明显；右下肢振动觉差。应考虑哪一种疾病最可能？

- 急性脊髓炎
- 脊髓空洞症
- 急性脊髓硬膜外脓肿
- 脊髓髓外肿瘤
- 脊髓髓内肿瘤

女性，35岁，间歇性双颞部搏动性痛1年。每次头痛持续数小时至1天，伴恶心，呕吐。月经前后易发作，有家族史，神经系统检查无异常，最可能诊断是

- 典型偏头痛
- 普通型偏头痛
- 群集性头痛
- 紧张性头痛
- 神经官能症

30岁风心病二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全患者，发热二周。体检：体温38.5℃，口腔粘膜及下肢皮肤瘀点。心率100次/分，律齐。二尖瓣区III级收缩期杂音及舒张期杂音，主动脉瓣区舒张期杂音，腹软，脾左肋下2cm，有压痛。该患者应进行下列哪项检查最能明确诊断？

- 尿常规 肾功能
- 血培养
- 心电图
- 凝血因子

35岁男性患者，常感活动后心前区疼痛，伴头晕，气短，乏力。体检：胸骨左缘第4、5肋间可闻III级收缩期杂音，作动作杂音增强，有第四心音。该患者应先作下列哪项检查以协助诊断？

- 胸部X线
- 心电图
- 心音图
- 超声心动图
- 心血管造影

女，45岁，诊断为原发性甲亢，心率120次/分，甲状腺肿大，摄取率30%，情绪较急躁，甲状腺轻度弥漫性肿大，该病人最适宜的治疗方法是

- 甲状腺大部切除术
- 放射性碘治疗
- 抗甲亢药物治疗
- 碘剂治疗
- 心得安治疗

30岁男患，患急性肺脓肿，经大量青霉素治疗后体温有所下降，但近日来痰量减少，体温又回升，在治疗中除使用抗生素，还应采取下列哪项首要措施？

胃窦部癌，××，已累及浆膜层，检查左肝外叶有大小转移灶，胰腺正常，此病人的治疗最应选择

- 痰液引流
- 糖皮质激素
- 外科手术
- 支气管解痉药
- 止血药

一女，岁，现孕个月，自觉心悸，多食。次分，，甲状腺弥漫性肿大，为了明确诊断，下面哪

- 超
- 基础代谢率
- 颈部正侧位片
- 核素扫描

岁男性，上腹部隐痛，进食疼痛加重年，能干重活，此次进食后突然上腹剧痛，迅速波及全腹。小时来诊，查体：头出冷汗，面色苍白，次分，。：次分，：度，全腹压痛和肌紧张，×中型核，最恰当的处理是

- 腹穿置管引流
- 急作腹部超检查
- 急作胃肠钡透
- 急诊剖腹探查作胃大部切除
- 补液密切观察

关于急性白血病发病与下列哪种因素最有关？

- 输血
- 输白蛋白
- 患甲型肝炎
- 他巴唑
- 苯制剂

男，岁，因胸骨后疼痛天，出冷汗，皮肤凉小时来院就诊。测。示，导联的段明显抬高，并有深而宽的波。血清峰高出正常的倍。该患主要冠脉病变最可能是在

- 左冠脉前降支
- 左冠脉回旋支
- 左冠脉主干
- 左冠脉回旋支 左室前支
- 左回旋支 中隔支

壶腹癌的临床表现中较早出现的是

- 黄疸
- 上腹痛及背脊痛
- 寒战发热
- 便血
- 贫血，消瘦

肾结核感染途径最多是经

- 胃肠道结核感染
- 肺内结核菌进入血流播散到肾内
- 经尿道结核菌逆行感染到肾脏
- 腰椎结核直接扩散到肾
- 附睾结核逆行扩散

婴幼儿营养不良的最主要诊断依据是

- 有慢性消化系统疾病
- 有喂养不当史
- 体重及皮下脂肪减少
- 身高低于同龄儿
- 血清总蛋白及白蛋白减少

男性矿工 岁，左膝疼痛已有半年余，右膝乏力，尤其出现在上下楼梯时，有 关节交锁 感。检查：股四头肌萎缩，关节外侧有压痛，回旋挤压时有 咔嗒 声， 线片检查，轻度退行性改变，最为准确的检查方法是

- 检查
- 检查
- 关节镜检查
- 关节造影
- 超声检查

最易合并肱动脉损伤的骨折是

- 肱骨外科颈骨折
- 肱骨干骨折
- 肱骨髁间骨折
- 伸直性肱骨髁上骨折
- 屈曲性肱骨髁上骨折

患者，男， 岁，工人。腰椎间盘突出症有典型的右侧坐骨神经痛。右小腿前外侧及拇趾根部早期痛觉过敏，后为感觉消失，并伴有右伸拇肌力减弱，膝及髌反射正常。此椎间盘突出症应在

- 间盘
- 间盘
- 间盘
- 间盘中央型突出
- 间盘突出在受压神经根的内侧

男性， 岁，进行性排尿困难 年，直肠指诊：前列腺 II 度大，表面滑，质韧，测残余尿 ，查血生化： ，

- 首先应采取的治疗措施为
- 经尿道前列腺电切术
  - 口服 $\alpha$  受体阻滞剂
  - 插尿管持续引流尿液
  - 耻骨上前列腺摘除术
  - 口服女性激素

女性， 岁，不慎摔倒，自觉左髌、左膝关节疼痛，不能站立、行走。查体：左下肢外旋 度；髌部无肿胀及淤血；有纵轴叩击痛；膝关节无肿胀、压痛。最应考虑诊断

- 粗隆间骨折
- 髌关节后脱位
- 股骨颈骨折
- 髌骨骨折
- 股骨干骨折

全肺切除以后早期最常见的合并症为

- 急性肺水肿
- 急性右心功能衰竭
- 肺梗塞
- 呼吸道梗阻、窒息
- 支气管胸膜瘘

先天愚型男孩，染色体核型为 ， 经检查证明其母为平衡易位携带者，其母染色体核型及下一胎复发危险率应分别为

- 复发危险率
- 复发危险率
- 复发危险率
- 复发危险率
- 复发危险率

停经 天的已婚妇女，确定是否宫内妊娠，最合适的方法是

- 尿妊娠试验
- 黄体酮试验
- 多普勒超声试验
- 盆腔检查
- 超检查

个月女孩，母乳喂养，未加辅食，近两个月来经常腹泻，食欲减退，面色苍白，心尖部 II 级收缩期杂音，肝肋下 ，脾 ，

化验：红细胞  $\times$  万 ， ，诊断最可能是

- 营养性大细胞贫血
- 营养性缺铁性贫血
- 感染性贫血
- 再生低下性贫血
- 生理性贫血

男孩， 岁，发热半个月，脑膜刺激征阳性，末梢白细胞  $\times$  ，中性 ，淋巴 ，脑脊液中细胞数 ，中性 ，

单核 ，糖 ，氯化物 ，蛋白定量 ，涂片找到细菌，诊断最可能是

- 病毒性脑膜炎
- 化脓性脑膜炎
- 结核性脑膜炎

- . 中毒性脑病
- . 脑脓肿

患儿生后 天，拒食，不哭，体温不升，双下肢皮肤紫红色，发硬，首先应给

- . 激素治疗
- . 抗生素治疗
- . 补液
- . 补充足够营养和热量
- . 快速复温

男性， 岁，农民，右腰痛 天，无尿一天，查右肾区有叩痛，膀胱不胀，泌尿系平片示左肾区有铸型结石阴影，右下腹相当髂血管分叉处有花生米大小不透光阴影，首先应如何处理？

- . 给利尿剂 . 大量输液促进排石
- . 先处理右输尿管结石 . 左肾造口术 . 抗菌素

缩窄性心包炎临床的治疗原则是

- . 抗结核药物治疗 . 强心利尿
- . 尽早施行手术治疗 . 心包穿刺或胸腔穿刺
- . 全身支持治疗，不需手术治疗

卵巢肿瘤最常见的并发症

- . 恶变 . 感染 . 出血 . 破裂 . 蒂扭转

引起产后出血最常见的原因是

- . 产道撕裂 . 胎盘残留
- . 子宫收缩乏力 . 凝血功能障碍 . 胎盘嵌顿

臀位分娩，哪项处理最正确？

- . 凡臀位均应剖宫手术 . 骨盆入口狭窄可以试产
- . 阴道口已见胎足拨露，证明宫口已开全 . 堵臀时间越长越好
- . 阴道分娩时从脐部到胎头娩出，不应超过 分钟

岁男孩，不慎跌下时，上肢外展，手掌先着地，跌伤后肘部肿痛，功能障碍。检查肘部明显畸形，肘关节固定于半伸位，肘后隆起，皮下青紫，压痛明显，最大可能诊断是

- . 尺骨鹰嘴骨折 . 伸直型肱骨髁上骨折
- . 肘关节后脱位 . 肘部挫伤 . 肘关节前脱位

女性， 岁，孕 产 。第一胎为人工流产，诉妊娠 周，阴道流血 天，超月经量，检查：血压 ，头位，胎心率 次/分，子宫无收缩，无压痛，最恰当的处理方法是

- . 阴道检查 . 绝对卧床，左侧卧位
- . 缩宫素静滴引产 . 剖宫产 . 人工破膜 头皮钳牵引

男孩 个月。呕吐、腹泻 天，伴高热（ 度），大便 次日，初为水样便，随即为粘冻状大便，偶有带血，量不多。体检：轻度脱水貌，心肺腹无特殊。大便常规：粘液便， 高倍镜，偶见吞噬细胞。连续大便培养两次未见痢疾杆菌，该婴儿腹泻最大可能的病因是

- . 产毒性大肠杆菌 . 侵袭性大肠杆菌
- . 埃可病毒 . 鞭毛虫 . 阿米巴

周臀位产新生儿，男，出生时 评分 分， 分钟后评分 分， 分钟评分 分，次日出现烦躁，时而嗜睡，拒奶。度， 次/分，呼吸不规则，时有暂停现象，前囟  $\times$  ，稍紧张，心肺腹检查无特殊，为明确诊断应首选下列何种检查？

- . 头部 检查 . 胸片
- . 超声心动图 . 血培养 . 脑脊液检查

患者吞咽困难已二年，有时进流食也有困难，时有呕吐及胸骨后疼痛。食管钡餐透视显示，食管下端呈鸟嘴状狭窄，上端明显扩张，诊断首选

- 食管良性肿瘤
- 贲门失弛缓症
- 贲门癌
- 食管癌
- 食管憩室

岁，不规则阴道流血已 月余，白带脓性，阴道内可触及 × × 大小肿物，暗红色，表面坏死感染，肿物四周可触及宫颈边缘，宫体正常大小，附件正常，本病例最可能的诊断是

- 子宫颈癌
- 子宫脱垂
- 子宫颈息肉
- 子宫翻出
- 粘膜下子宫肌瘤

诊断为肾结核，在强化治疗期哪一种治疗方案最恰当？

- 异菸肼 ，每日三次，对氨水杨酸钠 克，每日三次
- 异菸肼 ，每日三次，链霉素 肌注，每日二次
- 异菸肼 ，每日一次，利福平 ，每日一次（均空腹）
- 利福平 异菸肼 吡嗪酰胺 ，均每日一次空腹服并可加用维生素 日
- 利福平 乙胺丁醇 ，一日二次

胸外伤后，腹壁软化（浮动胸）的发病最主要原因是

- 两根肋骨骨折
- 多根多处肋骨骨折
- 胸骨骨折
- 反常呼吸
- 二氧化碳潴留

岁 个月女婴，近 周烦躁，不规律发烧 度，近 日来呕吐，便秘，易激惹，脑脊液细胞数 × （ ），首先考虑为

- 化脓性脑膜炎
- 病毒性脑膜炎
- 结核性脑膜炎
- 中毒性脑病
- 隐球菌性脑膜炎

男孩，三岁，右上肢外伤一周，此时检查有无神经损害，最有诊断价值的是

- 主动活动异常
- 两点鉴别觉异常
- 关节位置觉异常
- 肢端皮肤潮红，皮肤多汗
- 征阳性

苯丙酮尿症治疗原则最重要的是

- 限其所忌
- 排其所余
- 补其所缺
- 特效药物
- 任其自然

男性， 岁，工人，右胸撞击伤后二十分钟急送到院。体检：病人极度呼吸困难，伴紫绀，听诊右侧呼吸音消失，叩诊呈高度鼓音，可触及皮下气肿。右胸壁无创口。首先应给予的急救处理是

- 右侧胸膜腔穿刺排气
- 心包切开引流
- 给氧治疗
- 剖胸探查止血
- 剖胸探查修补破裂口

患者 岁，月经过多，月经周期 天来潮。阴道流血过多来院。即刻诊刮止血。病检报告为子宫内膜腺瘤型增生过长，应作哪项处理最适宜？

- 雄激素周期治疗
- 雌、孕激素序贯治疗
- 雄、孕激素合并治疗
- 子宫全切除术
- 雌、孕激素合并治疗

心脏病患者，现妊娠 周，出现急性心力衰竭，最好的处理办法是

- 即刻终止妊娠
- 控制心力衰竭，继续妊娠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/757010045023006042>