

2024 贵州省沿河土家族自治县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题完整题库带答案（完整版）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 成人应用 0.1% 溶液，儿童应用 0.05% 溶液，这种药物是

- A: 酚甘油滴耳液
- B: 羟甲唑啉滴鼻液
- C: 麻黄碱滴鼻液
- D: 赛洛唑啉滴鼻液

答案：D

2. 属于 GLP-1 受体激动剂的是（）。

- A: 艾塞那肽
- B: 那格列奈
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案：A

3. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是（）

- A: 长春碱类
- B: 紫杉醇
- C: 多柔比星
- D: 伊立替康

答案：D

4. 属于雄激素类的是()

- A: 他莫昔芬
- B: 己烯雌酚
- C: 睾酮
- D: 甲地孕酮

答案: C

5. (2021 年真题) 患者，男，48 岁，入院接受结肠癌手术，术后因合并肺部感染，静脉给予头孢哌酮舒巴坦钠治疗 6 天，观察到手术切口和静脉输液穿刺部位有少量渗血，实验室检验结果显示凝血功能异常。针对此症状，宜选用的治疗药物是 ()

- A: 重组链激酶
- B: 重组人促红素
- C: 维生素 K1
- D: 维生素 B12

答案: C

6. 患者，女，70 岁，BMI21kg/m²，45 岁时绝经，10 年前开始，经常出现腰背部疼痛，活动后加重，但未就诊，平日外出活动较少，近 5 年身高降低，驼背明显。10 天前患者不慎摔倒，上肢活动受限、疼痛，就诊后检查结果: 血钙 1.97mmol/L, 血磷 1.7mmol / L, 右上肢 X 光检查提示: 右桡骨远端骨折。骨密度检查结果: T 值 (-2.9)。

- A: 秋水仙碱
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 双醋瑞因
- D: 地塞米松

答案: B

7. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，诊断为“甲癣”，宜使用的药物是 ()

- A: 氟康唑
- B: 氟胞嘧啶
- C: 特比萘芬
- D: 卡泊芬净

答案：C

8. 属于孕激素类的是 ()

- A: 他莫昔芬
- B: 己烯雌酚
- C: 睾酮
- D: 甲羟孕酮

答案：D

9. 噻嗪类利尿药略增加 HCO_3^- 的排泄，是因为其可以抑制

- A: 磷酸二酯酶
- B: Na^+-Cl^- 共转运子
- C: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- D: 碳酸酐酶

答案：D

10. (2017 年真题) 长期大剂量服用维生素 D 可能引起的不良反应是 ()

- A: 颅内压升高
- B: 血栓性静脉炎
- C: 高胆红素血症
- D: 高钙血症

答案：D

11. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- B: 服药过程中适当补充维生素 B
- C: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- D: 若出现低血糖反应，应立即饮用蔗糖水

答案：D

12. （2015 年真题）用于低分子肝素过量时解救的药品是（ ）。

- A: 鱼精蛋白
- B: 氨甲环酸
- C: 维生素 K1
- D: 酚磺乙胺

答案：A

13. 透到异常细胞的药量比正常细胞多的药物

- A: 壬二酸
- B: 阿达帕林
- C: 异维 A 酸
- D: 维 A 酸

答案：A

14. ACEI 与其联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸和血糖的不良影响的是（ ）

- A: 人促红素
- B: β 受体阻断药

C: 留钾利尿药

D: 噻嗪类利尿药

答案：D

15. 治疗伤寒、副伤寒的首选药是

A: 诺氟沙星

B: 氯霉素

C: 四环素

D: 青霉素

答案：B

16. 对铜绿假单胞菌无效的氟喹诺酮类药是

A: 氧氟沙星

B: 呋喃唑酮

C: 磺胺嘧啶

D: 甲氧苄啶

答案：A

17. 下述不属于抗病毒药物禁忌证的是()

A: 糖尿病、高血压患者禁用

B: 妊娠期妇女禁用利巴韦林

C: 相应药物过敏者禁用

D: 严重中性粒细胞减少者禁用更昔洛韦

答案：A

18. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌肉注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

- A: 链霉素引起的肾毒性
- B: 链霉素引起的神经肌肉阻滞作用
- C: 链霉素引起的过敏性休克
- D: 链霉素引起的神经毒性

答案：C

19. 属于广谱抗心律失常药物的是()

- A: 利多卡因
- B: 地高辛
- C: 胺碘酮
- D: 苯妥英钠

答案：C

20. 早产系指妊娠在多少周之间结束者

- A: 28~37 周
- B: 18~37 周
- C: 25~37 周
- D: 28~38 周

答案：A

21. 对铜绿假单胞菌有较强作用的药物是

- A: 哌拉西林
- B: 美西林
- C: 氯唑西林
- D: 阿莫西林

答案：A

22. 属于雌激素类退乳药的是()

- A: 甲羟孕酮
- B: 己烯雌酚
- C: 他莫昔芬
- D: 睾酮

答案：B

23. 普通儿童感冒患者,体温升高($>38.5^{\circ}\text{C}$),宜选用的药物是()

- A: 茶碱缓释片
- B: 右美沙芬片
- C: 氯苯那敏片
- D: 对乙酰氨基酚滴剂

答案：D

24. 林可霉素类抗菌药物无抗菌作用的是

- A: 厌氧菌
- B: 革兰阳性球菌
- C: 肺炎支原体
- D: 肺炎链球菌

答案：C

25. 毛花苷丙经弱碱水解去乙酰化的产物是

- A: 地高辛
- B: 去乙酰毛花苷(西地兰 D)
- C: 毛花苷丙(西地兰 C)
- D: 洋地黄毒苷

答案：B

26. 青霉素的抗菌谱不包括

- A: 脑膜炎双球菌
- B: 肺炎球菌
- C: 伤寒杆菌
- D: 破伤风杆菌

答案：C

27. (2021 年真题) 常见不良反应为泌尿生殖系统感染的口服降糖药物是 ()

- A: 沙格列汀
- B: 吡格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 达格列净

答案：D

28. 高血压伴变异型心绞痛宜选用

- A: 尼莫地平
- B: 普萘洛尔
- C: 硝苯地平
- D: 利血平

答案：C

29. 与两性霉素 B 合用可减少复发率产生协同作用的药物是 ()

- A: 灰黄霉素
- B: 阿昔洛韦
- C: 氟胞嘧啶
- D: 酮康唑

答案：C

30. (2021 年真题) 可用于治疗蛔虫病、蛲虫病、钩虫病和鞭虫病的广谱驱虫药物是 ()

- A: 甲苯咪唑
- B: 乙胺嗪
- C: 氯硝柳胺
- D: 甲硝唑

答案: A

31. 患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是 ()。

- A: 青霉素 G
- B: 左氧氟沙星
- C: 头孢氨苄
- D: 阿莫西林

答案: B

32. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌等的作用均很强的头孢类药物是

- A: 第一代头孢菌素
- B: 第二代头孢菌素
- C: 第四代头孢菌素
- D: 第三代头孢菌素

答案: C

33. 关于肝素和低分子肝素作用特点的说法，错误的是

- A: 肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用
- B: 低分子肝素抗凝作用维持时间较长，可以一日 1 次或 2 次给药
- C: 肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快

D: 皮下给药，低分子肝素的生物利用度接近 100%

答案：A

34. 以下不属于强心苷的禁忌症的选项是

A: 室性心动过速、心室颤动

B: 预激综合征伴心房颤动或扑动

C: 梗阻性肥厚型心脏病

D: 慢性收缩性心力衰竭

答案：D

35. 利福平与口服避孕药合用()

A: 代谢加快而失效

B: 子宫内膜突破性出血

C: 抑制排酸作用

D: 代谢加速而导致意外怀孕

答案：D

36. 第 3 代二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂是

A: 替格雷洛

B: 氯吡格雷

C: 噻氯匹定

D: 替罗非班

答案：A

37. (2021 年真题) 属于阳离子型表面活性剂，可用于治疗咽喉炎的药物是 () e

A: 度米芬

B: 西地碘

C: 氮溴索

D: 羟甲唑啉

答案: A

38. 低剂量可提供接近全效降压作用的药物是

A: 螺内酯

B: 氨苯蝶啶

C: 阿米洛利

D: 氢氯噻嗪

答案: D

39. 下述药物中不可用于治疗疥疮的是

A: 林旦霜

B: 硫黄软膏

C: 苯甲酸苄酯

D: 过氧苯甲酰

答案: D

40. 患儿，男，6 岁。三天前出现咳嗽，流涕，体温 38℃，诊断为普通感冒。适用于该患儿的药物为

A: 曲马多

B: 保泰松

C: 对乙酰氨基酚

D: 尼美舒利

答案: C

41. 治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是

A: 利巴韦林滴眼液

- B: 更昔洛韦滴眼液
- C: 碘苷滴眼液
- D: 四环素可的松眼膏

答案: D

42. 可中效、稳定的降低糖化血红蛋白的是

- A: 吡格列酮
- B: 胰岛素皮下注射
- C: 阿卡波糖
- D: 西格列汀

答案: D

43. 下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

- A: 丙美卡因
- B: 噻吗洛尔
- C: 左氧氟沙星
- D: 毛果芸香碱

答案: D

44. 低精蛋白锌胰岛素是

- A: 中效类胰岛素
- B: α -葡萄糖苷酶抑制剂
- C: 长效类胰岛素
- D: 磺酰脲类

答案: A

45. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

- A: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇

- B: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂
- C: 定期监测电解质、肾功能
- D: 肾功能不全者可以使用

答案：D

46. 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化，利尿的同时，还应给予的药物是（）

- A: 螺内酯
- B: 二甲双肌
- C: 美司钠
- D: 氯化钾

答案：C

47. 下列药物中不属于治疗疥疮的是

- A: 林旦霜
- B: 克罗米通
- C: 硫黄软膏
- D: 过氧苯甲酰

答案：D

48. 对革兰阳性菌作用弱，而对革兰阴性菌作用强的药物是

- A: 第二代头孢菌素
- B: 第四代头孢菌素
- C: 第三代头孢菌素
- D: 第一代头孢菌素

答案：C

49. 关于达比加群酯的描述，错误的是

- A: 与阿司匹林联用不会增加出血风险
- B: 用药期间应监测凝血功能、肝功能
- C: 为直接凝血酶的抑制剂
- D: 长期口服安全性较好

答案：A

50. 属于 PDE5 抑制剂的禁忌人群的是

- A: 2 周前发生过心肌梗死或脑卒中
- B: 轻度、稳定型心绞痛
- C: 中度的充血性心力衰竭
- D: 高血压未得到控制者

答案：D

51. 下列关于升华硫的描述中，错误的是

- A: 儿童慎用
- B: 可用于痤疮、脂溢性皮炎
- C: 不得与铁制品接触
- D: 避免接触眼睛和其他黏膜

答案：C

52. 可与催化肽聚糖合成的磷酸烯醇丙酮酸转移酶不可逆性结合，使该酶灭活，阻断细菌细胞壁的合成，从而导致细菌死亡的是

- A: 美罗培南
- B: 利奈唑胺
- C: 磷霉素
- D: 万古霉素

答案：C

53. 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药物是

- A: 乳酸钠
- B: 氯化钠
- C: 硫酸镁
- D: 氯化铵

答案：A

54. 痛风缓解期(关节炎症控制后 1~2 周)，为控制血尿酸水平，应选用的药品是()。

- A: 秋水仙碱
- B: 布洛芬
- C: 别嘌醇
- D: 泼尼松龙

答案：C

55. 地西泮用于

- A: 特发性震颤
- B: 慢性脑功能不全
- C: 神经源性尿崩症
- D: 早期帕金森病

答案：A

56. 对生殖过程起作用的是

- A: 视黄酸
- B: 维生素 A
- C: 视黄醇
- D: 视黄醛

答案：C

57. (2016 年真题) 与西地那非协同，可导致严重低血压的药品是

- A: 硝酸甘油
- B: 甲睾酮
- C: 非那雄胺
- D: 丙酸睾酮

答案：A

58. 严重中毒性感染采用

- A: 糖皮质激素一般剂量长期疗法
- B: 糖皮质激素小剂量代替疗法
- C: 抗结核病药与糖皮质激素合用
- D: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

答案：D

59. 患者，男，50 岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148 / 90mmHg，心率 80 次 / 分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

- A: 抑制循环系统的转换酶，减少血管紧张素 II 的生成
- B: 作用于 RAAS 初始环节，从源头减少血管紧张素 II 的生成
- C: 阻断 AT1 受体
- D: 促进缓激肽水解

答案：A

60. 急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药是()

- A: 利多卡因
- B: 普萘洛尔
- C: 胺碘酮
- D: 奎尼丁

答案：A

61. (2018 年真题) 用于治疗疥疮的药物有 ()

- A: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏
- B: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏
- C: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏
- D: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏

答案：A

62. 强心苷中毒引起的室性心律失常，治疗应首选的药物是

- A: 普罗帕酮
- B: 丙吡胺
- C: 普萘洛尔
- D: 苯妥英钠

答案：D

63. 在体外无抗凝作用，在体内有抗凝血作用的是

- A: 华法林
- B: 尿激酶
- C: 噻氯匹定
- D: 肝素

答案：A

64. 以下抗寄生虫药的使用方法错误的是

- A: 左旋咪唑驱蛔虫空腹或睡前顿服
- B: 阿苯达唑治疗蛲虫病一次即为一疗程，药片需用水吞服
- C: 氯硝柳胺驱牛带绦虫和猪带绦虫应空腹吞服
- D: 蛲虫病易自身重复感染，故在阿苯达唑治疗 2 周后应重复治疗一次

答案：C

65.（2016 年真题）可导致神经毒性（四肢麻木、腱反射消失）的抗肿瘤药是

- A: 柔红霉素
- B: 紫杉醇
- C: 长春新碱
- D: 博来霉素

答案：C

66. 左炔诺孕酮为

- A: 雌激素类
- B: 促性腺激素
- C: 促性腺激素释放激素类似物
- D: 短效口服避孕药

答案：D

67. 主要降低血中胆固醇且具有首过效应的是

- A: 洛伐他汀
- B: 氯贝丁酯
- C: 普萘洛尔
- D: 苯扎贝特

答案：A

68. 哌拉西林和羧苄西林()

- A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- B: 肾毒性大
- C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

D: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

答案：C

69. 可与硝酸酯类药物发生相互作用的是

A: 坎利酮

B: 丙酸睾酮

C: 伐地那非

D: 呋塞米

答案：C

70. (2018 年真题) 可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是 ()

A: 头孢呋辛

B: 头孢唑林

C: 头孢米诺

D: 头孢他啶

答案：D

71. 仅对浅表真菌感染有效的药物 ()

A: 灰黄霉素

B: 两性霉素 B

C: 伊曲康唑

D: 氟康唑

答案：A

72. 下列抗心律失常药中，属于 Ia 类钠通道阻滞药的是 ()

A: 奎尼丁

B: 利多卡因

C: 苯妥英钠

D: 普罗帕酮

答案：A

73. 雷尼替丁在使用中应注意

A: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

B: 糖尿病患者避免使用

C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

D: 对食管有刺激性，需整片吞服

答案：B

74. 卡马西平用于

A: 早期帕金森病

B: 特发性震颤

C: 慢性脑功能不全

D: 神经源性尿崩症

答案：D

75. 长春碱使细胞有丝分裂停止于

A: G

B: G

C: S 期

D: M 期

答案：D

76. 口角炎患者用选用的维生素是

A: 维生素 B

B: 维生素 D

C: 维生素 A

D: 维生素 B

答案：D

77. 甲状腺功能亢进症的内科治疗宜选用()

A: 甲巯咪唑

B: 吡格列酮

C: 甲状腺素

D: 小剂量碘剂

答案：A

78. 治疗流行性脑脊髓膜炎的首选药物是

A: 青霉素

B: 磺胺嘧啶

C: 红霉素

D: 氯霉素

答案：B

79. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

A: 胃溃疡

B: 骨关节炎

C: 痛风

D: 肾绞痛

答案：B

80. 伴随剂量增大，阿托品出现的症状以下排序正确的是

A: 心率减慢、心率加快、显著口干、肠蠕动减少

B: 心率加快、心率减慢、显著口干、肠蠕动减少

C: 显著口干、心率减慢、心率加快、肠蠕动减少

D: 瞳孔扩大、心率加快、胃液分泌抑制、胃肠道平滑肌兴奋性降低

答案：A

81. 主要用于疟疾的预防，也可用于治疗弓形虫病的药物是

A: 双氢青蒿素

B: 奎宁

C: 乙胺嘧啶

D: 蒿甲醚

答案：C

82. 血浆蛋白结合率低，易透过血-脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是

A: 磺胺嘧啶

B: 磺胺多辛

C: 甲氧苄啶

D: 复方新诺明

答案：A

83. (2015 年真题) 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是 ()。

A: 拉米夫定

B: 恩替卡韦

C: 干扰素

D: 泛昔洛韦

答案：D

84. 属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是

A: 丙酸睾酮

B: 阿那曲唑

C: 炔雌醇

D: 他莫昔芬

答案: B

85. 属于雌激素的是

A: 地塞米松

B: 尼尔雌醇

C: 甲羟孕酮

D: 泼尼松龙

答案: B

86. (2019 年真题) 吸收后代谢成活性产物而发挥抗甲型和乙型流感病毒的前体药物是 ()

A: 奥司他韦

B: 扎那米韦

C: 金刚烷胺

D: 金刚乙胺

答案: A

87. 长期应用不但加速自身代谢，而且可加速其他合用药物代谢的肝药酶诱导剂是 ()。

A: 苯巴比妥

B: 地西泮

C: 唑吡坦

D: 佐匹克隆

答案: A

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

88. 适宜睡前服用，用于抑制"酸突破现象"的抑酸剂是()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/757033040046010024>