

青海省河南蒙古族自治县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题真题题库含答案 (培优 B 卷)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 属于糖皮质激素引起的隐匿或延迟不良反应与并发症的是

- A: 胰腺炎
- B: 青光眼
- C: 骨质疏松症
- D: Cushing 综合征体型

答案: C

2. 哌拉西林

- A: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效
- B: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效
- C: 对支原体有效
- D: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效

答案: B

3. 常规剂量应用多潘立酮不易导致的不良反应是

- A: 女性月经不调
- B: 男子乳房女性化
- C: 室性心律失常
- D: 锥体外系反应

答案: D

4. 通过与寄生虫肠细胞微管蛋白特异性结合而干扰其细胞微管形成，可使寄生虫肠道超微结构退化，从而破坏寄生虫对葡萄糖的吸收及消化功能，最终导致寄生虫死亡的药物是

- A: 甲苯咪唑
- B: 哌嗪
- C: 阿苯达唑
- D: 左旋咪唑

答案：A

5. 预防急性肾功能衰竭

- A: 呋塞米
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案：A

6. 关于氢氧化镁的叙述正确的是

- A: 中和胃酸作用强而迅速
- B: 不影响排便
- C: 对溃疡面有保护作用
- D: 口服易吸收

答案：A

7. 解救大剂量甲氨蝶呤中毒

- A: 地塞米松
- B: 亚叶酸钙
- C: 氟他胺
- D: 昂丹司琼

答案：B

8. 出现流感样症候群，寒战、发热的药物是

- A: 对氨基水杨酸
- B: 链霉素
- C: 利福平
- D: 异烟肼

答案：C

9. 幼儿甲状腺素不足易患

- A: 呆小病
- B: 黏液性水肿
- C: 单纯性甲状腺肿
- D: 侏儒症

答案：A

10. 利福平可促进雌激素的代谢或减少其肠肝循环，降低口服避孕药的作用，导致月经不规则，月经间期出血和计划外妊娠。所以，患者服用利福平时，应改用其他避孕方法。

- A: 后者血药浓度下降，药效降低
- B: 不良反应叠加
- C: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- D: 药理作用拮抗

答案：A

11. 下述药物中用于拮抗肝素过量的是

- A: 维生素
- B: 维生素 K1

C: 鱼精蛋白

D: 氨基苯酸

答案: C

12. 治疗指数窄，一般治疗量约为中毒量的 1/2 的药物是()

A: 卡托普利

B: 呋塞米

C: 地高辛

D: 哌唑嗪

答案: C

13. 掩盖低血糖反应的抗心律失常药是()

A: 利多卡因

B: 普萘洛尔

C: 胺碘酮

D: 奎尼丁

答案: B

14. 常用于引产或催产，亦用于产后出血和子宫复原不全

A: 麦角新碱

B: 缩宫素

C: 地诺前列酮

D: 普拉睾酮

答案: B

15. 服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

A: 头孢呋辛

B: 克林霉素

C: 左氧氟沙星

D: 磺胺甲恶唑

答案: D

16. 可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

A: 亚胺培南

B: 阿莫西林

C: 克拉维酸

D: 氨曲南

答案: D

17. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 四氢叶酸

B: 维生素 B12

C: 叶酸

D: 硫酸亚铁

答案: D

18. 利福平对多种革兰阳性球菌，特别是()具有强大抗菌作用

A: 变形杆菌

B: 耐药金黄色葡萄球菌

C: 流感杆菌

D: 大肠埃希菌

答案: B

19. 关于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述，不正确的是

- A: 适用于老年人
- B: 易导致低血糖
- C: 口服吸收较少
- D: 用于餐后高血糖

答案：B

20. 氟尿嘧啶可用于治疗()。

- A: 绒毛膜上皮癌
- B: 晚期睾丸肿瘤
- C: 晚期前列腺癌
- D: 急性淋巴细胞白血病

答案：A

21. 抑制 HIV 的反转录酶，导致链合成的终止并打断病毒复制的循环的药物是

- A: 整合酶抑制剂
- B: 蛋白酶抑制药
- C: 核苷类反转录酶抑制药
- D: 非核苷类反转录酶抑制药

答案：C

22. 铁剂用药期间需定期做下列检查，以观察治疗效果，不包括

- A: 血清铁蛋白
- B: 血红蛋白
- C: 巨核细胞计数
- D: 网织红细胞计数

答案：C

23. 对地高辛中毒出现异位心律者可静脉注射

- A: 氯化钾、葡萄糖注射液
- B: 利尿剂
- C: 阿托品
- D: 苯妥英钠

答案：D

24. 属于超长效胰岛素/胰岛素类似物的是

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 门冬胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 甘精胰岛素

答案：D

25. 与避孕药合用，可能导致避孕失败的药物不包括

- A: 环孢素
- B: 苯巴比妥
- C: 利福平
- D: 四环素

答案：A

26. 司坦唑醇的禁忌证不包括

- A: 男性乳腺癌
- B: 肾炎
- C: 严重心功能不全
- D: 前列腺增生

答案：C

27. 青霉素常见的不良反应

- A: 细胞缺氧、酸中毒、休克
- B: 过敏反应
- C: 锥体外系反应
- D: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

答案：B

28. 吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是强的松龙的

- A: 100 倍
- B: 25 倍
- C: 40 倍
- D: 15 倍

答案：D

29. 需要嚼碎服用的药品是

- A: 胰酶肠溶片
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 乳酸菌素片
- D: 泮托拉唑肠溶片

答案：C

30. （2021 年真题）患者，男，65 岁。患有 2 型糖尿病，长期服用降糖药，同时长期服用阿司匹林肠溶片（100mg/d）预防心脑血管疾病。近期拟行髌关节置换手术，为减少出血风险，宜采取的措施是（）。

- A: 停用阿司匹林 7-10 天后，再行手术
- B: 无需停用阿司匹林，在手术日加用维生素 K1 预防出血
- C: 停用阿司匹林 3 天后，再行手术
- D: 无需停用阿司匹林，也无需加用其他药物预防出血

答案：A

31. 抑制碳酸酐酶，利尿作用弱的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 乙酰唑胺

答案：D

32. 与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

- A: 利福平
- B: 四环素
- C: 环孢素
- D: 苯巴比妥

答案：C

33. 下列唯一被批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂是

- A: 依折麦布
- B: 非诺贝特
- C: 盐酸
- D: 瑞舒伐他汀

答案：A

34. 控制哮喘急性发作的首选药是

- A: M 胆碱受体阻断剂
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: β 受体激动剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：C

35. 属于促血小板生成药的是

- A: 氨甲环酸
- B: 甲萘氢醌
- C: 艾曲泊帕乙醇胺
- D: 酚磺乙胺

答案：C

36. 西沙必利的典型不良反应是

- A: 恶心、呕吐
- B: Q-T 间期延长
- C: 肝肾功能损害
- D: 嗜睡、倦怠等锥体外系反应

答案：B

37. 患者女性，40 岁，上呼吸道感染服用磺胺嘧啶。

- A: 碳酸氢钠
- B: 维生素 C
- C: 维生素 B
- D: 碳酸钙

答案：A

38. 普萘洛尔

- A: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成
- B: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌
- C: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧
- D: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

答案：D

39.（2016 年真题）抗乙型肝炎病毒的药品是

- A: 奥司他韦
- B: 伊曲康唑
- C: 利巴韦林
- D: 拉米夫定

答案：D

40. 口服可用于肠道感染的药物是

- A: 妥布霉素
- B: 庆大霉素
- C: 链霉素
- D: 奈替米星

答案：B

41. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 蔗糖铁
- B: 琥珀酸亚铁
- C: 硫酸亚铁
- D: 叶酸

答案：A

42. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年，体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。

- A: 血钙
- B: 血钠

C: 血钾

D: 血氯

答案: C

43. 对于吗啡药动学特点的表述，错误的是

A: 口服不易吸收

B: 大部分经肝脏代谢、经肾排泄

C: 可通过胎盘屏障

D: 皮下注射吸收快

答案: A

44. 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

A: 硝酸甘油

B: 利多卡因

C: 美托洛尔

D: 索他洛尔

答案: B

45. 磺胺类药物应用于新生儿会导致

A: 血小板减少

B: 黄疸

C: 静脉炎

D: 腹部不适

答案: B

46. 肝素过量所致出血的解救药物是()

A: 蛇毒血凝酶

B: 鱼精蛋白

C: 酚磺乙胺

D: 维生素 K

答案: B

47. 典型失神性发作（小发作）首选（）。

A: 苯妥莫钠

B: 奥卡西平

C: 乙琥胺

D: 氯巴占

答案: C

48. 皮肤念珠菌病可选用（）

A: 酮康唑

B: 林旦霜

C: 阿达帕林

D: 维 A 酸

答案: A

49. 联合应用可使部分患者血压升高的药物是

A: 磷霉素氨丁三醇

B: 利奈唑胺+哌替啶

C: 利奈唑胺+苯丙醇胺

D: 磷霉素钠+万古霉素

答案: C

50. （2015 年真题）用于低分子肝素过量时解救的药品是（）。

A: 维生素 K1

B: 鱼精蛋白

C: 酚磺乙胺

D: 氨甲环酸

答案: B

51. 下述关于甘油的描述，错误的是

A: 妊娠期妇女慎用

B: 属于渗透性泻药

C: 属于润滑性泻药

D: 用于便秘的治疗

答案: B

52. (2017 年真题) 具有留钾作用的利尿药是 ()

A: 去氨加压素

B: 甘露醇

C: 甘油果糖

D: 螺内酯

答案: D

53. 下列药物中，不能增强他莫昔芬活性和疗效的是

A: 甲氨蝶呤

B: 氟尿嘧啶

C: 长春新碱

D: 西咪替丁

答案: D

54. 选择性 COX-2 抑制剂引起心脑血管不良反应的机制是

A: 抑制前列腺素的生成，使血栓素升高，促进血栓形成

B: 促进 TXA₂ 的合成，促进血小板聚集

C: 降低腺苷环化酶的活性，促进血小板聚集

D: 负性肌力作用，造成心衰

答案：A

55. 适用于心功能比较稳定的 II～III 级心力衰竭患者的药物是

A: 氯沙坦

B: 维拉帕米

C: 多巴酚丁胺

D: 卡维地洛

答案：D

56. (2015 年真题) 属于糖皮质激素禁忌症的是 ()。

A: 过敏性皮炎

B: 严重高血压

C: 再生障碍性贫血

D: 类风湿性关节炎

答案：B

57. 四环素的抗菌作用机制 ()

A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性

B: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

C: 影响胞浆膜通透性

D: 作用于细菌 70S 核糖体的 50S 亚基，抑制转肽酶

答案：B

58. 用于先兆性流产和习惯性流产

A: 米非司酮

B: 黄体酮

C: 雷洛昔分

D: 地塞米松

答案: B

59. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

A: 宜在餐后或餐时服用

B: 铁剂不应与浓茶同服，浓茶含有的鞣酸可与铁形成沉淀，使铁剂的吸收减少

C: 进食可促进铁剂的吸收

D: 治疗期间应定期检查血象和血清铁水平

答案: C

60. 对耐氯喹的恶性疟虫株，首选

A: 乙胺嘧啶+磺胺药

B: 咯萘啶或甲氟喹

C: 氯喹+伯氨喹

D: 静脉滴注奎宁

答案: B

61. 与硝酸酯类药物联合应用发生严重低血压的药物是

A: 坎利酮

B: 去甲肾上腺素

C: 西地那非

D: 丙酸睾酮

答案: C

62. (2016 年真题) 属于长效 β_2 受体激动剂的平喘

- A: 沙美特罗
- B: 布地奈德
- C: 多索茶碱
- D: 沙丁胺醇

答案：A

63. 关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述错误的是()

- A: 利妥昔单抗主要用于淋巴瘤的治疗
- B: 静脉滴注可致过敏样反应
- C: 贝伐珠单抗作用于血管内皮生长因子
- D: 对癌细胞和正常体细胞都有"杀灭"作用

答案：D

64. 能进入含有结核杆菌的巨噬细胞中, 渗入结核菌体, 在菌体内特定酶的作用下化, 且在酸性环境中作用更强的抗结核药物是()

- A: 吡嗪酰胺
- B: 链霉素
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：A

65. 可用于治疗厌氧菌感染和阴道滴虫病的药物是()

- A: 甲硝唑
- B: 喹诺酮类
- C: 四环素
- D: 苯唑西林

答案：A

66. 氨基糖苷类作用机制

- A: 抑制细菌蛋白质合成
- B: 干扰细菌核酸代谢
- C: 抑制细菌糖代谢
- D: 抑制细菌细胞壁合成

答案：A

67. 患者，女，55 岁，晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院。查体：138/90mmHg，心率 120 次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 长期应用者突然停药可发生反跳现象
- B: 老年高血压患者一般首选 β 受体阻断剂
- C: 作为一级预防，降低心肌梗死死亡率
- D: 糖脂代谢异常时首选 β 受体阻断剂

答案：A

68. 头孢克洛不宜用于

- A: 呼吸道感染
- B: 脑膜炎
- C: 中耳炎
- D: 泌尿系统感染

答案：B

69. 糖尿病患者应慎用的高效能利尿剂是()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 阿米洛利
- C: 呋塞米
- D: 乙酰唑胺

答案：C

70. 应用硝普钠时的注意事项及用药监护不包括

- A: 血硫氰酸盐水平
- B: 避光使用
- C: 监测血压
- D: 缓慢静注

答案：D

71. (2019 年真题) 患者，女，52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日 1 次，每次 2mg。

- A: 血脂异常
- B: 血栓性静脉炎
- C: 骨质疏松症
- D: 泌尿系统感染

答案：B

72. 防止急性血栓的首选药物是

- A: 维生素 B
- B: 香豆素类
- C: 维生素 K
- D: 肝素

答案：D

73. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗

。

- A: 短期口服给药
- B: 注射与口服并用
- C: 长期口服给药
- D: 注射给药

答案：A

74. 关于法莫替丁用药注意事项的说法，错误的是

- A: 肾功能不全患者需要减少给药剂量或延长给药间隔
- B: 与西咪替丁相比，对性激素的影响较轻
- C: 以原形从肾脏排泄，肾功能不全患者易造成药物在体内蓄积
- D: 抑制肝脏细胞色素 P450 酶的活性，从而影响茶碱、华法林、地西泮等药物的代谢

答案：D

75. 维生素 B1 缺乏时引起()

- A: 脚气病
- B: 坏血病
- C: 角膜软化症
- D: 成人佝偻病

答案：A

76. (2016 年真题) 脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是

- A: 佐匹克隆
- B: 阿普唑仑

C: 异戊巴比妥

D: 地西泮

答案: C

77. 主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

A: 阿德福韦酯

B: 更昔洛韦

C: 拉米夫定

D: 利巴韦林

答案: D

78. 血钾升高至

A: 大于 $172 \mu\text{mol/L}$

B: 大于 $265 \mu\text{mol/L}$

C: 大于 $7 \mu\text{mol/L}$

D: 大于 6mmol/L

答案: D

79. 关于哌替啶下列说法错误的是

A: 未明确诊断的疼痛，可以使用本品

B: 产妇分娩镇痛时及哺乳期间用量酌减

C: 本品与芬太尼可交叉过敏

D: 本品务必在单胺氧化酶抑制剂停用 14 日以上方可给药

答案: A

80. 与链激酶、尿激酶联用溶栓治疗，可增加疗效，且不显著增加严重出血发生率的是

A: 华法林

- B: 肝素
- C: 阿司匹林
- D: 低分子肝素

答案：C

81. 通过激动胰高血糖素样肽-1 受体降低血糖的药物

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 胰岛素皮下注射
- C: 艾塞那肽
- D: 二甲双胍

答案：C

82. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 替米沙坦
- C: 埃索美拉唑钠
- D: 美托洛尔

答案：A

83. 作用于远曲小管近端的中效利尿药是

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 乙酰唑胺
- D: 氨苯蝶啶

答案：B

84. 与 HIV-1 的逆转录酶直接结合并通过破坏该酶的催化位点来阻断 RNA 依赖和 DNA 依赖的 DNA 聚合酶的活性的是

- A: 蛋白酶抑制剂
- B: 整合酶抑制剂
- C: 非核苷类反转录酶抑制药
- D: 核苷类反转录酶抑制药

答案：C

85. 疗效优于乙琥胺，但因有肝毒性，仅在癫痫小发作合并大发作时应用的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠
- D: 卡马西平

答案：C

86. 体内缺乏维生素 B1 会导致

- A: 脚气病
- B: 脂溢性皮炎
- C: 贫血
- D: 不孕症

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/758003075056007024>