

云南急诊科模拟题 2021 年(112)

(总分 95. XX02,考试时间 120 分钟)

A1/A2 题型

1. 血清中抗线粒体抗体阳性多见于
 - A. 病毒性肝炎肝硬化
 - B. 酒精性肝硬化
 - C. 血吸虫病性肝纤维化
 - D. 原发性胆汁性肝硬化
 - E. 瘀血性肝硬化
2. 晚期肝硬化最常见的死亡原因是
 - A. 上消化道出血
 - B. 感染
 - C. 肝性昏迷
 - D. 原发性肝癌
 - E. 肝肾综合征
3. 一般认为，酒精性肝硬化摄入乙醇量至少要达到
 - A. 平均每日摄入乙醇 80g 达 10 年以上
 - B. 平均每日摄入乙醇 100g 达 10 年以上
 - C. 平均每日摄入乙醇 80g 达 15 年以上
 - D. 平均每日摄入乙醇 50g 达 10 年以上
 - E. 平均每日摄入乙醇 50g 达 15 年以上
4. 门静脉高压症大出血的特点是
 - A. 发生急，来势猛，迅速导致休克
 - B. 发生急，出血量不大
 - C. 右上腹绞痛后黑便
 - D. 剧烈呕吐、呕血及黑便
 - E. 只有便血，无呕血
5. 减少肝性脑病患者肠道有毒物质的产生，首选的抗菌药物是
 - A. 青霉素
 - B. 氯霉素
 - C. 新霉素
 - D. 磺胺嘧啶
 - E. 黄连素
6. 对肝性脑病的诊断及预后有价值的检查是
 - A. 腹部超声
 - B. 肝功能检查

- C. 血氨检查
 - D. 脑电图
 - E. 血清电解质
7. AFP检测的临床意义不正确的是
- A. AFP>500ng/ml 对肝细胞癌有诊断意义
 - B. 原发性胆管细胞癌不升高
 - C. 病毒性肝炎偶可升高
 - D. AFP 阳性即可诊断原发性肝癌
 - E. 继发性肝癌一般不升高
8. 细菌性肝脓肿最常见原因是
- A. 坏疽性阑尾炎
 - B. 肝开放性损伤
 - C. 溃疡病穿孔
 - D. 胆道化脓性感染
 - E. 膈下脓肿
9. 治疗慢性萎缩性胃炎通常不宜选用的药物是
- A. 甲硝唑
 - B. 呋喃唑酮
 - C. 胶体铋
 - D. 洛塞克
 - E. 吗丁啉
10. 诊断慢性胃炎最可靠的依据是()
- A. 胃酸降低
 - B. 慢性上腹部疼痛
 - C. X线钡餐检查
 - D. 胃脱落细胞检查
 - E. 胃镜检查及胃黏膜活检
11. 对胃癌引起的大出血, 其处理是
- A. 胃大部切除术
 - B. 胃大部切除术+迷走神经切断术
 - C. 选择性迷走神经切除术+幽门成形术
 - D. 全胃切除术
 - E. 内科保守治疗
12. 食管胃底静脉曲张破裂大出血时, 首先采取的治疗措施是
- A. 紧急三腔二囊管压迫止血
 - B. 急诊断流手术
 - C. 急诊分流手术
 - D. 急诊贲门周围血管离断术
 - E. 内科保守治疗
13. 上消化道大出血休克时, 首选的紧急治疗措施是
- A. 放置胃管注入止血药
 - B. 平卧位下肢抬高并予吸氧
 - C. 紧急经纤维内镜止血
 - D. 积极补充血容量

- E. 静脉应用止血药
14. 关于食管癌的组织学分类，绝大多数属于
- A. 未分化癌
 - B. 腺癌
 - C. 腺鳞癌
 - D. 鳞状细胞癌
 - E. 肉瘤
15. 中期食管癌手术切除范围应距癌瘤
- A. 2cm
 - B. 2~3cm
 - C. 3~5cm
 - D. 5cm 以上
 - E. 7cm 以上
16. 吞咽困难的病人除食管癌外尚应考虑
- A. 幽门闭塞
 - B. 贲门失弛症
 - C. 食管炎
 - D. 食管静脉曲张
 - E. 食管憩室
17. 早期食管癌的病变范围，是()
- A. 限于黏膜层
 - B. 其他器官转移
 - C. 远处淋巴能够转移
 - D. 侵入或侵透肌层
 - E. 病变长度超过 5cm
18. 肝性脑病昏迷期哪项不正确()
- A. 可有抽搐
 - B. 昏迷
 - C. 扑翼样震颤阳性
 - D. 脑电图异常
 - E. 反射可消失
19. 常伴皮肤瘙痒的肝硬化是
- A. 小结节性肝硬化
 - B. 大结节性肝硬化
 - C. 淤血性肝硬化
 - D. 原发性胆汁性肝硬化
 - E. 日本血吸虫性肝硬化
20. 肝硬化患者肝肾综合征的发生是由于
- A. 肾单位纤维化
 - B. 肾皮质坏死
 - C. 肾髓质坏死
 - D. 功能性的损害
 - E. 胆红素对肾脏的毒性作用
21. 肝硬化患者突然出现剧烈腹痛，发热，腹水迅速增加，脾增大，最大可能的并发症是

- A. 肝破裂
 - B. 原发性腹膜炎
 - C. 门静脉血栓形成
 - D. 肝肾综合征
 - E. 胃肠穿孔
22. 外科治疗门静脉高压症的重点是
- A. 提高抵抗力
 - B. 止血和预防食管胃底曲张静脉再出血
 - C. 改善肝功能
 - D. 消除腹水
 - E. 防治肝昏迷
23. 肝性脑病时，对抗假性介质最好的药物是
- A. 精氨酸
 - B. 氯化钾
 - C. 谷氨酸
 - D. 氯酯醒
 - E. 左旋多巴
24. 我国原发性肝癌的最主要原因是
- A. 黄曲霉素
 - B. 酒精性肝硬化
 - C. 血色病
 - D. 丙型肝炎
 - E. 乙型肝炎
25. 对疑有早期原发性肝癌的患者，应首先用哪一种方法检查较好
- A. 同位素肝扫描
 - B. 血清甲胎蛋白动态观察检查
 - C. 肝区超声波检查
 - D. 血清 γ 谷氨酰转肽酶
 - E. 选择性肝动脉造影
26. 对细菌性肝脓肿的诊断下列无价值的是
- A. 多有胆道化脓性感染和全身化脓性感染史
 - B. 起病急、中毒症状重、白细胞显著增高
 - C. 肝区疼痛、肝肿大伴压痛
 - D. X线检查示右膈升高、运动受限
 - E. 血常规提示淋巴细胞为主
27. 某患者近期发现肝大(肋下 4cm)，质硬，有大小不等的结节，伴低热、纳差、轻度黄疸，HBsAg(+)，ALT40U / L，AFP800ng / ml。最可能的诊断是
- A. 急性黄疸性肝炎
 - B. 慢性活动性肝炎
 - C. 大结节性肝硬化
 - D. 原发性肝癌
 - E. 胆汁性肝硬化
28. 关于慢性胃炎，不正确的是
- A. 引起恶性贫血

- B. 消化道症状多见
 - C. 可同时存在胃溃疡
 - D. 血清壁细胞抗体多为阴性
 - E. 常有幽门螺杆菌感染
29. 引起上消化道大出血最常见的原因是
- A. 胃十二指肠溃疡
 - B. 门静脉高压症
 - C. 出血性胃炎
 - D. 肝肿瘤
 - E. 胃癌
30. 患者消化道大出血，收缩压降至 70~90mmHg，脉率增至 130 次 / 分，表示出血量约达全身总血量的
- A. 15%
 - B. 20%
 - C. 25%
 - D. 30%
 - E. 35%
31. 胃、十二指肠溃疡出血的主要症状、体征是
- A. 上腹部疼痛加剧
 - B. 上腹部可有明显压痛
 - C. 移动性浊音阳性
 - D. 肠鸣音减少或消失
 - E. 以上都不是
32. 消化性溃疡合并出血时，下列止血治疗措施中最有效的是
- A. 生理盐水冲洗胃腔
 - B. 静脉注射奥美拉唑
 - C. 静脉注射雷尼替丁
 - D. 口服凝血酶盐水溶液
 - E. 口服去甲肾上腺素盐水溶液
33. 下列哪项不是我国食管癌病理分级标准？
- A. 病变长度
 - B. 病变范围
 - C. 有无转移
 - D. 消瘦和贫血程度
 - E. 病理形态和病理切片
34. 食管癌早期诊断的主要依据不包括
- A. 与吞咽有关的症状
 - B. 食管脱落细胞检查
 - C. 钡餐 X 线食管检查
 - D. 纤维食管镜检查
 - E. 胸骨后压榨样疼痛
35. 全身情况尚好的上段食管癌病人伴有食管气管瘘者多采用
- A. 手术切除
 - B. 放射治疗

- C. 化学治疗
 - D. 手术切除加化学治疗
 - E. 化学治疗加免疫治疗
36. 食管癌早期诊断简易而有效的方法是()
- A. 食管镜检查
 - B. X线食管钡透
 - C. 带网气囊检查
 - D. 气管镜检查
 - E. 放射性核素扫描
37. 肝性脑病前驱期的临床表现有()
- A. 可有扑翼样震颤
 - B. 昏睡
 - C. 定向力减退
 - D. 脑电图异常
 - E. 计算力下降
38. 下列哪项不是诊断肝硬化的依据
- A. 发热，腹胀，乏力
 - B. 门脉高压的表现
 - C. 肝功能减退的临床表现
 - D. 肝活检有假小叶形成
 - E. 食管钡剂造影有食管静脉曲张
39. 对于难治性肝硬化腹水，较好的治疗方法是
- A. 大量利尿剂的应用
 - B. 多次放腹水，每次 6000ml 以上
 - C. 自家腹水经超滤浓缩回输体内
 - D. 加强保肝治疗
 - E. 反复输新鲜血
40. 门静脉与腔静脉间的交通支中最有临床意义的是
- A. 直肠下端肛管交通支
 - B. 胃底食管下段交通支
 - C. 腹膜后交通支
 - D. 腹壁交通支
 - E. 肝被膜交通支
41. 下列递质属于抑制性递质的是
- A. 多巴胺
 - B. 乙酰胆碱
 - C. 谷氨酸
 - D. 门冬氨酸
 - E. 苯乙醇胺
42. 原发性肝癌的病理学大体形态分型中，最常见的是
- A. 小癌型
 - B. 外生型
 - C. 块状（巨块）型
 - D. 弥漫型

E. 结节型

43. 临床疑诊患者为原发性肝癌，首选检查方法是

A. CT

B. 核磁共振

C. B超

D. 肝功能检查

E. 动脉造影

44. 对疑有肝脓肿时应首选

A. X线胸腹透

B. 肝超声检查

C. 静脉胆道造影

D. 肝功能造影

E. 诊断性肝穿刺

45. 男，53岁。肝硬化病史6年，近日出现腹痛、腹胀和低热，表情淡漠，嗜睡，诊断考虑为肝性脑病，对诊断帮助最大的体征是

A. 腹壁反射消失

B. 腱反射亢进

C. 肌阵挛

D. 扑翼样震颤

E. Babinski征阳性

46. 慢性胃炎活动期判定根据是()

A. 胃黏膜出血

B. 胃黏膜有糜烂

C. 胃黏膜中性粒细胞增多

D. 胃黏膜主要呈淋巴细胞、浆细胞浸润

E. 胃黏膜有过形成

47. 在成人，出现休克体征时的出血量占总循环血量的

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

E. 30%

48. 有关上消化道出血的急诊处理，下列错误的是

A. 放置胃管，以冰盐水洗胃

B. 应用抗酸药物

C. 应用止血药物

D. 输血、输液，积极纠正休克

E. 立即进行剖腹探查术

49. 十二指肠后壁溃疡大出血时，破损的血管为

A. 胃右动脉分支

B. 胃左动脉分支

C. 胰十二指肠下动脉

D. 胃十二指肠动脉或胰十二指肠上动脉

E. 以上都不是

50. 消化性溃疡大出血的特点，下列不正确的是
- A. 一定有黑便
 - B. 一定有呕血
 - C. 多数患者非手术治疗可止血
 - D. 临床表现取决于出血量和速度
 - E. 部分患者并没有溃疡病史
51. 下列哪项不属于早期食管癌的病理分型范畴
- A. 隐伏型
 - B. 溃疡型
 - C. 糜烂型
 - D. 斑块型
 - E. 乳头型
52. 下列哪项 X 线表现不能作为早期食管癌的诊断依据
- A. 局限性黏膜皱襞断裂
 - B. 黏膜呈串珠样改变
 - C. 局限性小的充盈缺损
 - D. 小的溃疡龛影
 - E. 局限性管壁僵硬
53. 诊断早期食管癌的主要辅助手段为不包括
- A. 食管吞稀钡 X 线双重对比造影
 - B. 带网气囊食管脱落细胞检查
 - C. 纤维食管镜检查
 - D. 超声内镜(EUS) 检查
 - E. 腹部 B 超
54. 较早出现食管阻塞的食管癌，病理类型常是()
- A. 蕈伞型
 - B. 硬化型
 - C. 溃疡型
 - D. 髓质型
 - E. 癌侵及周围组织
55. 预后最差的肝性脑病患者是()
- A. 诱因明确，且易消除者
 - B. 暴发性肝炎所致者
 - C. 肝硬化伴腹水者
 - D. 肝硬化伴黄疸者
 - E. 肝硬化伴自发性腹膜炎者
56. 肝硬化的重要实验室诊断依据是
- A. ALT 升高
 - B. 白蛋白下降及 A / G 比值倒置
 - C. 血糖减少
 - D. 胆红素增高
 - E. ALP 升高
57. 肝硬化腹水患者应用利尿剂，应首选
- A. 甘露醇

- B. 利尿酸钠
 - C. 速尿
 - D. 安体舒通
 - E. 双氢克尿噻
58. 门静脉的正常压力为
- A. 0.2~0.5kPa (2~5cmH₂O)
 - B. 0.6~1.2kPa (6~12cmH₂O)
 - C. 1.3~2.4kPa (13~24cmH₂O)
 - D. 2.5~3.9kPa (25~40cmH₂O)
 - E. 4.0~5.9kPa (40~60cmH₂O)
59. 机体清除氨的主要方式不包括
- A. 合成尿素
 - B. 合成谷氨酸和谷氨酰胺
 - C. 肾排泄
 - D. 肺部呼出
 - E. 皮肤蒸发
60. 下列何种因素引起的肝性脑病预后最好
- A. 腹水感染
 - B. 食管静脉曲张破裂出血
 - C. 择期门体静脉分流手术后、肝功能较好、进食高蛋白饮食引起者
 - D. 肝肾综合征
 - E. 重症肝炎有腹水患者
61. 原发性肝癌的发生与下列哪种因素有较密切的关系
- A. 饮酒
 - B. 营养不良
 - C. 肠道感染
 - D. 进食霉玉米
 - E. 寄生虫感染
62. 原发性肝癌与肝脓肿有鉴别意义的检查是
- A. 肝肿大程度
 - B. 肝区疼痛性质
 - C. 右膈升高情况
 - D. 甲胎蛋白测定
 - E. 肝功能检查
63. 男，45岁，饮酒20余年，3两白酒/日，查体肝肋下2.0cm，脾肋下5.0cm，化验外周血三系均减少，主要原因为
- A. 营养吸收障碍
 - B. 脾功能亢进
 - C. 骨髓合成抑制
 - D. 细菌感染，毒素作用
 - E. 消化道少量出血
64. 慢性胃炎最主要的随访措施是
- A. 血清胃泌素和抗壁细胞抗体测定
 - B. 胃液分析

- C. 钡餐检查
 - D. 大便隐血试验
 - E. 胃镜及胃黏膜活组织检查
65. 见于萎缩性胃炎和老年人的黏膜变化为()
- A. 中性粒细胞浸润
 - B. 假幽门腺化生
 - C. 肠型化生
 - D. 淋巴细胞浸润
 - E. 以上都不是
66. 上消化道大出血的临床表现中，呕血还是便血主要取决于
- A. 出血部位的高低
 - B. 血液在胃肠内的停滞时间
 - C. 肠蠕动的快慢
 - D. 出血速度和量
 - E. 凝血功能情况
67. 有关门静脉高压症，下列不正确的是
- A. 外科治疗的目的在于紧急制止食管胃底静脉曲张破裂导致的大出血
 - B. 食管胃底静脉曲张的患者不一定出血
 - C. 不宜行预防性手术
 - D. 门静脉高压症出血一定为食管胃底静脉曲张破裂
 - E. 肝功能 C 级患者宜采用非手术治疗
68. 胃十二指肠溃疡病出血的特点，错误的是
- A. 呕血前常有恶心
 - B. 量大的出血可解鲜血便
 - C. 短期内失血超过 800ml，可出现休克症状
 - D. 多数患者只有黑便而无呕血
 - E. 是上消化道大出血最常见的原因
69. 确定消化性溃疡出血不合适的方法是
- A. 查血常规
 - B. 钡餐透视
 - C. 便隐血试验
 - D. 急诊胃镜检查
 - E. 询问病史
70. 关于食管癌的普查，阳性率最高的检查是
- A. 食管钡餐
 - B. 食管镜及活组织检查
 - C. 套网细胞学检查
 - D. Lugol碘液染色
 - E. 胃镜
71. 食管癌发病率最高的部位是
- A. 颈段食管癌
 - B. 上段食管癌
 - C. 中段食管癌
 - D. 下段食管癌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758033003013007003>