

主治医师（皮肤与性病学）-综合练习(A型题 2)

1、结节性痒疹的皮损好发部位是

- A. 四肢屈侧
- B. 四肢伸侧
- C. 头面部
- D. 躯干
- E. 腰骶部

2、关于玫瑰糠疹，不正确的是

- A. 中青年好发
- B. 春秋季多见
- C. 皮疹一般呈向心性分布
- D. 发病后 1~3 个月不等，皮疹可自行消退
- E. 皮疹消退后常复发

3、同形反应可见于

- A. 湿疹
- B. 慢性单纯性苔藓
- C. 扁平苔藓
- D. 红皮病
- E. 多形红斑

4、关于多形红斑正确的是

- A. 发病突然，常有前驱症状
- B. 好发于成人
- C. 冬季多见
- D. 好发于四肢远端和面部
- E. 无自限性倾向

5、小棘苔藓的好发部位，包括

- A. 下肢
- B. 头皮
- C. 上臂屈侧
- D. 腋窝及臀部
- E. 跖部

6、急性痘疮样苔藓状糠疹的皮损特点不是

- A. 皮疹为多形性
- B. 有丘疹
- C. 脓疱疹
- D. 坏死
- E. 结痂鳞屑

7、关于寻常型银屑病正确的是

- A. 好发于四肢屈侧
- B. 头皮不出现
- C. 不易复发
- D. 不引起脱发
- E. 皮疹为多形性

8、关于脓疱型银屑病正确的是

- A. 不伴高热、寒战
- B. 皮疹不成批出现
- C. 四肢伸侧更易受累
- D. 脓疱可融合成脓湖
- E. 不会转化为红皮病

9、关于重症多形红斑，以下正确的是

- A. 低热
- B. 黏膜损害
- C. 蛋白尿
- D. 无肝功能异常
- E. 心电图异常

10、某男，46 岁。因“上感”口服阿莫西林 3 天后，颜面及四肢出

现水肿性红斑及水疱，呈”虹膜状”，口服扑尔敏无效，皮疹加重，躯体广泛水肿性暗红斑及水疱，睑结膜充血、口腔黏膜糜烂，伴高热、关节痛。此患者最可能的诊断是

- A. 天疱疮
- B. 大疱性类天疱疮
- C. 重症多形红斑
- D. 荨麻疹
- E. 离心性环形红斑

11、某女，32 岁。因躯体、四肢出现红色丘疹、斑丘疹及银白色鳞屑，伴瘙痒。口服泼尼松治疗 2 周停药后，全身皮肤突然出现急性炎症性红斑，表面为针头大小密集的脓疱，以四肢屈侧及腹股沟较重，伴全身不适、发热及关节疼痛，化验血常规白细胞升高。考虑

- A. 天疱疮
- B. 荨麻疹
- C. 脓疱型银屑病
- D. 寻常型银屑病
- E. 关节型银屑病

12、某男，26 岁。上感发热 1 周后，躯体四肢出现广泛散在红色丘疹、斑丘疹，表面有银白色鳞屑，刮去鳞屑呈半透明薄膜，再刮去薄膜出现小血点，自觉瘙痒，其母亲有同类病史。此患者首先应考虑

诊断是

- A. 湿疹
- B. 玫瑰糠疹
- C. 寻常型银屑病
- D. 毛发红糠疹
- E. 白色糠疹

13、某女，41 岁。双前臂屈侧出现皮疹半年，伴瘙痒，体检：双前臂屈侧可见散在红色、紫红色多角形扁平丘疹，表面覆白色角质薄膜，有蜡样光泽，口腔里黏膜可见乳白色网状白纹。最可能的诊断是

- A. 银屑病
- B. 副银屑病
- C. 扁平苔藓
- D. 麻疹
- E. 光泽苔藓

14、关于萎缩纹，不正确的是

- A. 由妊娠引起的又叫妊娠纹
- B. 迅速生长是本病的最常见原因
- C. 青春期可以发生
- D. 会自然消退
- E. 不可自愈

15、关于毛周角化病不正确的是

- A. 多见于儿童及青少年
- B. 好发于上臂外侧
- C. 冬重夏轻
- D. 自觉症状较重
- E. 一般无自觉症状

16、黑棘皮病最常见的临床类型是

- A. 良性黑棘皮病
- B. 肥胖性黑棘皮病
- C. 肢端黑棘皮病
- D. 恶性黑棘皮病
- E. 单侧性黑棘皮病

17、关于剥脱性角质松解症，正确的是

- A. 瘙痒明显
- B. 合并局部多汗
- C. 有渗出
- D. 有过敏史
- E. 好发于足底

18、以下不是结缔组织病的共同组织病理改变的是

- A. 黏液水肿
- B. 坏死性血管炎
- C. 纤维蛋白变性
- D. 颗粒层楔形增生
- E. 淋巴细胞浸润

19、以下关于环境因素对红斑狼疮发病的影响，不正确的是

- A. 寒冷可促使病情发展
- B. 外伤不会影响病情的发展
- C. 精神创伤可使病情恶化
- D. 日晒可使病情加剧
- E. 某些药物可诱发药物性红斑狼疮综合征

20、红斑狼疮的发病由Ⅱ型变态反应所致的是

- A. 浆膜炎
- B. 狼疮性肾炎
- C. 坏死性血管炎
- D. 白细胞减少
- E. 关节炎

21、以下人群为盘状红斑狼疮多发人群的是

- A. 20 岁以下的女性
- B. 20~40 岁的女性
- C. 20~40 岁的男性
- D. 40 岁以上的女性
- E. 40 岁以上的男性

22、播散型 DLE 发展为 SLE 的概率为

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 25%
- E. 30%

23、SLE 最常见的致死原因是

- A. 间质性肺炎
- B. 狼疮性脑病
- C. 严重继发感染
- D. 肾衰竭
- E. 心律失常

24、关于 SLE 心血管的损害，最常见的是

- A. 心律失常

- B. 心肌炎
- C. 静脉炎
- D. 心内膜炎
- E. 心包炎

25、SLE 的特征性抗体是

- A. 抗 Sm 抗体
- B. 抗 nRNP 抗体
- C. 抗 dsDNA 抗体
- D. 抗红细胞抗体
- E. 抗心磷脂抗体

26、SLE 中与活动性肾脏损害密切相关的抗体是

- A. ANA
- B. 抗 SSA/SSB 抗体
- C. 抗 dsDNA 抗体
- D. 抗心磷脂抗体
- E. 抗 RNP 抗体

27、SLE 患者具有诊断意义的 ANA 滴度为

- A. >1: 50
- B. >1: 60

C. >1: 70

D. >1: 80

E. >1: 90

28、SLE 患者出现抗 Sm 抗体阳性，提示伴有

A. 心脏损害

B. 肝脏损害

C. 肾脏损害

D. 关节损害

E. 呼吸系统损害

29、治疗盘状红斑狼疮的首选药物是

A. 糖皮质激素

B. 羟氯喹

C. 反应停

D. 硫唑嘌呤

E. 维 A 酸

30、狼疮带试验阳性，表示免疫球蛋白及补体沉积在

A. 表皮

B. 真皮浅层

C. 基底膜带

D. 真皮深层

E. 皮下脂肪层

31、1982 年 ARA 修订的 SLE11 项诊断标准中，可诊断 SLE 需同时或相继出现

A. 3 项

B. 4 项

C. 5 项

D. 6 项

E. 7 项

32、关于狼疮带试验，不正确的是

A. SLE 非曝光处外观正常皮肤可为阳性

B. SCLE 只在皮损处出现阳性

C. DLE 只有在皮损处出现阳性

D. SLE 非曝光处外观正常皮肤为阳性，预示有肾脏损害

E. SCLE 曝光处外观正常皮肤亦为阳性

33、治疗 SLE 的首选药物为

A. 环磷酰胺

B. 糖皮质激素

C. 环孢素

D. 硫唑嘌呤

E. 羟氯喹

34、红斑狼疮的病因和发病机制的说法不正确的是

A. 内分泌因素有关

B. 免疫反应异常有关

C. 环境因素有关

D. 药物因素有关

E. 与表观遗传学异常无关

35、关于大疱性红斑狼疮描述不正确的是

A. 为急性皮肤红斑狼疮的一种新亚型

B. 皮肤好发于曝光部位

C. 组织病理是表皮下水疱

D. 免疫电镜是免疫球蛋白沉积在透明板

E. 患者对氨苯砒治疗非常敏感

36、新生儿 SLE 的血清学标志抗体是

A. 抗 Sm 抗体

B. 抗 RNP 抗体

C. 抗 Scl-70 抗体

D. 抗 PCNA 抗体

E. 抗 Ro/SSA 抗体

37、Stevens-Johnson 综合征，一般系药物过敏的所致。损害较严重的部位不包括

- A. 内脏
- B. 口腔
- C. 呼吸道
- D. 消化道
- E. 关节

38、离心性环状红斑的好发部位是

- A. 躯干
- B. 手足
- C. 小腿
- D. 上肢
- E. 躯干和四肢近端

39、慢性单纯性苔藓皮损的最好发部位是

- A. 眼睑
- B. 手部
- C. 四肢
- D. 躯干

E. 手背

40、多形红斑的特征性皮损是

A. 风团样红斑

B. 虹膜样红斑

C. 鳞屑性红斑

D. 环状红斑

E. 地图状红斑

41、关于多形红斑，以下不正确的是

A. 发病突然，无前驱症状

B. 好发于儿童和青年

C. 春秋季节多见

D. 好发于四肢远端和面部

E. 有自限性倾向

42、重症多形红斑以下不正确的是

A. 高热

B. 黏膜损害

C. 蛋白尿

D. 肝功能异常

E. 心电图异常

43、多形红斑好发的季节是

- A. 冬季
- B. 夏季
- C. 冬春季
- D. 春秋季节
- E. 夏秋季

44、对于红斑-丘疹型多形红斑，以下不正确的是

- A. 全身症状轻微
- B. 多有关节疼痛
- C. 好发于四肢远端
- D. 皮疹红斑表面可有大量厚积鳞屑
- E. 皮疹呈多形性

45、下面对于重症多形红斑的治疗不正确的是

- A. 注意水、电解质平衡
- B. 加强营养
- C. 防止眼部并发症
- D. 合并感染时给予抗生素
- E. 病情控制后立即停用糖皮质激素

46、对重症多形红斑的治疗应首选

- A. 10%小片糖酸皂
- B. 维生素 C
- C. 糖皮质激素
- D. 抗组胺剂
- E. 硫代硫酸钠针剂

47、关于重症多形红斑（Steven-Johnson 综合征）的特点不正确的是

- A. 全身症状严重
- B. 有严重黏膜损害
- C. 肾受损出现蛋白尿、血尿
- D. 肝功能异常
- E. 不会并发坏死性胰腺炎

48、多形红斑出现水疱主要发生在

- A. 表皮细胞上层水疱
- B. 表皮细胞中层水疱
- C. 表皮细胞下层水疱
- D. 真皮细胞层
- E. 真皮乳头层

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758040140137006132>