

北京住院医师儿外科 I 阶段《小儿骨科必看题库知识点》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题: 男性, 10 岁, 外伤后左膝附近肿胀, 剧痛, 体温达 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$, 经大剂量抗生素应用 3 天, 效果不明显。体检: 急性病容, 左大腿下段及膝关节肿胀明显, 发红, 皮温高, 压痛明显, 左膝活动受限, X 线平片骨质未见破坏, 血白细胞 $19\times 10^9/\text{L}$, 中性 89%, 最佳处理 ()。A. 全身支持疗法
B. 反复关节穿刺及腔内抗生素注射
C. 股骨下端切开引流
D. 止痛药物应用
E. 血液细菌培养
- 2、单项选择题: 初步诊断新生儿臂丛神经损伤的方法是 () I E. 斜骨折
- 5、单项选择题: 在一个两部门经济中, 已知消费函数为 $0=100+0.8y$, 投资 $I=300$ 亿元, 则均衡的国民收入为 () 亿元。A. 2000
B. 1000
C. 1200
D. 2400
- 6、单项选择题: 一矿工因矿山倒塌, 右上肢被压于矿石下 2 小时, 出现右手垂腕垂指, 虎口处感觉减退, 电生理检查正常, 诊断为桡神经损伤, 其损伤类型为 ()。A. 神经断裂
B. 神经失用
C. 神经刺激
D. 神经挫伤
E. 轴突断裂
- 7、单项选择题: 股骨颈骨折愈合过程中不出现外骨痂的原因 ()。A. 股骨颈无骨内膜
B. 股骨颈无骨外膜
C. 股骨颈骨折后血肿太多
D. 股骨颈血液供应差
E. 复位困难, 反复整复
- 8、单项选择题: 某人在车祸中造成左小腿中下段外伤, 疼痛、流血、异常活动, 被人简单包扎后立即送到附近医院, 经检查发现小腿中下段胫腓骨骨折, 诊断小腿中下段开放性骨折。如果此人伤口 1cm, 为骨折断端刺破皮肤短斜行骨折, 正确的最简单的处理方法是 ()。A. 清创后按照闭合骨折处理, 石膏固定
B. 清创钢板固定
C. 清创交锁髓内针固定
D. 清创后外固定架固定

E. 清创后小夹板固定

9、单项选择题：最常见的关节脱位是（ ）。A. 肩关节

B. 肘关节

C. 髋关节

D. 膝关节

E. 腕关节

10、单项选择题：男，18岁，前一日不慎跌倒，右肩部肿胀疼痛，活动受限，锁骨中段有畸形，可触及骨折端。下列措施哪项合适（ ）。A. 手法复位横8字石膏绷带固定

B. 手法复位横8字绷带胶布固定

C. 密切观察血管、神经症状

D. 维持挺胸垂肩位

E. 卧位应取仰卧位

11、单项选择题：男，15岁，跑动中摔倒，手掌着地，感肘部剧痛，不能屈伸，尚可旋转，检查：肘部肿胀畸形，弹性固定于半伸位。最可能诊断是（ ）。A. 肘部软组织扭伤

B. 肘关节后脱位

C. 肱骨髁上骨折

D. 上尺桡关节脱位

E. 桡骨小头脱位

12、单项选择题：第7、8胸椎结核病灶清除术后，恢复工作已一年，近3个月来又出现背痛、乏力、盗汗、低热和双下肢无力症状，查体第7、8胸椎局部有明显叩击痛，双下肢肌力三级，巴彬斯基征（+），血沉增快，最适当的治疗措施是（ ）。A. 非手术治疗，卧石膏床

B. 以非手术治疗为主，必要时行病灶清除术

C. 在抗结核药物保护下尽早行病灶清除术

D. 急症病灶清除术

E. 后路植骨融合术

13、单项选择题：发生筋膜间隙综合征的主要原因是（ ）。A. 主要神经损伤

B. 肌肉痉挛

C. 筋膜间隙内高压

D. 病变以下血供受阻

E. 静脉血栓

14、单项选择题：右下肢被机动车轧伤，具备下列哪项可以诊断为骨折（ ）。A. 局部高度肿胀

B. 压痛明显

C. 下肢不能自主活动

D. 骨摩擦音

E. 明显跛行

15、单项选择题：一患者因重物击中头部出现颈部僵硬，为明确有无寰椎椎弓骨折，拟行X线检查，以下检查中能够明确诊断的是（ ）。A. 正位片

B. 侧位片

C. 斜位片

D. 开口位片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758041022015006063>