

前置胎盘查房






contents

目录

- 前置胎盘概述
- 前置胎盘的危害
- 前置胎盘的治疗
- 前置胎盘的预防与护理
- 前置胎盘的案例分享




01

前置胎盘概述



定义与分类



定义

前置胎盘是指胎盘位于子宫前壁或子宫颈口前方，通常在妊娠晚期或分娩时出现出血等症状。



分类

根据胎盘覆盖子宫颈内口的程度，前置胎盘可分为完全性、部分性和边缘性前置胎盘。




病因与发病机制

病因

前置胎盘的病因尚不完全清楚，可能与子宫内膜病变、损伤或受精卵着床异常有关。

发病机制

受精卵着床于子宫下段或子宫颈口附近时，可能因子宫内膜病变或损伤而异常发育，导致胎盘位置异常。




●●●●● 临床表现与诊断标准


临床表现

前置胎盘的典型症状包括妊娠晚期或分娩时无痛性阴道出血、子宫异常增大、胎位异常等。

诊断标准


通过超声检查可确诊前置胎盘，并可了解胎盘覆盖子宫颈内口的程度。同时，医生会结合孕妇的病史、临床表现和相关检查结果进行综合诊断。





02

前置胎盤的危險





对母体的影响



产后出血




前置胎盘可能导致子宫收缩不良，引发产后出血，严重时可能危及生命。



产褥感染



前置胎盘产妇在分娩过程中，由于胎盘附着于子宫下段，细菌易侵入，增加产褥感染的风险。



子宫切除



对于部分前置胎盘或凶险性前置胎盘，可能因无法控制的大出血而需行子宫切除。




对胎儿的影响



早产

前置胎盘可能导致子宫收缩，引发早产。



胎儿生长受限

前置胎盘可能影响胎儿的血液供应，导致胎儿生长受限。



胎儿死亡

在严重的情况下，前置胎盘可能导致胎儿死亡。



并发症的风险

产后出血

前置胎盘可能导致子宫收缩不良，引发产后出血。



需要输血


部分前置胎盘产妇在分娩过程中可能因出血过多需要输血。



产褥感染


前置胎盘产妇在分娩过程中，由于胎盘附着于子宫下段，细菌易侵入，增加产褥感染的风险。





03

前置胎盘的治疗



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758075024100006043>