

煤矿职业卫生题库（40）

制定部门：某某单位

时间：202X年 X月 X日

煤矿职业卫生题库（40）

安全事关每个家庭的幸福，熟悉安全操作规程，掌握安全技术措施，制定安全计划方案，做好单位安全培训，加强安全知识学习及考试更是预防和杜绝安全事故的重要方式和手段。[您浏览的《煤矿职业卫生题库\(40\)》](#)

正文如下：

1. 判断题

劳动者健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

√

×

答案为：√

2. 判断题

对于确诊的尘肺病人，企业有权一次买断并与其解除劳动合同。

√

×

答案为：×

3. 判断题

用人单位有权与疑似职业病人单方面解除劳动合同。

√

×

答案为：×

4. 判断题

煤矿作业地点噪声的测定，每个监测点选择3个测点，取平均值。

√

×

答案为：√

5. 判断题

用人单位应当按照规定,在必要时对工作场所进行职业病危害因素检测评价。

√

×

答案为：×

6. 判断题

职业病的分类和目录由卫生行政部门制定、调整并公布。

√

×

答案为：√

7. 判断题

劳动防护用品分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品。

√

×

答案为：√

8. 判断题

重症中暑会产生热痉挛、腹痛、高热昏厥、昏迷、虚脱或休克现象。

√

×

答案为：√

9. 判断题

30Hz 以下低频率、大振幅、冲击力强的振动会引起骨、关节的损害。

√

×

答案为：×

10. 判断题

地面气温周期性变化，使矿井进风路线上的气温也相应地周期性变化。

√

×

答案为：√

11. 判断题

在一般情况下，中央式通风系统的降温效果要比对角式的好。

√

×

答案为：×

12. 判断题

噪声对听觉系统的损害，一般经历从生理变化到病理改变的过程。即先出现暂时性听阈位移，经过一段时间逐渐成为永久性听阈位移。

√

×

答案为：√

13. 判断题

目前我国职业病发病率最高的是噪声聋。

√

×

答案为：×

14. 判断题

无论是戴耳塞还是耳罩，均应在进入有噪声作业点戴好，工作中如果不舒服可以摘下。

√

×

答案为：×

15. 判断题

围岩有严重吸水膨胀性质，注水后易造成顶板垮塌或者底板变形；地质情况复杂、顶板破坏严重，注水后影响采煤安全的煤层可以不用采取煤层注水防尘措施。

√

×

答案为：√

16. 判断题

井工煤矿炮采工作面应当采用湿式钻眼、冲洗煤壁、水炮泥、出煤洒水等综合防尘措施。

√

×

答案为：√

17. 判断题

液压支架和放顶煤工作面的放煤口，必须安装喷雾装置，降柱、移架或者放煤时同步喷雾。

√

×

答案为：√

18. 判断题

井工煤矿采煤工作面回风巷应当安设风流净化水幕。

√

×

答案为：√

19. 判断题

井工煤矿掘进井巷和硐室时，必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。

√

×

答案为：√

20. 判断题

煤矿职业卫生题库（40）

井下煤仓(溜煤眼)放煤口、输送机转载点和卸载点,以及地面筛分厂、破碎车间、带式输送机走廊、转载点等地点,必须安设喷雾装置或者除尘器,作业时进行喷雾降尘或者用除尘器除尘。

√

×

答案为: √

21. 判断题

喷射混凝土时,应当采用潮喷或者湿喷工艺,并配备除尘装置对上料口、余气口除尘。距离喷浆作业点下风流 100m 内,应当设置风流净化水幕。

√

×

答案为: √

22. 判断题

用人单位应当如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料

√

×

答案为：√

23. 判断题

对接触职业病危害的劳动者，煤矿应当按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由煤矿承担。

√

×

答案为：√

24. 判断题

用人单位订立或者变更劳动合同时，必须告知劳动者工作岗位的职业病危害真实情况。

√

×

答案为：√

25. 判断题

煤矿井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口以及地面带式输送机走廊必须安设喷雾装置或者除尘器，作业时进行喷雾降尘或者用除尘器除尘。

√

×

答案为：√

26. 判断题

井工煤矿的所有煤层必须进行煤层注水可注性测试。

√

×

答案为：√

27. 判断题

井工煤矿转载点应当采用自动喷雾降尘(喷雾压力应当大于 0.7MPa)或者密闭尘源除尘器抽尘净化等措施。

√

×

答案为：√

28. 判断题

露天煤矿对运输路面经常清理浮尘、洒水,加强维护,保持路面平整。

√

×

答案为：√

29. 判断题

煤矿粉尘是煤矿生产过程中随着煤、岩石被破碎而产生的煤、岩石和其他物质细微颗粒的总称。

√

×

答案为：√

30. 判断题

煤尘含二氧化硅成分较多，对人体危害大，因此掘进工人的尘肺病发病率比采煤工人高。

√

×

答案为：×

31. 判断题

粉尘的颗粒越小，对人体的伤害越小。

√

×

答案为：×

32. 判断题

粉尘附着于皮肤可能阻塞皮脂腺，容易继发感染而引起暴露性皮炎、毛囊炎等，进入眼内的粉尘颗粒，可引起结膜炎等。

√

×

答案为：√

33. 判断题

粉尘可促使外耳道形成耳垢栓塞，侵入鼻咽部的粉尘又能引起中耳炎、鼓膜炎和耳咽管炎等。

√

×

答案为：√

34. 判断题

接触粉尘和患有尘肺病是因果关系，因此所有接触粉尘的人员都会等尘肺病。

√

×

答案为：×

35. 判断题

胸痛是尘肺病人最常见的症状，几乎每个病人或轻或重均有胸痛。

√

×

答案为：√

36. 判断题

尘肺病除呼吸系统症状外，还常伴有消化功能减弱、食欲差、腹胀、大便秘结等。

√

×

答案为：√

37. 判断题

大量粉尘特别是含二氧化硅的粉尘吸入肺内，往往无法由呼吸道及时完全排除。

√

×

答案为：√

38. 判断题

早期尘肺病患者及时脱离粉尘作业，病情就不会继续发展了。

√

×

答案为：×

39. 判断题

对已患尘肺病的工人,并已脱离粉尘作业的工人可不必再进行尘肺病复查。

√

×

答案为：×

40. 判断题

矿井要求所有接触粉尘作业人员必须佩戴防尘口罩。

√

×

答案为：√

41. 判断题

自吸式防尘口罩使用前,要检查口罩整体和零部件是否完整良好,如不符合标准要求,必须更换。

√

×

答案为：√

42. 判断题

使用后的防尘口罩要清洗干净，特别是简易型口罩，更要勤洗。

√

×

答案为：√

43. 判断题

粉尘作业禁忌症是指患有某些疾病的人，接触粉尘作业时可能使其原有病情加重，或因对某种职业性危害因素敏感而容易发生职业病，致使一些人不适合参加接触粉尘作业的疾病或生理状态。

√

×

答案为：√

44. 判断题

接尘作业工人上岗前职业健康检查的检查项目有：职业史、自觉症状及既往病史、结核病接触史、一般临床检查、拍摄胸大片以及必要的其他检查。

√

×

答案为：√

45. 判断题

煤矿企业对检查出的尘肺病患者，必须按国家规定及时给予治疗、疗养和调离接尘作业岗位，并做好职业健康监护及职业病报告工作。

√

×

答案为：√

46. 判断题

呈气体、蒸汽、气溶胶(粉尘、烟、雾)状态的毒物均可经呼吸道进入人体。

√

×

答案为：√

47. 判断题

患有高血压、心脏病、高度近视等病症以及其他不适应高空(2m 以上)作业者,不得从事高空作业。

√

×

答案为：√

48. 判断题

建设单位应当优先采用成熟的工艺、技术、设备和材料，尽量避免采用新技术、新工艺、新设备和新材料

√

×

答案为：×

49. 判断题

建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

√

×

答案为：√

50. 判断题

用人单位应当依照法律、法规要求，严格遵守国家职业卫生标准，落实职业病预防措施，从源头上控制和消除职业病危害。

√

×

答案为：√

51. 单选题

《煤矿作业场所职业病危害防治规定》：接触煤尘(以煤尘为主)的在岗人员每()检查1次。

A. 1 年

B. 2 年

C.3 年

答案为：B

52. 单选题

《煤矿作业场所职业病危害防治规定》：接触煤尘(以煤尘为主)的观察对象、I期煤工尘肺患者每()检查1次。

A.1 年

B.2 年

C.3 年

答案为：A

53. 单选题

《煤矿作业场所职业病危害防治规定》：接触岩尘(以岩尘为主)的在岗人员、观察对象、I期煤工尘肺患者每()检查1次。

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

答案为：A

54. 单选题

《煤矿作业场所职业病危害防治规定》：煤尘中游离二氧化硅含量 < 10%，总粉尘时间加权平均允许浓度为() mg/m^3 ；。

A. 2

B. 2.5

C. 4

答案为：C

55. 单选题

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/765030042233011113>