

2021-2022 年河北省衡水市全科医学（中级）专业知识

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(30 题)

1.目前对肾盂鹿角状结石的最佳治疗方法是

A.ESWL B.经皮肾镜碎石术 C.膀胱镜下经皮肾镜碎石术 D.经肾盂切开取石术 E.患肾切除术

2.不良反应会出现口干、口中金属味的药物是()。

A.甲硝唑 B.肠虫清 C.吡喹酮 D.氯硝柳胺

3.隐性黄疸时，血清总胆红素含量为

A.1.71 ~ 3.42 μ mol/L

B.5.13 ~ 6.84 μ mol/L

C.8.55 ~ 15.4 μ mol/L

D.17.1 ~ 34.2 μ mol/L

E.73.4 μ mol/L

4.对于间质性肾炎，最有价值的诊断检查手段是

A.肾组织学检查 B.尿沉渣检查 C.肾小球滤过功能检查 D.血、尿白细胞分类检查 E.肾小管功能检查

5.患者男性，67岁。2年前被诊断有扩张型心肌病，长期服用地高辛治疗，近一周出现喘憋加重，不能平卧，双下肢水肿，最需要增加的药物是

A.ACEI B.螺内酯 C.B受体阻断剂 D.利尿剂 E.洋地黄

6.下列有关胸外心脏按压的叙述错误的是

A.平卧硬板床 B.在胸骨中下1/3处按压 C.按压次数每分钟80~100次
D.按压时双肘伸直 E.按压时使胸骨下陷5~6cm

7.患者，男性，63岁。近半年来常有不明原因的低热，37.5℃左右，未诊治。因1周前有一次无痛性肉眼血尿前来就诊。BP170/100mmHg，查体未发现异常。查血红蛋白97g/L，尿常规(一)。其最可能的病因是

A.肾小球肾炎 B.肾病综合征 C.肾细胞癌 D.肾盂癌 E.原发性高血压

8.霍乱的发病机制中，起主要作用的是

A.侵袭力 B.肠毒素 C.神经节苷脂 D.内毒素 E.cAMP

9.棕红色胶冻样痰主要见于

A.肺脓肿 B.肺炎克雷伯杆菌肺炎 C.支气管哮喘 D.肺炎球菌肺炎 E.大叶性肺炎

10.敌敌畏中毒者

A.A.酒味 B.肝臭味 C.烂苹果味 D.大蒜味 E.氨味

11.骨折的治疗最正确的原则是

A.骨与软组织并重复位 B.一般要求解剖复位 C.坚持固定与活动相结合 D.复位、固定和功能锻炼 E.局部与全身治疗兼顾

12.关于预防急性肾小球肾炎的健康指导不包括下列哪项

A.平素注意锻炼身体，提高机体免疫力
B.防治中耳炎、化脓性扁桃体炎及皮肤脓疱病
C.预防上呼吸道感染
D.一旦罹患上呼吸道感染，立即使用抗菌药物
E.扁桃体肿大且感染灶持续存在者，可行扁桃体摘除

13.变异型心绞痛时下列哪种药物最有效

A. β 受体阻滞药 B.钙离子拮抗药 C. α 受体阻滞药 D.血管紧张素转化酶抑制药 E.镇静药

14.过敏性紫癜与特发性血小板减少性紫癜鉴别的关键点是

A.发病年龄与性别不同 B.紫癜的部位、性质与特点不同 C.并发症不同
D.出、凝血的功能状态不同 E.血小板计数结果不同

15.尿毒症患者高血压最主要的原因是

A.肾素增多 B.促红素减少 C.水钠潴留 D.血管加压素增多 E.

交感神经兴奋

16.肝性脑病患者的饮食治疗不恰当的是

A.高热能 B.高碳水化合物 C.高蛋白质 D.高维生素 E.不能进食可鼻饲或静滴葡萄糖

17.男性，60岁，突然觉头痛、头晕伴恶心、呕吐，测血压为240/140mmHg，该病例的急救措施为

A.立即应用镇静药物 B.立即应用止吐药物 C.口服降压药 D.硝普钠静滴 E.立即应用抑制胃酸分泌药物

18.男性，30岁，10年来阵发性心悸，每次心悸突然发作，持续半小时至3小时不等，此次发作持续半小时而来就诊。检查：血压90/

60mmHg，心率200次/分，心律绝对规则，无杂音，肺(-)

估计此次心律失常最可能的是

A.A:2:1心房扑动 B.阵发性室性心动过速 C.窦性心动过速 D.阵发性室上性心动过速 E.心房纤颤

19.上述病例最可能的诊断是

A.A.复合性溃疡 B.胃窦癌伴幽门梗阻 C.神经性呕吐 D.胆汁反流性胃炎 E.十二指肠溃疡伴幽门梗阻

20.慢性胰腺炎

- A.血淀粉酶增高
- B.超声显像见胆囊和胆总管扩大
- C.胰腺假性囊肿伴钙化，血糖升高
- D.ERCP 示胆管系统狭窄而胰管正常
- E.黄疸伴肝功能试验异常

21.在常温下，机体散热的主要机制是

- A.辐射 B.蒸发 C.出汗 D.不感蒸发 E.传导

22.下列哪项不属于继发性肾病综合征

- A.狼疮性肾炎 B.过敏性紫癜性肾炎 C.糖尿病肾病 D.乙型肝炎病毒相关性肾炎 E.系膜增生性肾炎

23.病毒性心肌炎的表现是

- A.寒战，高热，呼吸困难，偶见心律失常
- B.剧烈胸痛，发热，心电图出现 Q 波，ST 段弓背向上抬高
- C.症状、体征无典型表现，主要依据血沉增快帮助诊断
- D.最先有低热，倦怠，与发热程度不平行的心动过速，各种心律失常
- E.发热，P-R 间期延长，血清抗"O"滴度增高(1：400)

24.磺脲类药物的主要副作用是

A.胃肠道反应 B.低血糖反应 C.肝功能损害 D.肾功能损害 E.粒细胞减少

25.异烟肼应该尽可能采用()。

A.口服法 B.皮下注射 C.静脉点滴 D.肌肉注射

26.下列不符合球后溃疡临床特点的是

A.内科治疗效果差 B.较易并发出血 C.夜间痛多见 D.溃疡位于十二指肠降部近端 E.多有背部放射痛

27.支气管哮喘急性发作期不推荐使用以下哪种治疗

A.短效 β_2 肾上腺素受体激动剂

B.长效 β_2 肾上腺素受体激动剂

C.糖皮质激素

D.吸入抗胆碱能药物

E.吸氧

28.按诊断标准，下列哪项不是诊断类风湿关节炎的必备关节表现

A.关节肿痛 \geq 6周 B.晨僵 C.关节畸形 D.腕、掌指、指间关节肿 E.对称性关节肿

29.老年男性，因冠心病服用阿司匹林后恶心，呕吐咖啡样物约300ml，排黑便200g，头晕心悸，无腹痛，查体：BP14/11kPa，P102次/分，心音低钝，心律齐，双肺呼吸音清，腹软，上腹正中压痛，无反跳痛，肝脾未触及。关于出血原因，最可能的诊断是

- A.消化性溃疡 B.食管静脉曲张破裂 C.胃癌 D.Mallory-Weiss 综合征
E.急性胃黏膜病变

30.患者男性，70岁。既往有高血压病病史，早上买菜时突然出现左侧偏盲，四肢活动自如，头颅CT示高密影，其诊断为

- A.顶叶梗死 B.枕叶出血 C.壳核梗塞 D.壳核出血 E.颞叶出血

二、专业知识(10题)

31.(90~92题共用备选答案) 胃溃疡的腹痛规律

- A.无明显规律性 B.疼痛一排便一加重 C.疼痛一进食一缓解 D.疼痛一便意一缓解 E.进食一疼痛一缓解

32.(85~86题共用备选答案)

85. 抗胆碱能药物

- A.安坦 B.金刚烷胺 C.左旋多巴 D.心得安 E.溴隐亭

33.胸膜炎引起的胸痛特点是

- A.灼热痛 B.胸侧部痛 C.胸骨后痛 D.仰卧位减轻 E.运动时减轻

34.男性，50岁，气短进行性加重1年，刺激性干咳3个月入院。体检：心肺无阳性征。X线胸片显示双肺纹理增多呈网状。肺功能测定：肺活量降低，一秒用力呼气容积(FEV₁)正常，肺弥散量降低。本例最可能的诊断为

A.支气管肺癌 B.弥漫性肺间质纤维化 C.支气管哮喘 D.支气管内膜结核 E.慢性支气管炎

35.美托洛尔的主要作用是

A.解除冠状动脉痉挛，抗血小板凝聚，改善冠脉供血和微循环灌注
B.降低心脏后负荷，减少心肌氧耗
C.扩张冠状动脉及外周静脉，降低心脏前负荷，减少心肌氧耗
D.减弱心肌收缩力，减慢心率，减少心肌氧耗
E.使钾离子进入细胞内，促进细胞膜极化状态的恢复

36.AMI病人半夜突然出现呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，第一心音减弱，舒张期奔马律，心尖可闻及2级收缩期杂音，该患者诊断为

A.右心衰竭 B.室壁瘤 C.急性左心衰竭 D.支气管肺炎 E.心肌梗死后综合征

37.对于患者目前出现的水肿和心力衰竭，下列哪项措施可暂不考虑

A.抗生素控制感染 B.氨茶碱解痉 C.西地兰强心 D.酚妥拉明静脉滴注
E.氢氯噻嗪利尿

38.慢粒最突出的体征为

A.贫血貌 B.浅表淋巴结肿大 C.皮肤瘀斑 D.脾肿大 E.绿色瘤

39.溃疡性结肠炎的腹痛规律

A.无明显规律性 B.疼痛一排便一加重 C.疼痛一进食一缓解 D.疼痛一便意一缓解 E.进食一疼痛一缓解

40.假设：心电图示 QRS 波群宽 $0.14 \sim 0.16$ 秒，起始部粗钝，R—R 间期绝对不等，此时心律失常最大可能是

A.预激综合征伴心房纤颤 B.阵发性室性心动过速 C.心房纤颤伴室内差异性传导 D.心房纤颤伴束支传导阻滞 E.室上速伴差异性传导

三、共用题干单选题(5 题)

41.(题干)男性，患者，50 岁。患糖尿病患者 10 年。一直用胰岛素治疗。今晨皮下注射胰岛素后未进食便外出活动，因突然晕倒被他人送入急诊室。应首先考虑为

A.脑出血 B.糖尿病酮症酸中毒 C.高渗性昏迷 D.乳酸酸中毒 E.低血糖昏迷

42.(题干)患者男性，64 岁。有长期酗酒史，因肝硬化多次住院。此次因消瘦明显，肝区隐痛 2 周伴腹水和黄疸再次入院。查体：T 36.1°C ，脉搏 92 次/分，呼吸 26 次/分，血压 140/80mmHg。根据其病史，他的实

实验室检查结果可能有

A.血钾增高 B.血氨降低 C.凝血时间延长 D.SGPT 水平降低 E.白细胞增高

43.对该患者治疗时手术切除的范围应包括

- A.单纯右肾切除术
- B.有肾肿瘤剝除术
- C.右肾部分切除术
- D.右侧肾脏、右侧全长输尿管及部分膀胱
- E.右侧肾脏、肾周脂肪囊，肾门淋巴结及部分输尿管

44.用于监测病情、反映近 8~12 周血糖水平的检查是

- A.24h 尿糖定量检查 B.空腹血糖测定 C.糖化血红蛋白(GHb)测定 D.尿酮体测定 E.口服葡萄糖耐量试验(OGTT)

45.(题干)患者，女，25 岁。10 分钟前家属发现患者在家中意识不清，四肢强直性痉挛，伴呼吸困难。体格检查：昏迷，瞳孔缩小，流涎，多汗，呼吸急速，两肺布满湿啰音，心率减慢，呼气有刺激性大蒜味。对该患者立即处理的措施是

- A.阿托品 1mg 静脉注射
- B.1%亚甲蓝 10ml 静脉注射
- C.20%甘露醇滴注
- D.维生素 K1 10mg 静脉注射

E.阿托品 10mg 静脉注射

参考答案

1.C 肾盂鹿角状结石是最难治疗的泌尿系结石，目前随着新技术的出现，琰灏亿结合经皮肾镜碎石治疗已经取代了以往的经肾窦切开取石手术。具体方法是先行经皮肾镜碎石、取石治疗，对经皮肾镜不能粉碎和不能取出的结石再行体外震波碎石治疗。现在用于经皮肾镜碎石的器械有钬激光碎石、弹道碎石和超声波碎石等。

2.A

3.D 黄疸是指血中胆红素浓度增高，导致巩膜、黏膜、皮肤及体液发生黄染的现象。血清胆红素浓度为 $17.1 \sim 34.2 \mu\text{mol} / \text{L}$ 时，肉眼看不出黄疸，称隐性黄疸。

4.A

5.D 失代偿期需要先利尿和强心治疗。

6.C 2015 版心肺复苏指南建议每分钟按压速率 $100 \sim 120$ 次/min，按压深度至少 5cm，但不超过 6cm。

7.C 老年男性，无痛性肉眼血尿首先考虑为泌尿系肿瘤，结合患者同时伴有发热、高血压和贫血，这些都是肾癌的“肾外临床表现”。故选择答案 C。

8.B

人体经口感染的霍乱弧菌在胃酸分泌减少或被高度稀释，或因入侵的弧菌数量较多时，未被胃酸杀灭的霍乱弧菌进入小肠，黏附于肠黏膜表面，迅速大量繁殖，产生外毒素性质的霍乱肠毒素，激活细胞环磷酸腺苷(cAMP)介质系统，引起肠液过度分泌，形成本病特征性的水样腹泻。

9.B 肺炎克雷伯杆菌肺炎时典型患者咳砖红色胶冻样痰。

10.D

敌敌畏中毒患者可呼出刺激性大蒜味。

11.D 闭合性骨折的治疗原则包括复位、固定和功能锻炼三个基本环节，并坚持固定与活动相结合、骨与软组织并重、局部与全身治疗兼顾、医疗措施与患者主动配合等观点。

12.D

13.B

B。钙离子拮抗剂能有效减轻心绞痛的症状，降低心绞痛的发生率，为变异型心绞痛的首选药物。

14.E 特发性血小板减少性紫癜血小板计数明显减少，而过敏性紫癜血小板计数正常。

15.C

16.C 高蛋白饮食可诱发肝性脑病，严重的肝性脑病患者应严格限制甚至停止蛋白摄入。饮食以碳水化合物为主以保证热能供给，如稀饭、面条、藕粉等。

17.D 高血压急症是指短时期内血压重度升高，舒张压 $>130\text{mmHg}$ 和(或)收缩压 $>200\text{mmHg}$ ，伴有重要器官如心脏、脑、肾脏、眼底、大动脉的严重功能障碍或不可逆性损害。应及时处理高血压急症，迅速降低血压，

采用静脉途径给药。

18.D

可采用排除法。2:1 心房扑动心室率通常在 150 次/分左右；窦性心动过速常见于正常人活动或情绪激动时，较少引起血压下降；阵发性室性心动过速发作时间短于 30 秒；心房纤颤心室率绝对不规则。

19.E

幽门梗阻主要是消化性溃疡的主要并发症之一，表现为呕吐大量发酵宿食，特征性体征有：空腹时上腹部饱胀、逆蠕动的胃型及上腹部振水声。患者符合上述表现。

20.C

21.A 解析：参阅[2002N012]。类似的题如[1993N083、84]。

22.E

23.D 轻者可无症状，或仅有心悸、胸闷、乏力、纳差等症状，大多心率增快而与体温升高不相称，也有少数心动过缓；重者可有心力衰竭、心律失常、心源性休克甚至猝死。

24.A 磺脲类药物是口服降糖药，主要副作用是胃肠道反应，故餐后服用。

25.A

26.D 球后溃疡一般指位于十二指肠降部近端的溃疡。

27.B

长效 β_2 肾上腺素受体激动剂起效慢，不宜在短时间内重复使用。

28.C 目前国际及国内诊断类风湿关节炎均广泛采用美国风湿病学会 1987 年的分类标准。在该标准的 7 条中，不包括关节畸形。

29.E

患者呕吐咖啡样物、黑便，诊断为上消化道出血，出血原因为药物(肠溶阿司匹林)引起的急性胃黏膜病变。

30.B 枕叶主要与视觉有关。头颅 CT 为高密影，选择答案为 B。

31.E 胃溃疡疼痛常在餐后 1 小时内发生，经 1~2 小时后逐渐缓解，在下次餐前自行消失，下次进餐后再复出现上述节律，呈“进食—疼痛—缓解”特点。

32.A

33.B

34.B 弥漫性肺间质纤维化的临床表现主要是渐进性劳力性气促，胸片显示双肺弥漫的网格状或网格小结节状浸润影，肺功能表现为进行性限制性通气功能障碍和弥散量减少。

35.D 美托洛尔属于 β 受体阻滞剂，通过阻断拟交感胺类对心率和心收缩力受体的刺激作用，减慢心率、降低血压，减低心肌收缩力和氧耗量。

36.CAMI 患者由于心脏病变引起心排血量显著、急骤降低导致组织器官灌注不足和急性肺淤血，称为急性心衰，临床表现为突发呼吸困难，大汗、烦躁，咳粉红色泡沫痰等，听诊第一心音减弱，同时有舒张早期第三心音而构成奔马律，肺动脉瓣第二心音亢进。

37.C 呼吸衰竭的治疗原则为纠正缺氧，改善通气，纠正水、电解质和酸碱失衡及病因治疗等综合疗法。慢性呼吸衰竭诱发右心衰竭时，可小量、短期、间歇应用利尿剂。强心剂的使用应慎重，因疗效不佳，易发生副作用。

38.D 脾肿大是慢性粒细胞白血病(慢粒)最突出的体征之一，多在早期即可触及，往往就医时已达脐平面，甚至可达盆腔，质中，有切迹。脾大常与白细胞数成正比，脾梗死时有剧烈腹痛及脾压痛。

39.D

溃疡性结肠炎多为左下腹或下腹的阵痛，亦可涉及全腹。有腹痛一便意一便后缓解的规律，常有里急后重。

40.A 预激综合征心电图典型表现为 PR 间期短于 0.12s，某些导联 QRS 波群超过 0.12s，QRS 波群起始部分粗钝；结合患者 R—R 间期绝对不等，判断患者为预激综合征合并房颤。

41.E

42.C 肝硬化时肝脏合成凝血酶原 II、VII、IX、X 减少。凝血时间延长，出现出血倾向。

43.E 肾癌标准的手术是根治性肾脏切除术，其手术切除范围是 E 项。D 项是肾盂癌的手术切除范围。该患者的肿瘤直径是 4~5cm，不适合行单纯右肾切除术、右肾肿瘤剜除术和右肾部分切除术。肾肿瘤剜除术和肾部分切除术的适应证之一是肿瘤直径一般在 4cm 以下。

44.C

45.E 该患者是重度急性有机磷农药中毒，对该患者立即处理的措施是阿托品首剂 5~10mg 静脉注射。

2021-2022 年河北省衡水市全科医学（中级）专业知识

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(30 题)

1.目前对肾盂鹿角状结石的最佳治疗方法是

A.ESWL B.经皮肾镜碎石术 C.琺瑯几士经皮肾镜碎石术 D.经肾盂切开取石术 E.患肾切除术

2.不良反应会出现口干、口中金属味的药物是()。

A.甲硝唑 B.肠虫清 C.吡喹酮 D.氯硝柳胺

3.隐性黄疸时，血清总胆红素含量为

A.1.71 ~ 3.42 μ mol/L

B.5.13 ~ 6.84 μ mol/L

C.8.55 ~ 15.4 μ mol/L

D.17.1 ~ 34.2 μ mol/L

E.73.4 μ mol/L

4.对于间质性肾炎，最有价值的诊断检查手段是

A.肾组织学检查 B.尿沉渣检查 C.肾小球滤过功能检查 D.血、尿白细胞分类检查 E.肾小管功能检查

5.患者男性，67岁。2年前被诊断有扩张型心肌病，长期服用地高辛治疗，近一周出现喘憋加重，不能平卧，双下肢水肿，最需要增加的药物是

A.ACEI B.螺内酯 C. β 受体阻断剂 D.利尿剂 E.洋地黄

6.下列有关胸外心脏按压的叙述错误的是

A.平卧硬板床 B.在胸骨中下1/3处按压 C.按压次数每分钟80~100次
D.按压时双肘伸直 E.按压时使胸骨下陷5~6cm

7.患者，男性，63岁。近半年来常有不明原因的低热，37.5℃左右，未诊治。因1周前有一次无痛性肉眼血尿前来就诊。BP170/100mmHg，查体未发现异常。查血红蛋白97g/L，尿常规(一)。其最可能的病因是

A.肾小球肾炎 B.肾病综合征 C.肾细胞癌 D.肾盂癌 E.原发性高血压

8.霍乱的发病机制中，起主要作用的是

A.侵袭力 B.肠毒素 C.神经节苷脂 D.内毒素 E.cAMP

9.棕红色胶冻样痰主要见于

A.肺脓肿 B.肺炎克雷伯杆菌肺炎 C.支气管哮喘 D.肺炎球菌肺炎 E.大叶性肺炎

10.敌敌畏中毒者

A.酒味 B.肝臭味 C.烂苹果味 D.大蒜味 E.氨味

11.骨折的治疗最正确的原则是

A.骨与软组织并重复位 B.一般要求解剖复位 C.坚持固定与活动相结合 D.复位、固定和功能锻炼 E.局部与全身治疗兼顾

12.关于预防急性肾小球肾炎的健康指导不包括下列哪项

A.平素注意锻炼身体，提高机体免疫力

B.防治中耳炎、化脓性扁桃体炎及皮肤脓疱病

C.预防上呼吸道感染

D.一旦罹患上呼吸道感染，立即使用抗菌药物

E.扁桃体肿大且感染灶持续存在者，可行扁桃体摘除

13.变异型心绞痛时下列哪种药物最有效

A. β 受体阻滞药 B.钙离子拮抗药 C. α 受体阻滞药 D.血管紧张素转化酶抑制药 E.镇静药

14.过敏性紫癜与特发性血小板减少性紫癜鉴别的关键点是

A.发病年龄与性别不同 B.紫癜的部位、性质与特点不同 C.并发症不同
D.出、凝血的功能状态不同 E.血小板计数结果不同

15.尿毒症患者高血压最主要的原因是

A.肾素增多 B.促红素减少 C.水钠潴留 D.血管加压素增多 E.交感神经兴奋

16.肝性脑病患者的饮食治疗不恰当的是

A.高热能 B.高碳水化合物 C.高蛋白质 D.高维生素 E.不能进食可鼻饲或静滴葡萄糖

17.男性，60岁，突然觉头痛、头晕伴恶心、呕吐，测血压为240/140mmHg，该病例的急救措施为

A.立即应用镇静药物 B.立即应用止吐药物 C.口服降压药 D.硝普钠静

滴 E.立即应用抑制胃酸分泌药物

18.男性，30岁，10年来阵发性心悸，每次心悸突然发作，持续半小时至3小时不等，此次发作持续半小时而来就诊。检查：血压90/60mmHg，心率200次/分，心律绝对规则，无杂音，肺(-)

估计此次心律失常最可能的是

A.A.2:1 心房扑动 B.阵发性室性心动过速 C.窦性心动过速 D.阵发性室上性心动过速 E.心房纤颤

19.上述病例最可能的诊断是

A.A.复合性溃疡 B.胃窦癌伴幽门梗阻 C.神经性呕吐 D.胆汁反流性胃炎 E.十二指肠溃疡伴幽门梗阻

20.慢性胰腺炎

A.血淀粉酶增高
B.超声显像见胆囊和胆总管扩大
C.胰腺假性囊肿伴钙化，血糖升高
D.ERCP 示胆管系统狭窄而胰管正常
E.黄疸伴肝功能试验异常

21.在常温下，机体散热的主要机制是

A.辐射 B.蒸发 C.出汗 D.不感蒸发 E.传导

22.下列哪项不属于继发性肾病综合征

A.狼疮性肾炎 B.过敏性紫癜性肾炎 C.糖尿病肾病 D.乙型肝炎病毒相关性肾炎 E.系膜增生性肾炎

23.病毒性心肌炎的表现是

A.寒战，高热，呼吸困难，偶见心律失常
B.剧烈胸痛，发热，心电图出现Q波，ST段弓背向上抬高
C.症状、体征无典型表现，主要依据血沉增快帮助诊断
D.最先有低热，倦怠，与发热程度不平行的心动过速，各种心律失常
E.发热，P-R间期延长，血清抗"O"滴度增高(1:400)

24.磺脲类药物的主要副作用是

A.胃肠道反应 B.低血糖反应 C.肝功能损害 D.肾功能损害 E.粒细胞减少

25.异烟肼应该尽可能采用()。

A.口服法 B.皮下注射 C.静脉点滴 D.肌肉注射

26.下列不符合球后溃疡临床特点的是

A.内科治疗效果差 B.较易并发出血 C.夜间痛多见 D.溃疡位于十二指肠降部近端 E.多有背部放射痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/766215203224010125>