

2024 湖北省利川市《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题大全及完整答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 以下属于胰高糖素样肽-1 受体激动剂的是

- A: 二甲双胍
- B: 利拉鲁肽
- C: 吡格列酮
- D: 瑞格列奈

答案：B

2. 异烟肼的作用特点是

- A: 结核杆菌不易产生耐药性
- B: 只对细胞外的结核杆菌有效
- C: 对大多数革兰阴性菌有效
- D: 对细胞内外的结核杆菌均有效

答案：D

3. 下述利尿药中，可导致血钾升高的是()

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 乙酰唑胺
- D: 氨苯蝶啶

答案：D

4. 临床首选用于治疗土拉菌病和鼠疫的抗生素为()

- A: 异帕米星
- B: 链霉素
- C: 奈替米星
- D: 阿米卡星

答案：B

5. 格列齐特是

- A: α -葡萄糖苷酶抑制剂
- B: 磺酰脲类
- C: 中效类胰岛素
- D: 长效类胰岛素

答案：B

6. 以下不属于地西泮的药理作用的是

- A: 抗癫痫
- B: 抗惊厥
- C: 镇静催眠
- D: 抗抑郁

答案：D

7. 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年；心律失常病史 2 年长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是

- A: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎
- B: 可致甲状腺功能减退较为常见发病隐匿
- C: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在

D: 可致甲状腺功能亢进,同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

答案: C

8. (2020 年真题) 克罗米通乳膏用于治疗

A: 蛲虫感染

B: 寻常痤疮

C: 体、股癣

D: 疥疮

答案: D

9. 曲霉菌主要通过呼吸道侵入机体, 主要侵犯()

A: 心脏

B: 脑

C: 肺脏

D: 窦腔

答案: C

10. 关于莫西沙星作用特点的说法, 错误的是()

A: 莫西沙星抗菌谱广, 对常见革兰阴性及革兰阳性菌均具有良好抗菌活性

B: 莫西沙星属于浓度依赖型抗菌药物

C: 莫西沙星可经验性用于社区获得性肺炎的治疗

D: 莫西沙星组织分布广泛, 但不能透过血脑屏障

答案: D

11. 激动 I1 咪唑啉受体的降压药是

A: 可乐定

- B: 利血平
- C: 吡那地尔
- D: 胍屈嗪

答案：A

12. 黄体酮属于

- A: 雌激素
- B: 皮质激素
- C: 雄性激素
- D: 孕激素

答案：D

13. 属于黏痰溶解剂，适用于大量痰液堵塞气管导致呼吸困难的祛痰药物是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 溴己新
- C: 糜蛋白酶
- D: 氨溴索

答案：A

14. （2019 年真题）患者，女，32 岁，孕 2 周，既往有癫痫病史，长期服用卡马西平治疗，为防止引起新生儿出血，该患者妊娠晚期应当补充的维生素是（）

- A: 维生素 B12
- B: 维生素 K
- C: 维生素 D
- D: 叶酸

答案：B

15. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。关于万古霉素的儿童日剂量，正确的是（）

- A: 5mg/kg
- B: 40mg/kg
- C: 15mg/kg
- D: 60mg/kg

答案：B

16. 在动物试验中发现可引起幼龄动物软骨关节病变（损伤和水疱），儿童不推荐使用的药物是

- A: 红霉素眼膏
- B: 左氧氟沙星滴眼剂
- C: 阿托品滴眼剂
- D: 氯霉素眼膏

答案：B

17. 仅降低发热者体温，不降低正常体温，用于感冒发热的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 地西泮
- C: 氯丙嗪
- D: 硫喷妥钠

答案：A

18. 下列药物使用期间需要缓慢停药的是

- A: 比索洛尔

B: 氨氯地平

C: 地尔硫?

D: 依那普利

答案: A

19. 属于长效 β

A: 多索茶碱

B: 布地奈德

C: 沙丁胺醇

D: 沙美特罗

答案: D

20. 与柔红霉素合用，可能增加心脏毒性的是

A: 氧烯洛尔

B: 肝素

C: 放线菌素

D: 对乙酰氨基酚

答案: A

21. 噻嗪类利尿药发挥利尿作用的作用点是

A: Na^+-Cl^- 共转运子

B: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

C: 碳酸酐酶

D: 磷酸二酯酶

答案: A

22. 氯霉素抗菌谱广，而典型严重的不良反应是

A: 对造血系统的毒性

- B: 胃肠道反应
- C: 对肝脏严重损害
- D: 二重感染

答案：A

23. 对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是()

- A: 此类药物可降低 2 型糖尿病患者的餐前血糖
- B: 此类药物不能单独服用
- C: 此类药物需在餐前即刻服用
- D: 格列美脲属于本类药物

答案：C

24. (2017 年真题) 属于 DPP-4 抑制剂的药物是 ()

- A: 阿格列汀
- B: 利拉鲁肽
- C: 那格列奈
- D: 伏格列波糖

答案：A

25. (2021 年真题) 乙内酰脲类药通过减少钠离子内流而使神经细胞稳定，限制 Na⁺通道介导的发作性放电的扩散，属于该类的抗癫痫药物是 ()

- A: 左乙拉西坦
- B: 苯妥英钠
- C: 加巴喷丁
- D: 卡马西平

答案：B

26. 伴有糖尿病肾病的高血压患者应首选的降压药是

- A: 氯沙坦
- B: 吲达帕胺
- C: 氨氯地平
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

27. 普芦卡必利为泻药的作用机制是

- A: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快
- B: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用
- C: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性
- D: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便

答案：C

28. 细胞膜的重要组分，协调磷脂和细胞膜功能的是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 双环醇
- C: 异甘草酸镁
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：A

29. 下列对红霉素的说法错误的是()

- A: 容易透过血脑屏障
- B: 对革兰阳性菌作用强大
- C: 作用机制是抑制蛋白质合成
- D: 是治疗军团病的首选药

答案：A

30. 药粉误入眼内可能引起或加重窄角型青光眼、眼睛疼痛或不适、短暂视物模糊、视觉晕轮或彩色影像的是

- A: 沙丁胺醇
- B: 噻托溴铵
- C: 喷托维林
- D: 氨溴索

答案：B

31. 抑制胃酸分泌作用最强的是()

- A: 雷尼替丁
- B: 奥美拉唑
- C: 西咪替丁
- D: 法莫替丁

答案：B

32. (2020 年真题) 使用奥沙利铂后最需要关注的典型不良反应是

- A: 肾毒性
- B: 消化道反应
- C: 肝毒性
- D: 神经毒性

答案：D

33. 以下不属于强心苷的禁忌证的是()

- A: 梗阻性肥厚型心脏病
- B: 预激综合征伴心房颤动或扑动
- C: 慢性收缩性心力衰竭
- D: 室性心动过速、心室颤动

答案：C

34. 治疗重度消瘦营养不良的糖尿病的是

- A: A 和 B 均无效
- B: 胰岛素
- C: 磺酰脲类
- D: 二甲双胍

答案：B

35. 下述利尿药中，可导致血钾升高的是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 呋塞米
- D: 氨苯蝶啶

答案：D

36. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年，体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。

- A: 水肿
- B: 光过敏
- C: 干咳
- D: 低血糖

答案：C

37. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg / d 治疗。

A: Cr

B: CK

C: AST

D: BUN

答案：B

38. 延长动作电位时程的广谱抗心律失常药物是()

A: 美西律

B: 维拉帕米

C: 胺碘酮

D: 奎尼丁

答案：C

39. 中毒后可用维生素 B6 来对抗的抗结核药是

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 对氨基水杨酸

D: 异烟肼

答案：D

40. 治疗厌氧菌引起的严重感染最适合的是

A: 克林霉素

B: 万古霉素

C: 红霉素

D: 克拉霉素

答案：A

41. 用于甲型和乙型流感的治疗，应及早在流感开始的第 1 或第 2 天开始治疗的药物是

A: 膦甲酸钠

B: 奥司他韦

C: 两性霉素 B

D: 制霉菌素

答案：B

42. (2018 年真题) 用于治疗疥疮的药物有 ()

A: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏

B: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏

C: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

D: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏

答案：B

43. 抑制碳酸酐酶，利尿作用弱的药物是

A: 呋塞米

B: 氨苯蝶啶

C: 乙酰唑胺

D: 氢氯噻嗪

答案：C

44. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是

A: 硝苯地平

B: 普萘洛尔

C: 卡托普利

D: 氯沙坦

答案: D

45. (2021 年真题) 属于短效避孕药，但其埋植剂可作为长效避孕药使用的药物是 ()

A: 孕二烯酮

B: 氯地孕酮

C: 左炔诺孕酮

D: 去氧孕烯

答案: C

46. 某些慢性疾病使用地塞米松长期治疗，为减少外源性激素对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制，推荐给药时间是

A: 空腹

B: 上午 8 时左右

C: 中午 12 时左右

D: 下午 4 时左右

答案: B

47. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理检查结果为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常。化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

A: 与氯化钠和碱性溶液(特别是氟尿嘧啶)之间存在配伍禁忌

B: 应给予预防性或治疗性的止吐用药

C: 直肠癌的首选药之一

D: 其神经系统毒性与剂量大小无关

答案: D

48. 右美沙芬与吗氯贝胺合用会出现

- A: 反射亢进，异常发热、昏睡
- B: 精神症状
- C: 支气管平滑肌痉挛
- D: 中枢神经系统和呼吸系统抑制作用增强

答案：A

49. 下列关于奥沙利铂的描述，错误的是

- A: 与氯化钠和碱性溶液（特别是氟尿嘧啶）之间存在配伍禁忌
- B: 遇冷可加重奥沙利铂的神经毒性
- C: 应给予预防性或治疗性的止吐用药
- D: 其神经系统毒性与剂量大小无关

答案：D

50. 治疗阴道滴虫病的首选药是（）。

- A: 阿苯达唑
- B: 吡喹酮
- C: 甲硝唑
- D: 噻嘧啶

答案：C

51. 治疗立克次体感染所致斑疹伤寒应首选

- A: 四环素
- B: 庆大霉素
- C: 青霉素
- D: 链霉素

答案：A

52. 对合并有高氨血症的便秘患者,适宜使用的泻药是

- A: 硫酸镁
- B: 乳果糖
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 甘油

答案: B

53. (2015 年真题) 降糖作用迅速, 被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是 ()。

- A: 瑞格列奈
- B: 普萘洛尔
- C: 格列美脲
- D: 二甲双胍

答案: A

54. 利尿作用极弱, 具有降低眼内压作用, 可用于青光眼治疗的利尿剂是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 螺内酯
- D: 呋塞米

答案: A

55. 关于枸橼酸铋钾用药注意事项的说法, 错误的是

- A: 妊娠期妇女、肾功能不全者禁用
- B: 服药期间口中可能带有氨味并可使舌苔及大便灰黑色
- C: 如有服用左甲状腺素, 需间隔 2 小时服用
- D: 为了更好地保护胃黏膜, 可与牛奶同服

答案：D

56.（2015 年真题）静脉滴注速度过快可能发生“红人综合征”的药品是（）。

- A: 莫西沙星
- B: 磷霉素
- C: 夫西地酸
- D: 万古霉素

答案：D

57. 属于碳酸酐酶抑制剂的药物是

- A: 拉坦前列素
- B: 阿托品
- C: 乙酰唑胺
- D: 奥布卡因

答案：C

58. 属于碳酸酐酶抑制剂的药物是

- A: 布林佐胺
- B: 奥布卡因
- C: 拉坦前列素
- D: 阿托品

答案：A

59.（2016 年真题）对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 吲哚美辛
- C: 罗非昔布

D: 阿司匹林

答案: A

60. 临床常用，起效最快的硝酸酯类药物是

A: 戊四硝酸

B: 5-单硝酸异山梨酯

C: 硝酸甘油

D: 硝酸异山梨西旨

答案: C

61. 米索前列醇可以

A: 竞争性的拮抗组胺与胃壁细胞上的 H 受体结合，抑制基础胃酸分泌及由组胺和食物刺激后引起的胃酸分泌

B: 在胃内直接中和胃酸

C: 与前列腺素 E 受体结合，降低胃壁细胞的胃酸分泌

D: 抑制 H^+ ， K^+ -ATP 酶活性，使壁细胞内的 H^+ 不能转运到胃腔中，阻断了胃酸分泌的最后步骤

答案: C

62. 对地高辛中毒出现心动过缓者可静脉注射

A: 氯化钾、葡萄糖注射液

B: 苯妥英钠

C: 阿托品

D: 利尿剂

答案: C

63. 铁剂的适应证为

A: 恶性贫血

- B: 巨幼细胞贫血
- C: 缺铁性贫血
- D: 再生障碍性贫血

答案：C

64. 1~5 岁儿童甲状腺功能减退症，左甲状腺素每日完全替代剂量为

- A: $4\mu\text{g}/\text{kg}$
- B: $25\mu\text{g}$
- C: $6\mu\text{g}/\text{kg}$
- D: $5\mu\text{g}/\text{kg}$

答案：D

65. 伏格列波糖的降糖作用机制是

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶
- C: 直接补充胰岛素
- D: 提高靶组织对胰岛素的敏感性

答案：B

66. 下列属于窄谱抗菌药物的是

- A: 头孢唑啉
- B: 环丙沙星
- C: 阿莫西林
- D: 氨基曲南

答案：D

67. 属于胰岛素增敏剂的是

- A: 二甲双胍

B: 西格列汀

C: 罗格列酮

D: 阿卡波糖

答案: C

68. 同时有抗癫痫和抗心律失常作用的药物是

A: 苯巴比妥

B: 丙戊酸钠

C: 苯妥英钠

D: 乙琥胺

答案: C

69. 与克拉霉素和兰索拉唑联合治疗幽门螺杆菌感染的药物是

A: 庆大霉素

B: 羟氨苄青霉素

C: 大观霉素

D: 替考拉宁

答案: B

70. 长期服用可导致结肠黑变病的药物是

A: 聚乙二醇

B: 乳果糖

C: 液体石蜡

D: 番泻叶

答案: D

71. 适用于重症哮喘、慢性反复发作哮喘、激素依赖性哮喘的是

A: 孟鲁司特

B: 色甘酸钠

C: 吸入性糖皮质激素

D: 沙丁胺醇

答案: C

72. 以下关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是

A: 可杀灭痤疮丙酸杆菌

B: 为强还原剂，极易分解

C: 可导致皮肤干燥，脱屑

D: 可分解出新生态氧而发挥作用

答案: B

73. 下列头孢菌素药物中，半衰期最长的药物是

A: 头孢孟多

B: 头孢克洛

C: 头孢氨苄

D: 头孢曲松

答案: D

74. 维持心肌和神经肌肉的正常应激性，须静脉滴注给药的电解质是

A: 氯化钠

B: 氯化钾

C: 氯化钙

D: 硫酸镁

答案: B

75. 滴药过频易致反跳性鼻充血，久用可致药物性鼻炎

A: 硼酸

B: 过氧化氢

C: 羟甲唑啉

D: 克罗米通

答案：C

76. (2020 年真题) 消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

A: 泮托美辛

B: 阿司匹林

C: 对乙酰氨基酚

D: 塞来昔布

答案：D

77. 可引起脊髓水平镇痛、镇静和轻度呼吸抑制的受体是

A: $\mu 2$ 受体

B: δ 受体

C: $\mu 1$ 受体

D: K 受体

答案：D

78. 具有中枢和外周抗多巴胺双重作用的是

A: 莫沙必利

B: 西沙必利

C: 多潘立酮

D: 甲氧氯普胺

答案：D

79. 高效抑菌药是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 异烟肼
- C: 氯霉素
- D: 头孢菌素

答案：A

80. 硝酸甘油含服时应尽量采取的姿势为

- A: 立位
- B: 平卧位
- C: 坐位
- D: 侧卧位

答案：C

81. 需与氨基糖苷类联合应用治疗布鲁菌病和鼠疫的是

- A: 氯霉素
- B: 四环素
- C: 红霉素
- D: 青霉素

答案：B

82. 主要作用是抗部分革兰阴性杆菌和抗革兰阳性菌的青霉素是

- A: 阿莫西林
- B: 替莫西林
- C: 甲氧西林
- D: 哌拉西林

答案：A

83. 分泌盐皮质激素的是

- A: 束状带
- B: 球状带
- C: 束状带和网装带
- D: 网状带

答案：B

84. 葡萄球菌感染的角膜炎可选用

- A: 多黏菌素 B 滴眼液
- B: 金霉素眼膏
- C: 夫西地酸滴眼剂
- D: 1% 泼尼松滴眼液

答案：C

85. 患者，男，25 岁。上腹灼痛、反酸，疼痛多出现在早上 10 点及下午 4 点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X 线钡餐检查：十二指肠溃疡。

- A: 米索前列醇和四环素
- B: 兰索拉唑和阿莫西林
- C: 阿莫西林和四环素
- D: 哌仑西平和西咪替丁

答案：B

86. 下列关于抗酸剂的描述，正确的是()

- A: 氢氧化铝能直接中和胃酸，并被胃肠道吸收
- B: 抗酸剂可直接中和胃酸，升高胃内容物 pH
- C: 碳酸氢钠是非吸收性抗酸剂
- D: 常用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状及预防溃疡发生

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/767115151046010024>