

2024 年河北省肥乡县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库完美版

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 儿童 2 型糖尿病患者宜选用的药物是

- A: 格列喹酮
- B: 格列苯脲
- C: 二甲双胍
- D: 胰岛素

答案：C

2. 美国食品药品监督管理局(FDA)根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 卡马西平
- B: 红霉素
- C: 奥美拉唑
- D: 氯化钾

答案：B

3. 高血压患者的降压目标部分有糖尿病、蛋白尿等高危患者的高血压（）

- A: <140 / 90mmHg
- B: <120 / 80mmHg

C: <150 / 90mmHg

D: <130 / 80mmHg

答案：D

4. 治疗寻常痤疮给予锌

A: 日服 30~40mg

B: 日服 80mg

C: 日服 180mg

D: 日服 0.05mg

答案：A

5. 使患者可放心、不掩饰地提出问题的是

A: 位置标志明确

B: 环境舒适

C: 配备必备设备

D: 适当隐私

答案：D

6. 患者，女性，32 岁，咳嗽、有脓性痰，痰液色黄或黄白相间，右侧胸痛，吸气时明显。体检：体型胖，神志清，急性病容，无口唇发绀，呼吸急促，体温 39.3℃，心率 100 次/分，肺部可闻及湿性啰音，WBC $14 \times 10^9/L$ ，对青霉素类药物过敏。临床诊断为社区获得性肺炎。

A: 10 天

B: 5 天

C: 7 天

D: 3 天

答案：B

7. 发热的判断标准是指人体昼夜体温波动超过 1°C ，腋下温度超过

A: 37.6°C

B: 37.3°C

C: 37.0°C

D: 36.7°C

答案：C

8. 治疗肺炎的抗菌药物的疗程一般为

A: 7~10 天

B: 15 天

C: 3 天

D: 5 天

答案：A

9. 关于腹泻下列说法正确的是

A: 慢性腹泻病程大于 1 个月

B: 迁延性腹泻病程为 2 周至 1 个月

C: 急性腹泻病程小于 2 周

D: 排便一日超过 4 次

答案：C

10. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 500mol/L ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

A: 苯溴马隆

B: 丙磺舒

C: 别嘌醇

D: 秋水仙碱

答案：D

11. 宜于睡前服用的药品是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 阿卡波糖
- C: 洛伐他汀
- D: 糖皮质激素

答案：C

12. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

- A: D 级
- B: A 级
- C: B 级
- D: C 级

答案：A

13. 二级信息源的优点叙述，最正确的是

- A: 有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识
- B: 对一个具体问题提供的信息全面、详实
- C: 可提供丰富的信息
- D: 读者能自己评价信息，免受他人观点影响

答案：C

14. (儿童用药特点) 针对儿童最方便、最安全、最经济的给药途径

- A: 皮下注射
- B: 静脉给药
- C: 口服给药

D: 局部给药

答案：C

15. 消化性溃疡抗 H. pylori 的四联疗法正确的是（）

A: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋

B: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑

C: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑

D: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋

答案：D

16. 不良反应是口干、尿潴留的是（）

A: 特拉唑嗪

B: 度他雄胺

C: 哌唑嗪

D: 索利那新

答案：D

17. 心力衰竭治疗中唯一能够控制体液潴留的药物是

A: β 受体拮抗剂

B: 利尿药

C: 阿托品

D: 肾上腺素

答案：B

18. 可以引起红细胞沉降率增快的是

A: 妊娠 3 个月以上

B: 机体缺氧和高原生活

C: 泌尿系统感染

D: 缺铁性贫血

答案：A

19. 用于有机磷中毒症状的对抗药物是

A: 阿托品

B: 亚甲蓝

C: 碘解磷定

D: 毛果芸香碱

答案：A

20. 患者女性，40 岁，既往有风湿性心脏病史，近 2 年来出现劳力性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

A: 急性心肌炎

B: 大叶性肺炎

C: 支气管哮喘

D: 急性左心衰竭

答案：D

21. 患者，男，65 岁。因“不稳定型心绞痛急性发作”入院治疗。医生建议服用阿司匹林，正确的用量与用法是

A: 25~50mgqd，长期维持

B: 100-150mgqd，长期维持

C: 75~100mgbid，长期维持

D: 首次口服非肠溶制剂或嚼服肠溶制剂 300mg；随后 75~100mgqd，长期维持

答案：D

22. 根据《中华人民共和国药典临床用药须知》，使用前必须做皮试的药物是

- A: 克林霉素
- B: 氨苄西林
- C: 红霉素
- D: 维生素 K1

答案：B

23. 配制 10%葡萄糖注射液 500ml，现用 50%和 5%的葡萄糖注射液混合，需要

- A: 50%葡萄糖注射液 85ml 和 5%葡萄糖注射液 415ml
- B: 50%葡萄糖注射液 56ml 和 5%葡萄糖注射液 444ml
- C: 50%葡萄糖注射液 94ml 和 5%葡萄糖注射液 406ml
- D: 50%葡萄糖注射液 72ml 和 5%葡萄糖注射液 428ml

答案：B

24. V 级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论属于

- A: C 级
- B: B 级
- C: D 级
- D: E 级

答案：C

25. 口服避孕药对机体代谢的影响，正确的为（）

- A: 三酰甘油降低
- B: 糖耐量异常

C: HDL-C 降低

D: LDL-C 升高

答案：B

26. (2017 年真题) 抗结核联合治疗方案中, 可引起球后视神经炎不良反应的药物是 ()

A: 乙胺丁醇

B: 左氧氟沙星

C: 吡嗪酰胺

D: 利福平

答案：A

27. 容易缩短凝血酶原时间的药物是

A: 普通肝素

B: 华法林

C: 利伐沙班

D: 口服避孕药

答案：D

28. (2017 年真题) 药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是 ()

A: 异烟肼与牛奶同服

B: 硫酸亚铁与维生素 C 同服

C: 华法林与人参同服

D: 左甲状腺素与钙剂同服

答案：B

29. 属于 M 受体阻断剂的是

- A: 异丙托溴铵
- B: 美托洛尔
- C: 福莫特罗
- D: 乙酰胆碱

答案：A

30. (2019 年真题) 患者，女，35 岁，复杂部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊，患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

- A: 视物模糊
- B: 低血糖
- C: 牙龈增生
- D: 共济失调

答案：B

31. 作为预防用药错误策略，制定新药新知识培训制度，归属于

- A: 人员知识培训
- B: 科学发展
- C: 管理规范到位
- D: 环境与流程的优化与持续改进

答案：A

32. 一般情况下，容易透过透析膜被清除的药物是

- A: 分子量>500 的药物
- B: 分布容积小的药物

C: 低水溶性的药物

D: 血浆蛋白结合率高的药物

答案：B

33. 主要经肝脏清除，肝功能减退时清除明显减少，但并无明显毒性反应发生的药物

A: 需增加给药剂量

B: 须谨慎使用，必要时减量给药

C: 一般无须调整剂量

D: 尽可能避免使用

答案：B

34. 眼膏剂每次用量一般是

A: 1mg

B: 1cm

C: 1mm

D: 10mg

答案：B

35. 老年女性，心功能衰竭，服用呋塞米及螺内酯片，正确的使用方法是（）

A: 用温水调服

B: 舌下含服

C: 应同时碱化尿液

D: 清晨服用

答案：D

36. (消化性溃疡病的治疗)，除中和胃酸外，尚具有黏膜保护作用

- A: 奥美拉唑
- B: 溴丙胺太林
- C: 硫糖铝
- D: 硫酸镁

答案：C

37. 下列药品中，归属妊娠毒性药物 A 级的是

- A: 青霉素
- B: 环丙沙星
- C: 氯化钾
- D: 美托洛尔

答案：C

38. 黄体酮用于输尿管结石

- A: 盲目联合用药
- B: 超适应证用药
- C: 无适应证用药
- D: 过度治疗用药

答案：B

39. “1 个半衰期给药 1 次；如需要立即达到稳态，可首剂加倍”是针对

- A: 半衰期大于 30 小时的药品
- B: 半衰期 8~24 小时的药品
- C: 半衰期大于 24 小时的药品
- D: 半衰期小于 30 分钟的药品

答案：B

40. 与单胺氧化酶抑制剂合用有发生高血压危象的潜在风险的是

- A: 八面体蒙脱石
- B: 地芬诺酯
- C: 莫沙必利
- D: 酚酞

答案：B

41. 提高药效、减少人体吸收的是

- A: 利尿药
- B: 氨基糖苷类
- C: 抗忧郁药
- D: 阿苯达唑

答案：D

42. 适宜睡前服用，用于抑制“酸突破现象”的抑酸剂是

- A: 硫糖铝
- B: 铝碳酸镁
- C: 法莫替丁
- D: 乳酸菌素

答案：C

43. 洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀等他汀类所致的药源性损伤为

- A: 肺损害
- B: 肝损害
- C: 肾损害
- D: 胃肠道损害

答案：B

44. 下列药物中，驾驶员服用后可能出现定向力障碍的是

- A: 氟桂利嗪
- B: 双氯芬酸
- C: 金刚烷胺
- D: 哌替啶

答案：D

45. 属于过敏介质阻释剂的是

- A: 氨茶碱
- B: 孟鲁司特
- C: 曲尼司特
- D: 多索茶碱

答案：C

46. 单个样品量足够的随机对照试验结果属于

- A: 三级证据
- B: 二级证据
- C: 一级证据
- D: 四级证据

答案：B

47. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$

- A: 首选针对革兰阳性菌的药物
- B: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高
- C: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄西林
- D: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物

答案：A

48. 用药错误 A 级（1 级）的标准

- A: 患者已使用，但未造成伤害
- B: 发生差错但未发给患者，或已发给患者但未使用
- C: 差错造成患者暂时性伤害，需要采取预防措施
- D: 客观环境或条件可能引发差错

答案：D

49. 患者，男，42 岁。患艾滋病，进行抗病毒治疗。以下药物不属于核苷酸类逆转录酶抑制剂的是

- A: 拉米夫定
- B: 替诺福韦
- C: 奈韦拉平
- D: 双脱氧胞苷

答案：C

50. 关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是()

- A: 疼痛时用药，不痛时不需用药
- B: 应个体化用药
- C: 按阶梯给药
- D: 提倡无创给药方式，尽量口服

答案：A

51. 为下列各类慢性阻塞性肺病治疗药物选择合适的代表药，白三烯受体阻断剂

- A: 扎鲁司特
- B: 异丙托溴铵
- C: 沙丁胺醇

D: 茶碱

答案：A

52. WHO 推荐 12 岁以下儿童碘的摄入范围是

A: 50~100 $\mu\text{g}/\text{d}$

B: 30~100 $\mu\text{g}/\text{d}$

C: 30~120 $\mu\text{g}/\text{d}$

D: 50~120 $\mu\text{g}/\text{d}$

答案：D

53. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 心房颤动

B: 室性期前收缩

C: 阵发性室上性心动过速

D: 心室颤动

答案：A

54. 妥布霉素可导致药源性肾病的机制是

A: 肾小球滤过率下降

B: 不可逆性肾小管坏死

C: 结晶沉积

D: 前列腺素合成障碍

答案：A

55. 在骨骼疾病的诊断酶学中最重要的是

A: CK

B: ACP

C: ALP

D: LDH

答案：C

56. 服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

A: 餐前 0.5~1h

B: 餐后 1h

C: 餐前

D: 餐后

答案：A

57. 根据中国营养学会推荐，老年人在每日饮食之外，应补充的元素钙剂量为 (??)

A: 2000—4000mg

B: 500—600mg

C: 50mg

D: 100mg

答案：B

58. 以下治疗沙眼的药物中，属于处方药的是

A: 2%硝酸银

B: 红霉素眼膏

C: 酞丁安滴眼剂

D: 硫酸锌滴眼剂

答案：A

59. 应用华法林抗凝治疗时，患者应该控制的国际标准化比值为

- A: <2.0
- B: $2.0\sim 2.5$
- C: $2.0\sim 3.0$
- D: >3.0

答案：C

60. 与诺氟沙星合用可提高对致病性细菌感染的疗效的是

- A: 莫沙必利
- B: 地芬诺酯
- C: 酚酞
- D: 八面体蒙脱石

答案：D

61. (抗癫痫药物的选择)，癫痫部分发作的一线用药是

- A: 扑米酮
- B: 卡马西平
- C: 加巴喷丁
- D: 乙琥胺

答案：B

62. 在体内有抗凝血作用、体外没有抗凝血作用的药物是

- A: 噻氯匹定
- B: 链激酶
- C: 肝素
- D: 华法林

答案：D

63. 药师应对处方进行审核、依照处方准确、快速地调配，体现处方的

- A: 有效性
- B: 法律性
- C: 技术性
- D: 经济性

答案：C

64. 西咪替丁可引起的典型不良反应是

- A: 高钾血症
- B: 定向力障碍、意识混乱
- C: 血糖升高
- D: 低镁血症

答案：B

65. 阿卡波糖可能导致的不良反应是

- A: 腹胀、肠鸣音亢进
- B: 心力衰竭和水肿
- C: 肌痛、关节痛和高血压
- D: 消化道反应、过敏和白细胞减少

答案：A

66. (2019 年真题) 患儿，女，5 岁，误服香豆素灭鼠药，可选用的解救的物是

- A: 纳洛酮
- B: 维生素 K
- C: 二巯丙醇
- D: 亚甲蓝

答案：B

67. 利尿药呋达帕胺引起的主要不良反应是

- A: 水肿
- B: 低钾血症
- C: 多毛症
- D: 高钾血症

答案：B

68. 影响核酸转录的药物

- A: 依托泊苷
- B: 放线菌
- C: 培美曲塞
- D: 顺铂

答案：B

69. 属于容积性泻药的是

- A: 番泻叶
- B: 乳果糖
- C: 开塞露
- D: 硫酸镁

答案：D

70. 对氟乙酰胺中毒进行解毒的药物是()。

- A: 毒扁豆碱
- B: 阿托品
- C: 乙酰胺
- D: 卡马西平

答案：C

71. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g / L$ 。

- A: 氨基酸
- B: 维生素
- C: 奥美拉唑
- D: 维生素 B1

答案：C

72. 阿司匹林和华法林合用时易导致的不良反应是

- A: 出血
- B: 戒断症状
- C: 粒细胞缺乏症
- D: 心跳加快

答案：A

73. （2015 年真题）饮茶可减少其吸收的药物是（）。

- A: 阿莫西林
- B: 硫酸亚铁
- C: 去氮加压素
- D: 阿仑膦酸钠

答案：B

74. 通过增加房水经葡萄巩膜外流和减少房水生成降低眼压的 α_2 受体激动剂是

- A: 毛果芸香碱
- B: 溴莫尼定

C: 拉坦前列素

D: 噻吗洛尔

答案: B

75. 下列不良事件中，属于假劣药事件是()

A: 拜斯亭(西立伐他汀)事件

B: 亮菌甲素事件

C: 万洛(罗非昔布)事件

D: 康泰克 PPA 事件

答案: B

76. 慢性汞中毒患者的首发症状是()

A: 易兴奋症

B: 神经衰弱

C: 剥脱性皮炎

D: 口腔炎

答案: B

77. (2019 年真题) 患者，男，21 岁，因过敏性鼻炎就诊。关于过敏性鼻炎药物治疗及用教育的说法，错误的是

A: 治疗过敏性鼻炎使用口服糖皮质激素，首选地塞米松

B: 过敏性鼻炎患者应尽量避免接触已知的过敏原

C: 过敏性鼻炎的典型症状和感冒症状相似，应注意鉴别

D: 治疗过敏性鼻炎可局部使用糖皮质激素鼻喷剂

答案: A

78. (2017 年真题) 便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是()

A: 番泻叶

B: 乳果糖

C: 硫酸镁

D: 聚乙二醇 4000

答案：A

79. 患者，女，53 岁，因“冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性心肌梗死”住院治疗。医师处方：硝酸甘油片、比索洛尔片、注射用重组链激酶冻干粉针剂、依那普利片、肝素钠注射液、辛伐他汀片比索洛尔的主要不良反应是

A: 心动过缓、二至三度房室传导阻滞

B: 出血

C: 高钾血症

D: 横纹肌溶解症

答案：A

80. 慎用硝酸甘油的原因是

A: 引起嗜睡

B: 致使定向力障碍

C: 引起多尿或多汗

D: 致使视力模糊

答案：D

81. 有潜在的肺毒性的是

A: 氯苯那敏

B: 呋喃妥因

C: 苯巴比妥

D: 双嘧达莫

答案：B

82. 患者女,55 岁,因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体:体温 38℃中上及左上腹有压痛。化验结果:白细胞计数 $18.7 \times 10^9/L$,血清淀粉酶 1993U/L,血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是 ()

- A: 急性胰腺炎
- B: 急性胃炎
- C: 急性胆囊炎
- D: 急性阑尾炎

答案: A

83. 患者,女,18 岁,近半年来食欲亢进,多汗,体重明显减轻,伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤,心率 104 次/分。化验结果:血清促甲状腺激素 (TSH) $<0.1mU/L$,FT3、FT4 明显升高,肝、肾功能基本正常,白细胞计数正常。诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是

- A: 甲状腺全切除手术
- B: 选用放射性 ^{131}I 治疗
- C: 注意休息与补充营养,使用甲巯咪唑治疗
- D: 碘化钾治疗,定期复查

答案: C

84. 接种乙肝疫苗后,血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是

- A: 乙型肝炎病毒表面抗体
- B: 乙型肝炎病毒 e 抗原
- C: 乙型肝炎病毒 e 抗体
- D: 乙型肝炎病毒表面抗原

答案: A

85. 消化不良患者宜选用

- A: 乳果糖
- B: 小檗碱
- C: 干酵母
- D: 阿苯达唑

答案：C

86. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度中度贫血为

- A: 60~90g / L
- B: 90~120g / L
- C: 30~60g / L
- D: 120~160g / L

答案：A

87. 患者，女，66 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol / L，餐后血糖 11.2mmol / L，糖化血红蛋白 8.7%。

- A: 口服 Gt - 葡萄糖苷酶抑制剂
- B: 饮食干预及运动治疗
- C: 口服二甲双胍
- D: 口服磺酰脲类降糖药

答案：C

88. 下列剂型中，严禁直接服用或口含的是

- A: 泡腾片
- B: 舌下片
- C: 肠溶片
- D: 缓释片

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/767143021051010024>