1.男性，55 岁，患慢性肾炎 10 余年，经中西医结合治疗病情稳定，但近 1 年来逐渐加重，食欲下降，贫血，化验血肌酐已进入肾衰竭期，这时血肌酐的水平是 D

A.＜178 μ mol / L

B.178～278 μ mol / L

C.278～450 μ mol / L

D.450～707 μ mol / L

E.＞707 μ mol / L

2.男，30 岁，查血压 160 / 95mmHg，Hb85g / L，蛋白+，颗粒管型 2～3 个 / HP，BUN10mmol / L，Cr220 μ mol / L。对该患者不宜采取 B

A.低蛋白饮食

B.高蛋白饮食

C.低钠饮食

D.根据尿量多少适当限水

E.低磷饮食

3.男，42 岁。重症胰腺炎行胰腺坏死组织清除，腹腔引流术后 4 天。查体：R28 次 / 分，BP120 / 90mmHg，心率 106 次 / 分，中心静脉压 10cmH2O，PaO286mmHg。尿量 10ml / h，血钾 5.6mmol / L。此病人目前的主要问题是 C

A.心力衰竭

B.呼吸衰竭

C.肾功能衰竭

D.血容量不足

E.弥散性血管性凝血

4.年轻女性，反复出现尿频、尿急伴右腰阵发性隐痛，且放射至下腹部。近 1 个月来 2 次排全程血尿，尿涂片发现革兰阴性杆菌。为明确诊断，哪项检查最有意义 E

A.尿结核菌培养

精心整理

B.尿高渗培养

C.内生肌酐清除率测定

D.膀胱镜检

E.KUB-FIVF 检查

5.急性肾盂肾炎典型的临床症状为 A

A.尿频，尿急，尿痛，高热，腰痛

B.畏寒，发热，乏力，食欲不振

C.低热，乏力，间常腰痛

D.尿频，尿急，尿痛伴低热

E.尿频，尿急，尿痛伴腰痛

6.肾病综合征患者高度水肿，尿量 400～500ml／d，持续 2 周，尿蛋白（++++），血浆白蛋白 20g／L，肌酐清除率为 100ml／min，本患者的治疗主要是 D

A.呋塞米

B.消炎药

C.输血浆或清蛋白

D.肾上腺皮质激素

E.血液透析

7.急进性肾小球肾炎Ⅰ型患者血浓度常升高的抗体是 A

A.抗肾小球基底膜抗体

B.抗核抗体

C.抗双链 DNA 抗体

D.抗中性粒细胞胞质抗体

E.抗平滑肌抗体

8.男性，20 岁，原发性肾病综合征患者，首次治疗，每日用泼尼松 60mg，3 周后尿蛋白仍为(+)，此时应 D

A.改为地塞米松

精心整理

精心整理

B.将泼尼松加量到 80mg / d

C.改用环磷酰胺

D.用原量继续观察

E.减少泼尼松量到 40mg / d，加用免疫抑制剂

9.男性，27 岁，全身重度水肿，血压 80/60mmHg，尿蛋白 6.4g/24 小时，血浆清蛋白 23g/L，肾功能 BUN9.1mmol/L，Cr101 μ mol/L，应选择的主要治疗措施是 E

A.输新鲜血浆

B.输白蛋白

C.应用速尿

D.使用环磷酰胺

E.糖皮质激素

10.哪一种疾病最适台用肾上腺皮质激素 E

A.慢性肾炎

B.急性肾炎

C.肾盂肾炎

D.肾静脉血栓形成

E.肾病综合征

11.患者，女性 32 岁，面部蝶形红斑、多关节痛、口腔溃疡 2 个月，发热 1 周。ANA 阳性，抗 Sm 抗体阳性，抗 SSA 抗体阳性，血尿常规正常，胸片正常，目前无感染证据。治疗方案是 C

A.泼尼松 1mg/kg+NSAID

B.泼尼松 2mg/kg 以上

C.泼尼松 1mg/kg+CTX

D.泼尼松 1mg/kg+NSAID+CTX

E.泼尼松 1mg/kg+NSAID+抗生素

12.肾结核单纯使用抗结核药物指征是 C

精心整理

精心整理

A.静脉肾盂造影一侧不显影

B.静脉肾盂造影一侧广泛破坏

C.肾盂造影显示病变轻

D.一侧肾钙化

E.肾结核并结核性挛缩膀胱

13.下列哪些提示系统性红斑狼疮预后差 E

A.血肌酐已升高

B.高血压

C.心肌损害伴心功能不全

D.严重狼疮性脑病

E.以上均是

14.肾病综合征患者发生血栓并发症。最常见于 A

A.肾静脉

B.冠状血管

C.下肢静脉

D.肺静脉

E.下腔静脉

15.肾病综合征常用如下利尿剂治疗，其中哪种利尿剂分类是错误的？ A

A.呋塞米为噻嗪类利尿剂

B.氨苯蝶啶为潴钾利尿剂

C.丁尿胺为袢利尿剂

D.不含钠的低分子右旋糖酐为渗透性利尿剂

E.螺内酯为潴钾利尿剂

16.女性，18 岁，咽痛、发热 10 天，体温 38.5℃，眼睑浮肿，尿量 420ml／d，血压 150／90mmHg，尿蛋白（++），红细胞 3～7／Hp，白细胞 0～3／Hp，抗链“O”＞500U，其浮肿的机理是 C

精心整理

精心整理

A.醛固酮增高

B.尿蛋白丢失

C.肾小球滤过率急剧下降

D.抗利尿激素过多

E.血浆胶体渗透压降低

17.肾病综合征最常见的并发症是　C

A.循环衰竭

B.肾功能不全

C.感染

D.静脉血栓形成

E.蛋白及脂肪代谢紊乱

18.属于激素敏感型的肾小球病多为 E

A.局灶性节段性肾小球硬化

B.膜性肾病

C.系膜毛细血管性肾小球肾炎

D.系膜增生性肾小球肾炎

E.微小病变型肾病

19.女性，24 岁，突然出现尿频尿痛进而发热，尿检查：尿蛋白（+），红细胞 5～7 个／HP，白细胞 20～30／HP，诊断为急性肾盂肾炎，感染途径考虑 B

A.血行感染

B.逆行感染

C.淋巴道感染

D.直接感染

E.以上都不是

20.女，30 岁，近 1 周来面部及双下肢浮肿，伴胸腹水、泡沫尿、尿蛋白++++，红细胞（-），对该患者的治疗下列哪项是错误的？　D

精心整理

A.限制盐和水摄入

B.只要血清肌酐不升高，应给予高蛋白饮食

C.免疫抑制剂与糖皮质激素可以并用

D.血浆胶体渗透压低下所致的浮肿，尿量虽少，不能用利尿剂

E.抗血小板凝聚药治疗

21.女性，22 岁，浮肿伴进行性少尿 3 周，血压 1.65 / 105mmHg，血肌酐 350mol / L，血红蛋白 100g / L 尿蛋白+++，红细胞++，抗 GBM 抗体阳性，诊断为急进性肾炎。应立即使用下列哪种治疗　　C

A.甲泼尼龙冲击

B.环磷酰胺冲击

C.强化血浆置换疗法

D.口服泼尼松

E.口服环磷酰胺

22.15 岁，男性。高度浮肿，尿蛋白（+++），管型少许，血清蛋白 15g / L，血胆固醇 10mmol / L，应用强地松治疗 4 周，尿量增加，水肿消退，尿蛋白（++），此时应用哪项措施　　A

A.强地松原剂量继续治疗

B.强地松开始减量

C.加用清蛋白、强地松减量

D.加用 ACTH、强地松减量

E.加用消炎痛、强地松减量

23.男，42 岁。重症胰腺炎行胰腺坏死组织清除，腹腔引流术后 4 天。查体：R28 次 / 分，BP120 / 90mmHg，心率 106 次 / 分。中心静脉压 10cmH2O。PaO286mmHg。尿量 10ml / h，血钾 5.6mmol / L，此病人目前的主要问题是 C

A.心力衰竭

B.呼吸衰竭

C.肾功能衰竭

精心整理

D.血容量不足

E.弥散性血管性凝血

24.尿毒症患者，血压 180／120mmHg，贫血外观，周身中度水肿，鼻出血，BUN50mmoL／L，血钾 6.17mmoL／L，钙 2.0mmol／L，CO2 结合力 13mmol／L，在纠酸过程中突然手足搐搦，意识清楚，其原因可能是 E

A.脑出血

B.酸中毒引起

C.高血压引起

D.尿毒症性脑病

E.补碱引起

25.急进性肾小球肾炎不同于急性肾炎的主要临床表现是　　E

A.以肉眼血尿为主变化为

B.上皮细胞下驼峰状电子致密物

C.上皮细胞足突广泛融合

D.上皮下多数电子致密物

E.短期内进行性肾功能减退

26.男性，13 岁。上呼吸道感染后 2 周出现颜面水肿、肉眼血尿，血压 130/90mmHg，血补体下降，血肌酐 130μmol/L。引起该患者水肿的机制主要是　　E

A.低蛋白血症

B.全身毛细血管通透性增高

C.淋巴回流受阻

D.ADH 增高

E.肾小球滤过率下降

27.人体肾素主要是由哪种细胞分泌的　　D

A.肾小球毛细血管内皮细胞

B.肾小球囊上皮细胞

精心整理

C.肾小球系膜细胞

D.肾小球旁细胞

E.肾小管细胞

28.女性，35 岁，左腰痛 1 年多，伴反复尿频 / 尿急，时有低热 37.5℃左右，无盗汗、消瘦。曾用多种抗生素治疗，效果不佳，多次行清洁中段尿培养菌落计数＞105 / ml，B 超示左肾盂及左输尿管上段积液。下列哪一项治疗是防止再发的重要措施 D

A.多饮水、勤排尿、增加营养

B.提高机体免疫功能

C.重新选用抗生素治疗 4 周

D.解除尿路梗阻

E.长期低剂量抑菌治疗

29.正常条件下的终尿约占肾小球滤过液量的　D

A.10%

B.20%

C.30%

D.1%

E.5%

30.男性，25 岁，反复双眼睑浮肿 3 年，一直未作系统检查和治疗，最近为了解其肾功能作了下列检查，则哪项最能反映肾功能损害的程度 C

A.尿蛋白 2.0g／24h

B.尿白细胞 4／HP

C.尿比重低且固定于 1.010

D.内生肌酐清除率 48ml／min

E.尿红细胞+++

31.肾病综合征最基本的生理异常是 B

A.高度水肿

精心整理

精心整理

B.低蛋白血症

C.高脂血症

D.大量蛋白尿

32.肉眼血尿是指 A

A.尿内含血量＞1ml／L

B.尿内含血量＞2ml／L

C.尿内含血量＞3ml／L

D.尿内含血量＞5ml／L

E.尿内含血量＞10ml／L

33.尿细菌培养阳性者，菌落计数超过　　C

A.≥103 个／ml

B.≥104 个／ml

C.≥105 个／ml

D.≥106 个／ml

E.≥107 个／ml

34.关于急性肾炎的临床表现，下列哪项错误 D

A.尿渗透压降低

B.多有中等程度蛋白尿

C.多有血压增高

D.肉眼或镜下血尿见于所有病例

E.多有不同程度水肿

35.急性肾炎 2 周，血压 140／90mmHg，尿红细胞散在满视野，首先选用　　A

A.休息对症治疗

B.强地松

C.环磷酰胺

精心整理

精心整理

D.氮芥

E.消炎痛

36.女性尿路感染发病率最高的时期是　　C

A.婴儿期

B.月经期

C.新婚期

D.妊娠期

E.绝经期

37.下列哪项免疫指标与肾盂肾炎的发病无关 D

A.肾盂肾盏的瘢痕组织中有致病菌抗原

B.尿中抗体包裹细菌的检出

C.肾间质中抗原抗体复合物的存在

D.血液中抗基膜抗体的检出

E.尿液中 IgA 的测定

38.下列肾脏病中哪种为抗肾小球基底膜抗体性肾炎　D

A.链球菌感染后急性肾炎

B.膜性病变为主的肾炎

C.肾小球病变为主的肾炎

D.肺出血肾炎综合征

E.狼疮性肾炎

39.最常见肉眼血尿反复发作的肾小球疾病是　　D

A.急性链球菌感染后肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.糖尿病肾病

D.IgA 肾病

精心整理

精心整理

E.狼疮性肾炎

40.15 岁，男性，全身高度浮肿，尿蛋白（++++），管型少许，血浆白蛋白 15g／L，血胆固醇 10mmol／L，用强地松 60mg／d 治疗 1 周，病情无好转，此时应采用下列哪项措施　　C

A.停用强地松

B.使用地塞米松

C.继续用强地松原剂量

D.加用 ACTH

E.加用环磷酰胺

41.男性，32 岁，右侧肾结核无功能伴左肾严重积水，膀胱挛缩，查：血 Cr：800μmol／L，血红蛋白 82g／L，应选择哪项处理最好　　E

A.右肾切除术

B.右肾切除+左肾造瘘术

C.左肾造瘘术

D.肠道扩大膀胱术

E.抗结核治疗同时行左肾造瘘术

42.慢性肾盂肾炎肾小管管腔内有哪种大量管型 E

A.透明管型

B.胶样管型

C.蜡样管型

D.颗粒管型

E.细胞管型

43.以下哪组为诊断肾病综合征所必需的　B

A.大量蛋白尿+血尿

B.大量蛋白尿+低蛋白血症

C.低蛋白血症+贫血

精心整理

精心整理

D.水肿+高脂血症

E.水肿+高血压

44.肾病综合征水肿最主要的因素为 B

A.肾小球滤过率下降

B.血浆胶体渗透压下降

C.继发性醛固酮增多

D.抗利尿激素增多

E.全身毛细血管扩张

45.女性，35 岁，因发热服用解热镇痛药后出现关节痛、皮疹，尿常规示蛋白(++)，白细胞 3～7 个/HP，红细胞 5～8 个/HP，血常规血红蛋白 108g/L，白细胞 4.7×109/L，分类中性粒细胞 0.62，淋巴细胞 0.28，嗜酸性粒细胞 0.10，血小板 120×109/L，临床诊断首先考虑　　D

A.狼疮肾炎

B.急性肾小球肾炎

C.慢性肾小球肾炎

D.急性间质性肾炎

E.急性肾盂肾炎

46.为鉴别诊断急性肾炎与慢性肾炎急性发作，下列哪项无意义？ B

A.先驱感染至发病期间短（1 周以内）

B.少尿与尿素氮增高

C.明显低蛋白血症与贫血

D.眼底有高血压性改变

E.肾脏缩小

47.CKD3 期诊断标准是哪一项？　　C

A.肾损伤＞3 个月

B.GFR30-59ml／min

精心整理

精心整理

C.GFR30-59ml／min＞3 个月

D.肾损伤＞3 个月，GFR60-89ml／min

E.GFR60-89ml／min＞3 个月

48.男性，18 岁，3 周前咽痛，近 1 周面部水肿尿少，尿蛋白(++)，尿红细胞 10-20／HP，红细胞管型 0-1／HP，颗粒管型 0～1 个／HP，诊断 C

A.急性肾盂肾炎

B.慢性肾炎急性发作

C.急性肾炎

D.隐匿性肾炎

E.急性前列腺炎

49.尿毒症患者，血压 180／120mmHg，贫血外观，周身中度水肿，鼻出血。BUN50mmol／L，血钾 6.17mmol／L，钙 2.0mmol／L，CO2 结合力 13mmol／L，在纠酸过程中突然手足搐搦，意识清楚，其原因可能是 E

A.脑出血

B.酸中毒引起

C.高血压引起

D.尿毒症性脑病

E.卒卜碱引起

50.慢性肾衰竭氮质血症期的指标为 B

A.Ccr>50ml/min，Cr<178/μmmol/L

B.Ccr<50ml/min，Cr>178/μmmol/L

C.Ccr>40ml/min，Cr>267μmmol/L

D.Ccr<30ml/min，Cr>356/μmmol/L

E.Ccr<25ml/min，Cr>445/μmmol/L

51.链球菌感染后急性肾小球肾炎必有的临床表现是　B

A.肉眼血尿

精心整理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/768011101125006036