妇产科知识试题及答案

1、正常经阴分娩何时开始保护会阴( )

A、初产妇宫口开全时

B、初产妇胎头拨露使会阴后联合紧张时

C、初产妇胎头着冠使会阴后联合紧张时

D、经产妇宫口开大 4cm 时

E、经产妇宫口开全时

答案：B

2、胎体纵轴与母体纵轴的关系称

A、胎方位

B、胎产式

C、倾斜度

D、胎先露

E、骨盆轴

答案：B

3、产后 2 周,突然阴道大量流血,检桌子宫大而软,宫口松,有血块填塞,最不可能的原因是

A、胎盘残留

B、子宫胎盘附着面感染

C、胎膜残留

D、有陈旧宫颈裂伤

E、子宫复旧不良

答案：D

4、关于前置胎盘,下列选项错误的是

A、阴道出血发生的早晚、出血量多少与前置胎盘的分类有关

B、每次阴道出血常伴有腹痛及宫缩

C、胎头高浮或呈现臀位、横位

D、产后查胎盘,胎膜破口距胎盘<7cm

E、超声波可于 32-34 周作出最后诊断

答案：B

5、葡萄胎清宫术后,避孕期间常用的方法是( )

A、宫内节育器

B、长效口服避孕药

C、短效口服避孕药

D、阴茎套

E、输卵管结扎术

答案：D

6、在指导产妇喂养的方法中,正确的为

A、产后 1 小时内开始哺乳

B、乳胀时可用冷毛巾敷乳房

C、哺乳后将婴儿横抱并轻拍背

D、哺乳期以 10 个月至 1 年为宜

E、乳头皲裂者均应停止哺乳

答案：D

7、关于羊水的描述,正确的是

A、呈酸性

B、只来源于母体的血浆渗出液

C、晚期羊水为无色透明

D、增加母体对胎动的感觉

E、足月是的羊水量是 800~1000ml

答案：E

8、新生儿出生后能啼哭,可吞咽,但生活能力弱,妊娠周数可能是

A、孕 8 周末

B、孕 12 周末

C、孕 16 周末

D、孕 24 周末

E、孕 28 周末

答案：E

9、治疗产褥期中暑不正确的是

A、将患者置于阴凉、通风处

B、物理降温

C、应用糖皮质激素

D、甘露醇纠正脑水肿

E、使用降压药物

答案：E

10、受精卵着床约在受精后的

A、第 1~2 天

B、第 3 天

C、第 4 天

D、第 6~7 天

E、第 10~12 天

答案：D

11、关于卵果肿瘤的手术治疗,选项错误的是( )

A、凡良性病变的年轻患者均应保留一侧卵巢

B、凡恶性病变的年轻未育患者,均应行双侧附件切除

C、所有卵巢实性肿块均应手术治疗

D、大于 5cm 的卵巢囊性肿瘤应定期追踪

E、服用避孕药期间出现卵巢囊性肿物时应考虑为肿瘤

答案：B

12、枕左前位胎心听诊的部位为

A、脐下左侧

B、脐下右侧

C、脐中

D、脐上 3 指

E、脐周

答案：A

13、正常枕先露分娩时,胎头仰伸发生在( )

A、胎头着冠以后

B、胎头拨露以后

C、胎头枕部达坐骨时

D、胎头前囟达耻骨弓时

E、胎头枕部在耻骨弓下露出时

答案：E

14、下列哪项可以准确诊断早期妊娠( )

A、尿频

B、子宫增大宫颈充血呈紫蓝色

C、B 超探及子宫内有妊娠囊回声

D、尿妊娠试验阳性

E、停经伴嗜酸恶心

答案：C

15、对前置胎盘处理正确的是

A、一旦确诊应立即终止妊娠

B、如阴道出血量多,但胎儿未成熟,应采取期待疗法

C、无论何种类型,都应采用剖宫产终止妊娠

D、产后应积极预防产后出血

E、无论何种类型,胎儿死亡时应阴道分娩

答案：D

16、胎头大囟在 1 点,小囟在 7 点胎位

A、LOP

B、ROP

C、LOT

D、LOA

E、ROA

答案：B

17、出生后容易患新生儿特发性呼吸窘迫综合征,若加强护理可以存活的胎龄是

A、20 周

B、24 周

C、26 周

D、28 周

E、22 周末

答案：D

18、宫底高度在脐耻之间,妊娠周数应是

A、28 周末

B、32 周末

C、20 周末

D、36 周末

E、16 周末

答案：B

19、子宫下段在临产时可达

A、2~3cm

B、3~6cm

C、5~7cm

D、7~10cm

E、10~15cm

答案：D

20、妊娠足月时孕妇体重平均增加约为

A、5.0kg

B、12.5kg

C、25.0kg

D、20.0 kg

E、15.0kg

答案：B

21、能够使排卵后能使基础体温升高的激素是

A、催产素

B、雌激素

C、雄激素

D、催乳素

E、孕激素

答案：E

22、有关月经,下述哪项是错的

A、经期应保持外阴清洁

B、经血一般不凝

C、月经周期为本次月经干净至下次月经来潮

D、月经初潮多在 13-15 岁

E、月经期全身,局部抵抗力均降低

答案：C

23、女性,有停经史,末次月经记不清,腹部增大,怀疑妊娠就诊。下列对妊娠的诊断中最不可靠的是

A、平脐触及宫底

B、自觉胎动

C、扪诊可触及胎体

D、于脐下左侧听到规律的胎心

E、B 超显示有胎心搏动

答案：B

24、患者,女性,29 岁。子宫内膜检查见:腺体缩小,内膜水肿消失,螺旋动脉痉挛性收缩,有坏死、内膜下血肿。根据检查结果判断该患者子宫内膜处于

A、月经期

B、增生期

C、分泌期

D、月经前期

E、分泌晚期

答案：D

25、早期先兆流产最先出现的症状是

A、停经

B、子宫停止增大

C、妊娠试验由阳性转阴性

D、少量阴道出血

E、阵发性腹痛

答案：D

26、下列关于葡萄胎的描述,正确的是( )

A、葡萄胎排出后,至少应避孕一年

B、葡萄胎排出后,血 β-HCG 应立即转为阴性

C、葡萄胎恶变率为 35%

D、葡萄胎是低度滋养细胞肿瘤

E、葡萄胎排除后,最好给予预防性化疗

答案：A

27、某孕妇,27 岁,妊娠 36 周,医生查房时讲解脐带的结构,正确的是

A、脐静脉较粗.壁厚

B、脐动脉较细,壁薄

C、一条动脉,一条静脉

D、一条动脉,两条静脉

E、两条动脉,一条静脉

答案：E

28、侵蚀性葡萄胎主要来源于( )

A、宫外孕

B、流产

C、早产

D、葡萄胎

E、足月产

答案：D

29、某足月顺产新生儿,出生后心率 105 次/分,呼吸规则,四肢稍屈曲,有轻微喉反射,躯干皮肤红润,四肢青紫,Apgar 评分应为( )

A、5 分

B、8 分

C、9 分

D、6 分

E、7 分

答案：E

30、下列胎头在内旋转的过程中,发生的变化哪项是正确的( )

A、内旋转从骨盆入口处开始至中骨盆平面完成

B、使胎头矢状缝与母体中骨盆及骨盆出口前后径一致

C、使胎头冠状缝与母体中骨盆及骨盆出口前后径一致

D、胎头于潜伏期内完成内旋转动作

E、变枕额径为枕下前囟径

答案：B

31、孕 12 周末宫底可达

A、耻骨联合上 2~3 指

B、平脐

C、脐耻之间

D、脐下 3 指

E、脐上 2 指

答案：A

32、下述疾病,哪种不是不孕症的病因( )

A、生殖器结核

B、子宫粘膜下肌瘤

C、宫颈肥大

D、宫腔黏连

E、多囊卵巢

答案：C

33、耻骨联合上缘中点至骶岬上缘中点的距离

A、出口后矢状径

B、入口前后径

C、中骨盆横径

D、入口斜径

E、出口前后径

答案：B

34、促进母乳喂养成功的措施,不正确的是

A、帮助母亲在产后半小时开奶

B、指导母亲喂养方法

C、给婴儿吸橡皮奶头做安慰物

D、鼓励按需哺乳

E、实行母婴同室

答案：C

35、妊娠早期孕妇泌尿系统可出现的临床表现是

A、尿频

B、尿急

C、尿痛

D、尿失禁

E、尿滞留

答案：A

36、关于胎心音的描述正确的是( )

A、单音吹风样

B、多伴有杂音

C、胎心率与孕妇心率接近

D、双音似钟表滴答声

E、双音吹风样

答案：D

37、初产妇,孕 32 周,先兆子病患者,突然下腹疼痛,3 小时后胎心消失,血压 150/100mmHg,心率 110 次/分,宫底明显升高,子宫硬,压痛(+),阴道少量出血,宫口扩张 1cm。应立即处理,以下选项错误的是( )

A、配血,输血

B、插尿管,监测尿量

C、剖宫产

D、解痉、降压、镇静,防止子痫发生

E、查纤维蛋白原及凝血酶原时间等

答案：D

38、下列胎方位中不属于纵产式的是( )

A、枕左前

B、骶右后

C、颏右横

D、肩左前

E、枕左横

答案：D

39、有关经期健康教育,错误的是

A、月经是生理现象

B、经期不宜干重活

C、防寒保暖

D、禁止性生活

E、每日清洁外阴并坐浴

答案：E

40、侵蚀性葡萄胎和绒毛膜癌,II 期是指( )

A、病变转移至肺,且面积大于一侧肺的 1/2

B、转移至阴道

C、转移至脑

D、转移至肝脏

E、转移至附件

答案：B

41、滴虫性阴道炎的临床表现是( )

A、白色豆渣状白带,外阴奇痒

B、血性白带,奇痒难忍

C、脓性白带,阴道热痛

D、黄色泡沫状白带,痛痒

E、黄色白带,不痒

答案：D

42、早孕反应的鉴别下列哪个疾病除外( )

A、胃炎

B、肾盂肾炎

C、病毒性肝炎

D、胃肠功能紊乱

E、急性脂肪肝

答案：B

43、子宫内膜癌的确诊检查是( )

A、子宫碘油造影

B、腹腔镜

C、分段诊刮

D、子宫内膜培养

E、后穹窿细胞涂片

答案：C

44、女性生殖器最常见的良性肿瘤是( )

A、子宫肌瘤

B、成熟性畸胎瘤

C、卵巢浆液性囊腺瘤

D、卵巢黏液性囊腺瘤

E、以上都不是

答案：A

45、使子宫内膜周期性增生的是激素是

A、雌激素

B、孕激素

C、雄激素

D、绒毛膜促性腺激素

E、黄体生成素

答案：A

46、宫底高度在脐上三横指,妊娠周数应是

A、28 周末

B、32 周末

C、20 周末

D、36 周末

E、16 周末

答案：A

47、骶尾关节至坐骨结节间径中点间的距离

A、出口后矢状径

B、入口前后径

C、中骨盆横径

D、入口斜径

E、出口前后径

答案：A

48、第三产程不应超过

A、3 小时

B、16 小时

C、14 小时

D、24 小时

E、3 钟

答案：E

49、使子宫内膜由增生期变成分泌期的激素是

A、催产素

B、雌激素

C、雄激素

D、催乳素

E、孕激素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/768056120055006033