

## 康复科考试题库含答案

1、（士）关节内骨折最常见的并发症是

- A、缺血性骨坏死
- B、创伤性关节炎
- C、骨化性肌炎
- D、骨折不愈合
- E、骨生成异常

答案：B

2、（士）严重感染时的表现不包括

- A、白细胞总数常增加
- B、中性粒细胞出现左移及毒性病变
- C、淋巴细胞总数常增加
- D、嗜酸性细胞常轻度增加
- E、白细胞总数可不升高

答案：D

3、（士）智力残疾分级三级 IQ 值是

- A、0 20
- B、20 25 以下
- C、20 35/25 40
- D、35 50/40 55
- E、50 70/55 75

答案：D

4、（士）假膜性肠炎常为

- A、绿色稀汁样便
- B、大量稀水样便
- C、大量黄色稀汁样便并含有膜状物
- D、黏液脓血便，以黏液脓血为主，可无粪质
- E、呈暗红色果酱样粪便，以血为主，粪质较多，有特殊腥味

答案：C

5、（中级）阿卡波糖的机制是

- A、抑制  $\alpha$ -葡萄糖苷酶
- B、促进胰岛  $\alpha$  细胞释放胰岛素
- C、促进组织利用葡萄糖
- D、减少胰岛素对抗物的释放
- E、降低胰岛素的代谢速度

E、可采用姿势体位、物理疗法和药物治疗等方法控制肌痉挛

答案：C

45、（士）肱骨干中段骨折最易引起损伤的神经是

- A、正中神经
- B、腋神经
- C、尺神经
- D、桡神经
- E、肌皮神经

答案：D

46、（师）佝偻病活动期（激期）的表现不包括

- A、肋骨串珠
- B、方颅
- C、郝氏沟
- D、枕秃
- E、手、足镯

答案：D

47、（中级）在剂量过大或蓄积过多时发生的危害性反应，应尽量避免发生，称为

- A、副作用
- B、毒性反应
- C、后遗效应
- D、药源性疾病
- E、药物不良反应

答案：B

48、（士）脑血栓形成和脑栓塞属于

- A、缺血性脑卒中
- B、出血性脑卒中
- C、脑卒中一级预防
- D、脑卒中二级预防
- E、短暂性脑缺血发作 TIA

答案：A

49、（士）复合性区域性疼痛综合征的诊断标准不包括

- A、有明显的外伤和制动病史
- B、交感神经传出纤维的阻滞治疗无效

- C、肢体 X 线摄片示骨质稀疏
- D、明显水肿，皮肤色泽、温度和出汗等微循环障碍
- E、持续的自发性疼痛和痛觉过敏，超过单一神经支配区域

答案：B

50、（士）类风湿关节炎的基本病理改变是

- A、血管炎
- B、软骨以及软骨下组织病变
- C、关节滑膜炎
- D、筋膜炎
- E、骨关节炎

答案：C

51、（中级）高热伴恶心、呕吐，全身症状，下腹疼痛、腹泻、尿频尿痛及阴道脓性分泌物等症状，常见于

- A、急性宫颈炎
- B、前庭大腺炎
- C、慢性宫颈炎
- D、急性盆腔炎
- E、慢性盆腔炎

答案：D

52、（师）胸廓两侧下季肋部凹陷呈沟状，属于

- A、鸡胸状
- B、串珠状
- C、郝氏沟
- D、手、足镯
- E、两下肢呈“X”形或“O”形

答案：C

53、（士）X 线摄像的基础是

- A、穿透性
- B、分辨力
- C、感光效应
- D、电离效应
- E、荧光效应

答案：C

54、（士）中性粒细胞减少一般不见于

- A、再生障碍性贫血
- B、病毒感染
- C、射线损伤
- D、化学物质中毒
- E、慢性粒细胞白血病

答案：E

55、（士）骨折愈合期（晚期）康复治疗的目的不包括

- A、消除残存肿胀
- B、预防并发症的发生
- C、增加关节活动范围和肌力
- D、恢复肌肉的协调性和灵巧性
- E、软化和牵伸挛缩的纤维组织

答案：B

56、（中级）对心脏抑制作用最强的钙通道阻滞剂是

- A、硝苯地平
- B、尼莫地平
- C、地尔硫
- D、尼群地平
- E、维拉帕米

答案：E

57、（中级）治疗急性肺栓塞宜选用

- A、肝素
- B、华法林
- C、潘生丁
- D、曝氯匹定
- E、阿司匹林

答案：A

58、（士）双下肢周围性瘫痪，提示

- A、高颈段脊髓病变
- B、脊髓颈膨大病变
- C、胸段脊髓病变
- D、脊髓腰膨大病变

E、雅段脊髓病变

答案：D

59、（士）彻底清除病灶内的不良肉芽和纤维组织后，选择物理治疗，处于

A、早期浸润阶段

B、化脓坏死阶段

C、吸收修复阶段

D、慢性迁延阶段

E、溃疡、窦道、屡管形成

答案：E

60、（师）扁桃体超出腭舌弓，但未遮盖咽腭弓，属于

A、I度

B、n度

c、III度

D、V度

E、IV度

答案：A

61、（师）抗“O”试验测定的是

A、A族溶血性链球菌的代谢产物

B、A族溶血性链球菌的溶血毒素

C、A族溶血性链球菌溶血毒素抗体

D、溶血毒素的溶细胞毒性

E、O型链球菌抗体

答案：B

62、（中级）患者男，55岁，半年来上坡感心悸，气急，2小时前剧烈活动后突感心悸、气急加重，咳粉红色泡沫痰。查体：端坐位，口唇发绀，颈静脉未见，左室增大，心率为140次/min，双肺广泛湿啰音。首选的诊断是

A、急性支气管肺炎

B、支气管哮喘急性发作

C、急性心力衰竭

D、自发性气胸

E、慢性阻塞性肺疾病急性发作

答案：C

63、（中级）关于耳郭假囊肿的病因与病理，正确的是

A、软骨膜的无菌性炎症反应，病因不明

- B、外伤、手术
- C、耳郭血肿继发感染
- D、冻伤、烧伤
- E、耳郭部位的化脓性炎症

答案：A

64、（中级）高滴度阳性患者病变活动重，病情进展较快，不易缓解，预后较差，且伴有严重关节外表现的是

- A、单一的 IgE 增高
- B、单一的 IgA 降低
- C、C 反应蛋白 CRP 测定
- D、抗链球菌溶血素“O”试验
- E、类风湿因子 RF 乳胶凝集试验

答案：E

65、（师）“猿手”见于

- A、肌皮神经损伤
- B、挠神经损伤
- C、腋神经损伤
- D、正中神经损伤
- E、尺神经损伤

答案：D

66、（士）腱鞘囊肿的好发部位不包括

- A、腕部
- B、足背
- C、腕背侧
- D、桡侧屈腕肌腱
- E、手指掌指关节

答案：C

67、（士）X 线摄影基础是利用的 X 线特性是

- A、穿透性
- B、荧光效应
- C、感光效应
- D、电离效应
- E、射频效应

答案：C

68、腰椎小关节病的临床表现不包括

- A、腰痛活动时减轻，休息后反而加重
- B、腰痛多呈持续性钝痛
- C、小关节处有固定的压痛点
- D、因骨赘的压迫出现腰5 舐1 神经根刺激症状
- E、因骨赘的压迫出现腰5 舐1 神经根损伤的表现

答案：A

69、（土）正常人成年男性血红蛋白含量为

- A、110—150g/L
- B、120 160g/L
- C、120—150g/L
- D、170 200g/L
- E、100 60g/L

答案：B

70、（土）对促进血液循环，松解粘连有较好作用的治疗是

- A、局部按摩
- B、音频电疗法
- C、超声波疗法
- D、红外线、蜡疗
- E、局部紫外线照射

答案：A

71、（中级）T2 水抑制成像为黑色的是

- A、游离水
- B、结合水
- C、月干
- D、肾
- E、空气

答案：A

72、（土）骸骨软板的营养主要来自

- A、关节滑液
- B、股四头肌的血液供应
- C、关节囊的血液供应
- D、骸骨的滋养动脉

E、能韧带的血液供应

答案：A

73、（中级）药物的代谢指

A、药物从用药部位进入血液循环的过程

B、药物与血浆蛋白结合

C、药物进入机体后发生化学结构改变

D、药物随尿排出体外

E、药物向血流量小的组织转移

答案：c

74、（中级）为目前临床应用的抗铜绿假单胞菌最强的抗生素是

A、红霉素

B、头孢他啶

C、麦迪霉素

D、林可霉素

E、乙酰螺旋霉素

答案：B

75、（师）佝偻病初期多见于

A、3个月小儿

B、6个月小儿

C、1岁小儿

D、3岁小儿

E、2岁小儿

答案：B

76、（中级） $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂

A、二甲双肌；

B、阿卡波糖

C、胰岛素

D、罗格列酮

E、甲苯磺丁服

答案：B

77、（中级）氢氯噻嗪可引起

A、耳毒性

B、抗利尿作用



- C、高血钾
- D、一过性头疼、头晕
- E、四肢麻木

答案：B

78、（中级）患者，18岁。自初潮后表现为月经开始前1天腹痛，时有恶心，子宫、附件正常。最可能的诊断是

- A、盆腔炎
- B、子宫内膜异位症
- C、盆腔结核
- D、宫颈炎
- E、原发性痛经

答案：E

79、（中级）尿频、尿急，尿白细胞数增多，细菌学检查阳性，诊断为

- A、急性肾小球肾炎
- B、肾病综合征
- C、急性肾衰竭
- D、肾盂肾炎
- E、肾良性囊肿

答案：D

80、（士）呈白色淘米水样，量多且含黏液片块，见于霍乱、副霍乱患者，

- A、鲜血便
- B、柏油样便
- C、米泔·水样便
- D、黏液脓血便
- E、白陶土样便

答案：C

81、（师）骨样组织堆积于干骺端，形成“串珠”“手足镯”，属于

- A、颅骨骨化障碍
- B、机体钙、磷失调
- C、肠道吸收钙、磷减少
- D、骨基质不能正常钙化
- E、破坏软骨细胞生长发育

答案：D

82、（士）提示神经根疾患的是

- A、颈部旋转时疼痛弥散
- B、颈部旋转时局限性剧痛
- C、颈部旋转时肌紧张定位明确
- D、颈部伸展时肩头区或肩胛区的牵涉痛
- E、颈部伸展时臂或手相应皮节的牵涉剧痛

答案：E

83、（士）血红蛋白与红细胞的意义不包括

- A、白血病时红细胞计数减少
- B、妊娠期红细胞计数相对减少
- C、血红蛋白能更准确地反映贫血的程度
- D、血红蛋白的增减与红细胞的增减度呈正比
- E、运动量较大者，气候寒冷及高原居民红细胞计数增多

答案：D

84、（中级）苯巴比妥急性中毒时，为加速其从肾排泄，可采取的措施是

- A、静滴生理盐水
- B、静滴碳酸氢钠溶液
- C、静滴 5%葡萄糖溶液
- D、静滴低分子右旋糖酐
- E、静滴甘露醇

答案：B

85、（中级）合并心绞痛的高血压患者治疗应首选

- A、强心剂
- B、B<sub>2</sub>受体激动剂
- C、α受体拮抗剂
- D、β受体拮抗剂
- E、血管紧张素转换酶抑制剂

答案：D

86、（中级）患者女，46岁，因上腹部疼痛不适就诊，经检查怀疑胃部肿瘤。

对最后确诊最有意义的检查是

- A、CT检查
- B、内镜检查

- C、MRI 检查
- D、X 线检查
- E、病理学检查

答案：E

87、（士）复合性区域性疼痛综合征的物理治疗不包括

- A、早期主动运动
- B、早期被动运动
- C、早期消炎镇痛治疗
- D、后期改善末梢循环
- E、后期增加关节活动范围训练

答案：B

88、（中级）关于脊柱损伤的急救搬运，错误的是

- A、用木板或门板搬运
- B、一人抬头，一人抬足
- C、有颈椎损伤的要有专人托扶头部
- D、用担架搬运
- E、颈髓损伤的可由自己托住头部

答案：B

89、（师）关于单纯疱疹的描述，正确的是

- A、皮损愈合后仍遗留疼痛
- B、沿神经走向单侧分布
- C、疼痛不明显
- D、较少复发
- E、由水痘-带状疱疹病毒感染引起

答案：C

90、（士）虽易引起败血症，但一般不发生转移性脓肿，致病菌是

- A、金黄色葡萄球菌
- B、溶血性链球菌
- C、大肠埃希菌
- D、铜绿假单胞菌
- E、变形杆菌

答案：B

91、（士）多位于与泌酸区毗邻的胃小弯侧及幽门前区，诊断是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/768127051024007002>