

瘢痕憩室与产科临床

定义

- 临床定义
 - ✓ 剖宫产术后切口局部愈合不良，是瘢痕缺陷一种
 - ✓ 在原剖宫产切口形成憩室（空腔）与宫腔相通



产科手术危险因素

- 剖宫产次数：
- 缝合方式：近期大型meta分析表明：
- ✓ 《2015我国剖宫产专家共识》 ----双侧连续缝合
- 分娩是否发动：
- 切口位置

宫腔感染
宫腔压力过高
子宫内膜异位
子宫切口局部血运欠佳

- 年龄
- 前次剖宫产指征
- 营养代谢紊乱
- 缝线性质

临床表现

- 最常见的为剖宫产后异常阴道出血
- 妇科症状的严重程度与子宫瘢痕憩室的大小成正比
相关

诊断方法

- 宫腔镜:可直视下观察子宫
- 超声
- 宫腔内声学造影
- 其他方法: 宫腔内碘油造影、磁共振

继发性不孕

- 多有阴道异常出血史
- 子宫瘢痕憩室致不孕的机制
- 继发不孕患者排除其他不孕因素，治疗后妊娠率高96%

瘢痕妊娠

- 受精卵嵌入其中并种植生长形成瘢痕妊娠
- 瘢痕憩室存在时增加了瘢痕妊娠几率

胎盘病态附着现象

- 胎盘形成并覆盖原子宫薄弱切口
- 憩室存在：憩室内膜薄，妊娠时易导致蜕膜发育不良，绒毛易植入
- 瘢痕憩室更加重了胎盘病态附着严重程度

孕期子宫下段肌层菲薄

- 主要出现在孕晚期
- 子宫下段肌层连续，但厚度菲薄，如蝉翼
- 发生率与非孕期瘢痕憩室大小成正比

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/775023003203011211>