

2025-2026 年护师类之主管护师基础试题库和答案要点

单选题（共 50 题）

1、关于骨牵引的护理，错误的叙述是（ ）。

- A. 床尾或床头抬高 15~30cm
- B. 牵引针不可左右移动
- C. 及时去除牵引针孔的血痂
- D. 维持肢体在整复或固定的位置
- E. 鼓励患者功能锻炼

【答案】 C

2、关于精神分裂症疾病特点的描述，不正确的是（ ）。

- A. 病因至今未明
- B. 发病者多为老年人
- C. 患者可出现情感障碍
- D. 患者可出现意志行为障碍
- E. 本病在精神病中患病率最高

【答案】 B

3、某男性患者，75 岁。诊断为慢性呼吸衰竭，表现为呼吸困难，发绀明显，多汗，烦躁。血气分析：PaO₂ 45mmHg，PaCO₂ 72mmHg。该病人应给予

- A. 高浓度、高流量持续吸氧
- B. 高浓度、高流量间歇吸氧
- C. 低浓度、低流量持续吸氧

君子忧道不忧贫。——孔丘

- D. 低浓度、低流量间歇吸氧
- E. 酒精湿化吸氧

【答案】 C

4、人类行为的主要适应形式不包括

- A. 反射
- B. 反馈
- C. 调试
- D. 顺应
- E. 应对

【答案】 B

5、抗甲状腺药物硫脲类的作用机制是（ ）。

- A. 抑制甲状腺素释放
- B. 降低甲状腺素活性
- C. 促进肝脏破坏甲状腺素
- D. 抑制甲状腺素合成
- E. 破坏甲状腺组织

【答案】 D

6、患者女，28岁。因畏寒、乏力、记忆力减退3个月，经检查示：FT4↓、FT3↓、TSH↑，诊断为甲状腺功能减退症。需长期服用甲状腺制剂替代治疗，多长时间应检测血TSH（ ）。

- A. 1～3个月
- B. 3～6个月

- C. 6~12 个月
- D. 12~18 个月
- E. 18~24 个月

【答案】 C

7、男性，头部被木棍击伤，X 线显示：颅骨凹陷 0.7cm。适宜的处置为（ ）。

- A. 立即手术
- B. 50%葡萄糖注射
- C. 严密观察病情变化
- D. 20%甘露醇 125mL 快速点入
- E. 垫纱布卷包扎

【答案】 C

8、李女士，怀孕 36 周，第 1 胎。昨晚突然阴道出血，出血量约 400ml，无腹痛。检查：血压 100/60mmHg，宫底高度与孕月相符，腹软无压痛，胎位清楚，胎心音 110 次/分。

- A. 内诊
- B. B 型超声显像
- C. 超声多普勒
- D. 阴道镜检查
- E. 催产素激惹试验

【答案】 B

9、患者女性，39岁，因阴道分泌物增多半年于门诊就诊。妇科检查：宫颈重度糜烂。宫颈TCT检查结果为ASCUS，HPV（-），对该患者而言，恰当的处理是

- A. 宫颈活组织检查
- B. 6~12个月复查宫颈TCT
- C. 子宫颈锥切术
- D. 子宫颈切除术
- E. 子宫切除术

【答案】 B

10、男性，60岁，心窝部饥饿性疼痛10余年，近年来发作频繁，疼痛规律消失，经胃镜证实为十二指肠球后溃疡。

- A. 胃大部切除术
- B. 溃疡出血处缝扎止血后胃大部切除术
- C. 溃疡出血处缝扎止血
- D. 溃疡出血处缝扎止血后迷走神经切断术
- E. 溃疡出血处缝扎止血后迷走神经切断术+引流手术

【答案】 B

11、经皮肝穿刺胆管造影前注射维生素K的主要目的是（ ）。

- A. 防止胆绞痛
- B. 防止胆汁漏
- C. 预防出血
- D. 预防感染
- E. 预防腹膜炎

【答案】 C

12、协助取半卧位，主要针对临终患者的哪项变化

- A. 肌张力丧失
- B. 胃肠蠕动减弱
- C. 循环功能减退
- D. 呼吸困难
- E. 疼痛

【答案】 D

13、缺铁性贫血为

- A. 大细胞低色素性贫血
- B. 正常细胞正常色素性贫血
- C. 小细胞低色素性贫血
- D. 小细胞正常色素性贫血
- E. 大细胞正常色素性贫血

【答案】 C

14、抑郁症病人的核心症状是（ ）。

- A. 妄想
- B. “三低症状”
- C. 智能缺损
- D. 震颤谵妄
- E. 脑衰弱综合征

【答案】 B

15、男性，45岁。因急性广泛前壁心肌梗死收住CCU，在心电监护示波器上观察到心电波形突然变成形态、振幅频率极不规则的波动，QRS-T波群不可辨认，血压读数为56/22 mmHg，应该立即采取的措施是

- A. 非同步电复律
- B. 同步电复律
- C. 静推利多卡因
- D. 静推肾上腺素
- E. 静推心三联

【答案】 A

16、诊断恶性肿瘤最可靠的依据是

- A. "B"超
- B. "X"光平片
- C. 病理检查
- D. "X"光造影
- E. "CT"

【答案】 C

17、胃、十二指肠镜检查时病人应采取

- A. 半坐位
- B. 去枕平卧位
- C. 左侧卧位
- D. 右侧卧位

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

E. 头高足低位

【答案】 C

18、帮助残疾患者提高生活自理能力的主要康复护理措施是（ ）。

A. 康复评定和心理治疗

B. 药物治疗和物理治疗

C. 与日常生活密切联系的运动和作业疗法

D. 社会服务和中医康复治疗

E. 提供治疗性的康复护理

【答案】 C

19、风心病哪类严重瓣膜损害可导致左心室射血受阻，引起左心室排血量显著降低，出现心绞痛、眩晕，甚至猝死

A. 二尖瓣狭窄

B. 二尖瓣关闭不全

C. 主动脉瓣狭窄

D. 主动脉瓣关闭不全

E. 肺动脉瓣关闭不全

【答案】 C

20、枕骨大孔疝可以造成（ ）。

A. 颅内压增高

B. 硬脑膜下血肿

C. 小脑挫裂伤

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

- D. 呼吸、循环中枢受压
- E. 通过血管运动中枢引起高血压危象

【答案】 D

21、早产儿，日龄 1 天。有窒息史，烦躁不安，出现高声尖叫，首先考虑的诊断为（ ）。

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 颅内出血
- C. 破伤风
- D. 败血症
- E. 肺炎

【答案】 B

22、患儿，男，2 岁，体格瘦小，平日口唇、甲床青紫，活动、哭闹时加重。活动时喜下蹲，经查，诊断为法洛四联症。

- A. 避免发生休克
- B. 避免发生便秘
- C. 避免发生血栓栓塞
- D. 避免发生心力衰竭
- E. 避免发生肾衰竭

【答案】 C

23、针对系统性红斑狼疮皮肤损害的治疗药物是（ ）。

- A. 非甾体抗炎药
- B. 抗疟药

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

C. 肾上腺皮质激素

D. 免疫抑制剂

E. 免疫球蛋白

【答案】 B

24、前置胎盘的检查简单易行的首选是

A. B 超

B. CT

C. MRI

D. 胸片

E. 阴道检查

【答案】 A

25、短暂性脑缺血病人临床表现为（ ）。

A. 血压升高

B. 全身抽搐

C. 阵发性眩晕

D. 大小便失禁

E. 持续剧烈头痛

【答案】 C

26、慢性阻塞性肺气肿最重要的慢性并发症是

A. 肺结核

B. 自发性气胸

- C. 肺不张
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. 肺炎

【答案】 D

27、痔早期常见症状是()

- A. 坠胀感
- B. 疼痛
- C. 无痛性间歇性便后出血
- D. 瘙痒
- E. 痔块脱出

【答案】 C

28、患者女性，29岁，孕1产0，孕36周，胎心145次/分，胎动监测正常。现来医院做产前咨询，想了解自身生理和心理的变化情况。关于该孕妇循环及血液系统变化的描述，不正确的是

- A. 心脏向左、向上、向前移位
- B. 血容量平均增加 2500ml
- C. 易发生下肢、外阴静脉曲张和痔
- D. 血液处于高凝状态
- E. 血液稀释，白蛋白减少

【答案】 B

29、患儿男，16个月。体格、智能发育正常，此时小儿应出乳牙

- A. 10~12颗

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

B. 12～14 颗

C. 8～10 颗

D. 6～8 颗

E. 出齐

【答案】 A

30、心室颤动首选的治疗措施是

A. 心内注射肾上腺素

B. 同步电复律

C. 非同步电复律

D. 静脉注射苯妥英钠

E. 胺碘酮静注

【答案】 C

31、抢救心脏骤停患者时心肺复苏操作的正确方法是（ ）。

A. 人工呼吸 1 次，然后心脏按压 10 次

B. 人工呼吸 1 次，然后心脏按压 15 次

C. 心脏按压 15 次，然后人工呼吸 2 次

D. 心脏按压 30 次，然后人工呼吸 2 次

E. 人工呼吸 2 次，然后心脏按压 30 次

【答案】 D

32、妊娠晚期，孕妇心率每分钟可加快

A. 5 次

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

- B. 10～15 次
- C. 20～25 次
- D. 30～35 次
- E. 40～45 次

【答案】 B

33、患者女性，28 岁。孕 1 产 0，孕 36 周。骨盆测量：髂棘间径 23cm，髂嵴间径 25cm，骶耻外径 18cm，坐骨结节间径 7.5cm，对角径 13cm。

- A. 耻骨弓角度
- B. 出口前矢状径
- C. 出口后矢状径
- D. 坐骨棘间径
- E. 坐骨切迹宽度

【答案】 C

34、关于卵巢的描述，正确的是（ ）。

- A. 卵巢皮质层中含有大量血管、神经
- B. 卵巢的大小与月经周期无关
- C. 卵巢的髓质层内含有大量卵泡
- D. 卵巢从青春期开始排卵
- E. 卵巢表面有腹膜覆盖

【答案】 D

35、牵引病人护理措施正确的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/775111104102012034>