

同等学力申硕-临床病理学-系统病理学--消化系统疾病(A型题3)

[单选题]1. 34岁男性, 上腹灼痛3个月, 柏油样便2日, 为了确诊, 首选检查是

- A. X线钡餐透视
- B. 大便隐血试验
- C. 血常规
- D. 胃镜
- E. B超(江南博哥)

正确答案: D

[单选题]2. 36岁男性 Crohn 病患者, 发生肛周脓肿, 选用下列哪种药物既可以控制感染又有助于缓解 Crohn 病的病情

- A. 青霉素
- B. 泰能
- C. 甲硝唑
- D. 红霉素
- E. 5-ASA

正确答案: C

[单选题]3. Crohn 病的手术指征是

- A. 严重腹泻
- B. 体温高于 39.5℃
- C. 完全性机械性肠梗阻
- D. 腹部包块
- E. SASP 治疗无效

正确答案: C

[单选题]4. Crohn 病的最好发部位是

- A. 口腔
- B. 肛门
- C. 直肠
- D. 乙状结肠
- E. 末段回肠及其相邻右半结肠

正确答案: E

[单选题]5. Crohn 病侵犯肠道的深度为

- A. 黏膜层
- B. 黏膜层和黏膜下层
- C. 只侵犯黏膜下层
- D. 只侵犯到肌层
- E. 可侵犯肠壁全层

正确答案: E

[单选题]6. Hp 最适宜定居的环境是

- A. 幽门腺黏膜表面
- B. 胃底腺黏膜表面
- C. 胃体腺黏膜表面
- D. 胃肠上皮化生黏膜表面
- E. 十二指肠黏膜表面

正确答案：A

[单选题]7. LES 主要作用是

- A. 防止十二指肠内容物反流入胃
- B. 防止咽部食物呛入气管
- C. 防止胃内容物反流入食管
- D. 帮助食管蠕动，使其顺利进入胃内
- E. 使食物由胃体进入胃窦

正确答案：C

[单选题]8. 氨进入身体的主要门户是

- A. 胃肠道
- B. 肾和骨骼肌产氨
- C. 心肌运动产氨
- D. 以上都是
- E. 以上都不是

正确答案：A

[单选题]9. 导致肠易激综合征的原因不包括以下哪一条

- A. 特殊饮食
- B. 肠道感染
- C. 精神因素
- D. 免疫异常
- E. 肠道菌群失调

正确答案：D

参考解析：肠易激综合征是一种以腹痛或腹部不适伴排便习惯改变为特征的功能性肠病。病因尚不清楚，可能与多种因素有关。目前认为内脏动力异常和内脏感觉异常是发病的两大重要因素，另外肠道感染 / 社会精神因素等可通过内在因素引起肠道动力和感觉的改变，导致 IBS。

[单选题]10. 对鉴别轻型和重症胰腺炎，有帮助的一项是

- A. 黄疸
- B. 上腹部疼痛向腰背部放散
- C. 尿糖阳性
- D. 血淀粉酶增高
- E. CRP 明显升高

正确答案：E

参考解析：黄疸、腹痛、淀粉酶升高、尿糖阳性等现象在轻型、重症胰腺炎中均可出现，CRP 为肝脏合成的体内组织损伤和炎症反应的非特异性标志物。目前认为，此值明显升高有助于胰腺坏死的诊断。

[单选题]11. 符合结核性腹膜炎腹水特点的是

- A. SAAG > 11g / L
- B. 白细胞计数不超过 $500 \times 10^6 / L$ ，且以淋巴细胞为主
- C. 腹水比重超不超过 1.018
- D. 蛋白质含量大于 30g / L
- E. 结核分枝杆菌培养大多阳性

正确答案：D

[单选题]12. 患者 68 岁，肝区疼痛 1 个月，行为失常 2 天，查体肝大，质硬。磁共振波谱分析可发现该患者哪些有机渗透物质的含量变化

- A. 胆碱、谷氨酰胺、肌酸
- B. 胆碱、苯乙醇胺、肌酸
- C. 胆碱、苯乙醇胺、多巴胺（p 羟酪胺）
- D. 苯乙醇胺、多巴胺（β 羟酪胺）、肌酸
- E. B 羟酪胺、谷氨酰胺、多巴胺（p 羟酪胺）

正确答案：A

[单选题]13. 患者男性，46 岁，确诊溃疡性结肠炎 3 年，加晕 1 个月。因严重腹泻患者自行服用阿托品，可能引起下列哪种并发症

- A. 机械性肠梗阻
- B. 癌变
- C. 瘘管形成
- D. 中毒性巨结肠
- E. 消化道出血

正确答案：D

[单选题]14. 患者饮酒 30 年，近 1 个月腹胀、尿少，查体移动性浊音阳性，化验腹水比重 1.015，WBC：90 / L，血清 ALB35g / L，其腹水的适宜治疗方法为

- A. 大量利尿剂的应用
- B. 多次放腹水，每次 4000 毫升以上
- C. 腹水经超滤浓缩回输
- D. 休息、限水、限钠
- E. 反复输新鲜血

正确答案：D

[单选题]15. 男，16 岁。因诊断急性粒细胞白血病（M2 型）住院化疗，于用药第 4 天出现突发的脐周痛，伴发热，查血淀粉酶升高，尿淀粉酶正常，停化疗后第二天出现腹膜刺激症，复查尿淀粉酶明显升高以。下诊断最可能的是

- A. 急性肠梗阻
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性阑尾穿孔
- E. 胆石症

正确答案：C

参考解析：已知应用某些药物可能损伤胰腺，使胰腺分泌和黏稠度增加，引起急性胰腺炎。急性胰腺炎可表现为腹痛、恶心、呕吐及腹胀、发热等，血清淀粉酶在起病后6~12小时开始升高，48小时开始下降，持续3~5天，尿淀粉酶升高较晚，在发病后12~24小时开始，持续1周。

[单选题]16. 男，32岁，餐前上腹疼痛5年，有时反酸。近日疼痛加重，且呈持续性，向腰背部放射，有时低热，大便正常。钡餐造影示十二指肠球部变形。血白细胞 $11 \times 10^9 / L$ ，中性0.78。下列诊断最可能是

- A. 慢性胃炎
- B. 十二指肠球部溃疡
- C. 胃癌
- D. 十二指肠穿透性溃疡
- E. 胃黏膜脱垂

正确答案：D

参考解析：溃疡穿透性穿孔改变了腹痛规律，变得顽固而持续，疼痛常放射至背部。青年男性，餐前上腹痛5年，近日疼痛加重，且呈持续性，向腰背部放射，疼痛特点符合十二指肠穿透性溃疡。

[单选题]17. 男，34岁，工人，平素健康。近2个月有反酸，饥饿时上腹不适，近几天来黑便。查体：轻度贫血貌，心肺无异常。血红蛋白 $90 g / L$ ，白细胞计数 $9 \times 10^9 / L$ ，分类正常。患者的上消化道出血可能是

- A. 肝硬化食管静脉曲张破裂出血
- B. 十二指肠球部溃疡
- C. 胃小弯胃角溃疡
- D. 浅表性胃炎
- E. 胃黏膜脱垂

正确答案：B

[单选题]18. 男，36岁，2年前行胃镜检查诊断为十二指肠溃疡，合并Hp感染。曾应用铋剂、甲硝唑、四环素治疗6天，本次因呕血行胃镜检查诊断为：十二指肠球部溃疡，Hp(+)。应采用下列哪一种治疗方案处理最适宜

- A. 铋剂+甲硝唑+四环素+雷尼替丁二周
- B. 铋剂+甲硝唑+阿莫西林+雷尼替丁二周
- C. PPI6周
- D. PPI+克拉霉素+甲硝唑1周

E. PPI+克拉霉素+阿莫西林 1 周

正确答案：E

[单选题]19. 男，40 岁，因 8 周前黑便而行胃镜检查诊断为十二指肠球部溃疡，Hp 血清学抗体检查阳性。服用 PPI、克拉霉素和阿莫西林 2 周，现已结束治疗 1 个月，为了确定 Hp 是否被根除，下列哪项是最恰当的处理

- A. 重复 Hp 血清学检查
- B. 告之其 Hp 感染已被根除，不需进一步检查
- C. 重复血清学检查，但要测定 Hp-IgG 滴度
- D. ¹³C-尿素呼气试验
- E. 粪便 Hp 培养

正确答案：D

[单选题]20. 男，50 岁，肝炎后肝硬化 5 年，近日烦躁，昼睡夜醒，选用何种检查最有意义

- A. 线粒体抗体
- B. 蛋白电泳
- C. ALT、AST
- D. AFP
- E. 动脉血氨

正确答案：E

参考解析：肝硬化患者出现精神症状，应首先考虑肝性脑病。另外以精神症状为惟一表现的患者应与其他疾病如糖尿病、尿素症、精神疾患等鉴别。肝性脑病患者多有血氨升高。

[单选题]21. 男，54 岁，上腹部不适 4 年，胃镜检查提示：胃窦体交界前壁黏膜呈颗粒状粗糙不平；病理学检查提示：中度非典型增生，Hp (+)。此患者应采取下列哪种治疗方法

- A. 根除 Hp
- B. PPI
- C. 硫糖铝
- D. 内镜下 EMR
- E. 外科手术

正确答案：A

[单选题]22. 男，60 岁，饱餐后 2 小时感上腹部疼痛，渐加剧，呕吐两次，2 小时后来诊。既往无腹痛病史。检查：血压 100 / 70mmHg，体温 38 度，上腹部压痛，反跳痛。血淀粉酶 250U. 尿淀粉酶 32U。留观输液 6 小时后症状不缓解。下列哪项检查最有助于诊断

- A. 胃镜
- B. 血清脂肪酶测定
- C. 腹部透视

- D. 心电图
- E. 复查血尿淀粉酶

正确答案：E

[单选题]23. 男，69岁，上腹不适伴反酸烧心24年，要确诊胃食管反流病最主要的检查是

- A. 内镜检查及24小时食管pH监测
- B. 上消化道造影及24小时食管pH监测
- C. 食管测压及内镜
- D. 内镜检查
- E. 24小时食管pH监测

正确答案：A

[单选题]24. 女，32岁，入冬以来中上腹不适，并阵发性隐痛，有空腹痛及夜间痛，近2天大便发黑。其可能的诊断是

- A. 急性胃黏膜病变出血
- B. 胃溃疡伴出血
- C. 十二指肠球部溃疡伴出血
- D. 空肠憩室炎伴出血
- E. 胃癌伴出血

正确答案：C

[单选题]25. 女，50岁，8小时前进食涮羊肉，餐后3小时上腹部疼痛，呕吐3次。检查：血压70/40mmHg，心率120次/分，上腹部压痛，肌紧张，血淀粉酶1000U（酶法）。最可能的诊断是

- A. 心肌梗死
- B. 急性重症胰腺炎
- C. 化脓性胆管炎
- D. 急性轻型胰腺炎
- E. 消化性溃疡前壁穿孔

正确答案：B

[单选题]26. 女，53岁，胃溃疡10年。近5个月上腹痛变为无规律，恶心、腹胀、食欲减退，钡餐造影检查：胃窦部可见3.5cm×3.8cm龛影，边缘不齐。便潜血多次阳性。本例可能是

- A. 胃溃疡
- B. 胃溃疡合并胃息肉
- C. 胃溃疡合并慢性胃炎
- D. 胃溃疡癌变
- E. 胃溃疡合并幽门梗阻

正确答案：D

参考解析：

溃疡病患者原来的疼痛规律消失，钡餐示巨大胃溃疡，且边缘不齐，便潜血多次阳性，均提示胃溃疡癌变。胃溃疡癌变发生于溃疡边缘，癌变率在1%以下。

[单选题]27. 为及时明确呕血的原因应选用下列哪种方法

- A. 上消化道双重对比造影
- B. 上消化道内镜检查
- C. 选择性腹腔血管造影
- D. MRI 检查
- E. B 超检查

正确答案：B

[单选题]28. 我国学者发现能治疗消化性溃疡的抗生素是

- A. 阿莫西林（羟氨苄青霉素）
- B. 呋喃唑酮（痢特灵）
- C. 甲硝唑
- D. 四环素
- E. 克拉霉素

正确答案：B

[单选题]29. 我国原发性肝癌的最主要原因是

- A. 黄曲霉素
- B. 酒精性肝硬化
- C. 血色病
- D. 丙型肝炎病毒
- E. 乙型肝炎病毒

正确答案：E

[单选题]30. 下类哪项有助于 Crohn 病的诊断

- A. 环形溃疡
- B. 连续型病变
- C. 全层性炎症，瘘管形成
- D. 病理发现隐窝脓肿
- E. 病理发现干酪性肉芽肿

正确答案：C

[单选题]31. 下述病理改变属于急性肝功能衰竭改变的是

- A. 大脑皮质变薄
- B. 大脑神经元消失
- C. 大脑神经纤维消失
- D. 无明显解剖异常，可有继发脑水肿
- E. 大脑和小脑灰质以及皮质下组织的原浆星形肥大细胞增多

正确答案：D

[单选题]32. 下述哪项不是肠结核的常见临床表现

- A. 便秘
- B. 腹痛
- C. 血便
- D. 低热
- E. 腹块

正确答案：C

[单选题]33. 下述哪项指标对溃疡性结肠炎病情轻重的判断无帮助

- A. 血白细胞
- B. 血色素
- C. 白蛋白
- D. 大便次数
- E. 体温

正确答案：A

[单选题]34. 下述哪一种反流不会产生食管黏膜损害

- A. 胃酸
- B. 胃蛋白酶
- C. 非结合胆酸
- D. 胰酶
- E. 胃黏液

正确答案：E

[单选题]35. 下述哪一种因素不会引起食管黏膜抵抗力降低

- A. 抽烟
- B. 饮酒
- C. 浓茶
- D. 紧张
- E. 口服前列腺素制剂

正确答案：E

[单选题]36. 下述有关结核感染腹膜的主要途径正确的是

- A. 结核病灶直接蔓延
- B. 腹腔内淋巴结转移
- C. 血行播散为主
- D. 和结核患者接触
- E. 以上均正确

正确答案：A

[单选题]37. 下述有关结核性腹膜炎的分型，哪种说法不正确

- A. 渗出型
- B. 粘连型
- C. 增殖型

- D. 干酪型
- E. 混合型

正确答案：C

[单选题]38. 下述有关结核性腹膜炎的说法，正确的是

- A. 由牛结核分枝杆菌引起的慢性局限性腹膜感染
- B. 本病可见于任何年龄，以中老年多见
- C. 女性多见，男女比例为1：2
- D. 多由血行播散引起
- E. 常伴有结核性脑膜炎

正确答案：C

[单选题]39. 消化性溃疡急性穿孔最常见的部位是

- A. 胃体
- B. 胃小弯
- C. 幽门管
- D. 十二指肠前壁
- E. 胃角

正确答案：D

[单选题]40. 一位因发热住院患者经检查发现存在以下问题，哪项最支持其存在门脉高压症

- A. 脾大
- B. 肝大
- C. 痔核
- D. 食管下段静脉曲张
- E. 腹水

正确答案：D

[单选题]41. 有关Hp感染，下列哪种说法不正确：

- A. Hp是I类致癌因子
- B. 胃癌患者中Hp感染率最高
- C. Hp阳性的低度恶性MALT淋巴瘤在根除Hp后，病变可消退
- D. Hp阳性的功能性消化不良患者，根除Hp后不一定症状改善
- E. Hp能引起急性糜烂性胃炎

正确答案：B

[单选题]42. 原发性肝癌的病理学大体形态分型中，最常见的是

- A. 小癌型
- B. 外生型
- C. 块状（巨块）型
- D. 弥漫型
- E. 结节型

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/775111140220011323>