2017 年医疗卫生系统招聘考试《医学基础知识》真题及详解

2017 年医疗卫生系统招聘考试《医学基础知识》真题

(总分 100,考试时间 120 分钟)

一、单项选择题

每题 1 分，共 50 分。

1.钙的生理作用不包括

A 降低毛细血管和细胞膜的通透性

B 降低神经肌肉的兴奋性

C 参与能量代谢

D 参与肌肉收缩和细胞的分泌作用

答案:C

钙的生理作用包括：降低毛细血管和细胞膜的通透性；降低神经肌肉的兴奋性；参与肌肉收缩和细胞的分泌作用；血浆中钙离子参与凝血过程等。

2.检查发现患者体型瘦长，胸廓前后径不及左右径的一半，应考虑为

A 桶状胸 B 鸡胸 C 扁平胸 D 漏斗胸

答案:C

桶状胸常见于肺气肿；胸骨向前隆起，前后径大于左右径称之为鸡胸；扁平胸为胸廓呈扁平状，其前后径不及左右径的一半；漏斗胸的外形特征为前胸凹陷，肩膀前伸，略带驼背以及上腹突出。

3.内麦粒肿是（）的病变

A 汗腺 B 睑板腺 C Zeis 腺 D Moll 腺

答案:B

麦粒肿又称针眼、睑腺炎，是睫毛毛囊邻近的皮脂腺或睑板腺的急性化脓性炎症。麦粒肿分为内麦粒肿和外麦粒肿两型：外麦粒肿为 Zeis 腺（蔡氏腺）的急性化脓性炎症；内麦粒肿为睑板腺的急性化脓性炎症。

4.胰腺癌大多起源于

A 腺管上皮细胞 B 导管细胞癌 C 胰体癌 D 胰泡细胞癌

答案:A

胰腺癌是一种恶性程度很高，诊断和治疗都很困难的消化道恶性肿瘤，约 90%为起源于腺管上皮的导管腺癌。

5.下列各项属于高渗性脱水患者尿液特点的是

A 尿量增多，尿相对密度增高

B 尿量减少，尿相对密度增高

C 尿量增多，尿相对密度降低

D 尿量减少，尿相对密度降低

答案:B

高渗性脱水又称原发性缺水。当缺水多于缺钠时，细胞外液渗透压增加，抗利尿激素分泌增多，肾小管对水的重吸收增加，尿量减少，尿比重>1.020。

6.癫痫大发作时治疗首选

A 地西泮静脉注射 B 乙琥胺 C 卡马西平 D 苯妥英钠

答案:D

癫痫大发作时治疗首选苯妥英钠。苯妥英钠对超强电休克、惊厥的强直相有选择性对抗作用，而对阵挛相无效或反而加剧，故其对癫痫大发作有良效，而对失神性发作无效，甚至诱发或加重。

7.食物中蛋白质生物学价值的高低首要取决于

A 是动物蛋白还是植物蛋白

B 蛋白质的绝对含量

C 蛋白质与脂肪的比值

D 必需氨基酸含量与比值

答案:D

食物中蛋白质生物学价值的高低主要取决于蛋白质中必需氨基酸含量与比值。

8.药物惯性是指

A 某药物对某一特定人群的疗效较好

B 服药一段时间后才能发挥药效

C 长期反复使用某药物后，患者对该药物产生欣快感

D 历久反复利用某药物，一旦停药后会感到不适

答案:D

药物气性指反复利用某药，一旦停止后会感到不适，并不会出现严峻的病理状态。而成瘾性则是由于历久反复利用某些药物后，患者对该药物产生欣快感。

9.患者静滴青霉素时突发晕厥，皮肤湿冷，脉搏不成扪及，首选的抢救药物是

A 糖皮质激素 B 肾上腺素 C 硝普钠 D 阿托品

答案:B

青霉素过敏首选的抢救药物是肾上腺素。

10.原发性肝癌中哪一种肉眼类型常不合并肝硬化或硬化较轻

A 弥漫型 B 结节型 C 外生型 D 巨块型

答案:A

原发性肝癌肉眼类型包括弥漫型、结节型、巨块型。其中弥漫型通常不合并肝硬化或硬化较轻。

11.普通腹水量需达到多少量，方可清楚地叩出移动性浊音

A 100mlB 500mlC 1000mlD 2000ml

答案:C

腹水量需达到 1000ml 时，可以叩诊出移动性浊音。

12.治疗肺炎球菌肺炎首选

A 林可霉素 B 克林霉素 C 庆大霉素 D 青霉素 G

答案:D

治疗肺炎球菌肺炎首选青霉素 G。

13.中央型肺癌胸片检查的直接征象是

A 局限性肺气肿 B 肺门块影，分叶 C 阻塞性肺炎 D 肺不张

答案:B

中央型肺癌初期 X 线胸片无明显现象，发展到中晚期后表现为肺门肿块及支气管阻塞改变。肺门肿块呈球形、椭圆形或不划定规矩状，边缘普通清楚，可有分叶。归并阻塞性肺炎及肺不张者边缘毛糙或不清楚。

14.十二指肠溃疡的压痛点常在

A 脐部偏左上方 B 脐部偏左下方 C 脐部偏右上方 D 脐部偏右下方

答案:C

十二指肠溃疡的压痛点常在脐部偏右上方。

15.下列选项中，属于长效糖皮质激素的是

A 倍他米松 B 可的松 C 氢化可的松 D 泼尼松龙

答案:A

糖皮质激素类药物根据其血浆半衰期分短、中、长效三类。临床常用的糖皮质激素药物有：短效激素：氢化可的松、可的松；中效激素：泼尼松、泼尼松龙、甲泼尼松龙、曲安西龙；长效激素：地塞米松、倍他米松等。

16.下列选项不属于癌前病变的是

A 结肠多发性息肉 B 结核球 C 纤维囊性乳腺病 D 黏膜白斑

答案:B

常见的癌前病变有黏膜白斑，慢性子宫颈炎，子宫颈糜烂，乳腺增生性纤维囊性变，结肠、直肠的息肉状腺瘤，慢性萎缩性胃炎，胃溃疡，慢性溃疡性结肠炎，皮肤慢性溃疡，肝硬化。

17.一般不会发生贫血性梗死的器官是

A 心 B 脾 C 肾 D 肠

答案:D

最易发生贫血性梗死的器官是心、脾、肾。

18.XXX 超声的定量阐发不包括

A 瓣口面积的测量 B 血流量的测量 C 心肌质量的测量 D 血流速率的测量

答案:C

多普勒超声的定量阐发包括瓣口面积的测量、血流量的测量、血流速率的测量。

19.血浆游离血红蛋白增高见于

A 血管内溶血 B 自身免疫性溶血性贫血 C 血管外溶血 D 再生障碍性贫血

答案:A

血浆游离血红蛋白增高见于血管内溶血。

20. DIC 导致出血的特征是

A 慢性、反复产生 B 以单一器官出血为多 C 仅见于皮肤癌或血肿 D 广泛的自发性出血

答案:D

DIC 由于大量凝血物质的消耗，导致出血的特征是广泛的自发性出血。

21.根据～5 级肌力分级法，3 级肌力为

A 肌肉可收缩，但不能产生动作

B 肢体能在床上平移，但不能抬起

C 肢体能抗地心引力而抬离床面，但不能匹敌阻力

D 肢体能对抗阻力，但较正常为差

答案:C

肌力的分级：

级肌肉完全麻痹，触诊肌肉完全无收缩力。

1 级仅测到肌肉收缩，但不能发活泼作。

2 级肢体在床面上能水平移动，但不能抵抗自身重力，即不能抬离床面。

3 级肢体能抬离床面，但不能抗阻力。

4 级能作抗阻力动作，但不完全。

5 级正常肌力。

22.患者住院期间因救治无效死亡，完成死亡记录报告

A 应在死亡后立即完成 B 4 小时内完成 C 6 小时内完成 D 24 小时内完成

答案:D

死亡记录报告应当在患者死亡后 24 小时内完成。

23.甲型病毒性肝炎经由过程何种途径流传？

A 经母婴流传 B 经口授播 C 经血流传 D 经密切接触流传

答案:B

甲型病毒性肝炎经口授播。

24.矽肺（硅沉着病）是尘肺（肺灰尘沉着病）中最严峻的一种类型，是由于历久吸入

A 水泥 B 二氧化硅 C 石棉 D 煤炭

答案:B

矽肺是由于长期吸入二氧化硅所致。

25.牵涉痛是指

A 内脏疾病引起相邻脏器的疼痛

B 手术牵拉脏器引起的疼痛

C 神经疼痛向体表投射

D 内脏疾病引起体表某一部位痛苦悲伤或痛觉过敏

答案:D

某些内脏器官病变时，在体表肯定区域产生感觉过敏或痛苦悲伤感觉的现象，称为牵扯痛。

26.治疗帕金森病的最好药物是

A 左旋多巴 B 毒扁豆碱 C 利血平 D 乙酰胆碱

答案:A

治疗帕金森病的最佳药物是左旋多巴。

27.一般肺部叩诊音为

A 鼓音 B 过浊音 C 浊音 D 浊音

答案:D

肺部叩诊正常为清音。肺组织覆盖心脏、肝脏实质脏器部位的叩诊音为浊音。左下胸部，因正常的肺组织与含气的胃泡相重叠，所以叩诊时有一鼓音区。

28.寒战是发热的（）期表现

A 发烧潜伏 B 体温上升 C 高热延续 D 体温下降

答案:B

寒战是发烧的体温上升期的表现，寒战过后，体温升高至最高点。

29.发现肺结核的简便有用办法是

A 查痰 B 查血 C 查尿 D 做心电图

答案:A

发现肺结核的简便有效方法是痰液找到结核抗酸杆菌。

30.最常见的肠梗阻是

A 机械性肠梗阻 B 动力性肠梗阻 C 血运性肠梗阻 D 麻痹性肠梗阻

答案:A

最常见的肠梗阻是机械性肠梗阻，如肠扭转、肠管粘连等因素所致的机械性肠梗阻。

31.膀胱刺激病症是指

A 尿急、尿痛、血尿 B 尿频、尿痛、排尿困难 C 尿急、尿痛、排尿困难 D 尿频、尿急、尿痛

答案:D

膀胱刺激症状包括尿频、尿急和尿痛。

32.上消化道出血患者粪便典型表现为

A 米泔水样便 B 黏液便 C 柏油样粪便 D 脓血样粪便

答案:C

上消化道出血患者血液经下消化道消耗后，经粪便排出体外，粪便典型表现为柏油样便。

33.面动脉的压迫止血点通常在

A 咬肌前缘与下颌骨下缘交点处

B 咬肌后缘与下颌角处

C 鼻翼外侧

D 口角外侧

答案:A

面动脉的压迫止血点通常在咬肌前缘与下颌骨下缘交点处。

34.急性肾小球肾炎的首要致病菌是

A 金黄色葡萄球菌 B 溶血性链球菌 C 大肠杆菌 D 淋球菌

答案:B

急性肾小球肾炎的主要致病菌是溶血性链球菌。

35.器质性二尖瓣关闭不全的杂音出现于

A 收缩初期 B 收缩中期 C 收缩晚期 D 全收缩期

答案:D

二尖瓣关闭不全左心室收缩期全程出现二尖瓣反流，故产生全收缩期杂音。

36.肺气肿患者胸廓常见为

A 扁平胸 B 畸形胸 C 桶状胸 D 鸡胸

答案:C

肺气肿患者胸廓外形为桶状胸。

37.心电图 ST 段代表

A 心室缓慢复极时的电位变化

B 心室快速复极时的电位变化

C 心房缓慢复极时的电位变化

D 心房快速复极时的电位变化

答案:A

心电图 ST 段是指 QRS 波群 J 点至 T 波开始之间，代表心室缓慢复极过程。

38.现有资料表明，传染性非典型肺炎的主要传染源是

A 传染性非典型肺炎患者

B 果子狸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/775220220232011103