

临床检验选择试题（附参考答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、尿蛋白定量检查应采用

- A、24 小时尿
- B、2 小时尿
- C、1 小时尿
- D、12 小时尿
- E、3 小时尿

正确答案：A

2、夏科-来登结晶可见于

- A、胃溃疡
- B、消化不良
- C、阿米巴痢疾
- D、霍乱
- E、脂肪泻

正确答案：C

3、正常前列腺液呈

- A、乳白色、不透明
- B、无色、透明
- C、红色、浑浊
- D、黄色、浑浊
- E、绿色、不透明

正确答案：A

4、碱性尿的结晶不包括

- A、无定性型磷酸氨盐
- B、尿酸结晶。
- C、磷酸盐结晶
- D、磷酸铵镁结晶
- E、碳酸钾结晶

正确答案：B

5、血液的 pH 值是：

- A、7.00~7.25
- B、6.00~7.00
- C、7.35~7.45

D、5.50~6.50

E、6.80~7.00

正确答案：C

6、静脉采血标本溶血的原因不包括以下那种情况：

A、有组织液混入

B、与水接触

C、容器不洁

D、抽血过快

E、剧烈震荡

正确答案：A

7、属于病理性结晶的是

A、磷酸盐类结晶

B、马尿酸结晶

C、尿酸结晶

D、草酸钙结晶

E、胆红素结晶

正确答案：E

8、血小板计数生理性变化正确的是

A、妊娠中晚期低,分娩后高

B、春季低,冬季高

C、月经后低,月经期高

D、午后低,早晨高

E、静脉血低,毛细血管高

正确答案：B

9、尿中小圆上皮细胞是指

A、表层移行上皮细胞

B、底层移行上皮细胞

C、肾小管上皮细胞

D、底层移行上皮细胞和肾小管上皮细胞

E、中层移行上皮细胞

正确答案：D

10、关于网织红细胞意义的叙述,错误的是

A、骨髓中网织红细胞比外周血中的幼稚

B、通常网织红细胞比成熟红细胞体积大

- C、计数网织红细胞可用煌焦油蓝染色
- D、ICSH 将网织红细胞分为四型
- E、网状结构越多细胞越成熟

正确答案：E

11、对红细胞平均指数描述不正确的是：

- A、高脂血症或白细胞增多症使 MCH 假性增高
- B、仪器法 3 个平均指数都是间接算出
- C、各类患者红细胞平均指数相当稳定
- D、可应用于血液分析仪的质量控制
- E、作为贫血的形态学分类依据

正确答案：B

12、正常人的尿渗量为 $mOsm/kg \cdot H_2O$ ：

- A、500~1500
- B、600~1000
- C、200~800
- D、300~800
- E、500~1300

正确答案：B

13、关于粪便镜检红细胞的叙述，不正确的是

- A、细菌性痢疾红细胞多于白细胞
- B、下消化道炎症可见红细胞
- C、上消化出现难见到红细胞
- D、细菌性痢疾红细胞少于白细胞
- E、阿米巴痢疾红细胞粘连成堆

正确答案：A

14、形成漏出液的常见原因正确的是

- A、主要由水钠储留所致
- B、主要由局部血管内渗透压降低所致
- C、主要由毛细血管静压增高所致
- D、主要由局部血管通透性升高所致
- E、主要由白细胞回流增大所致

正确答案：C

15、正常精液 pH 值为

- A、5.0-6.0

B、6.2-7.2

C、7.2-8.0

D、3.0-4.0

E、4.0-5.0

正确答案：C

16、不符合尿液分析仪十项检测试带内容的是：

A、亚硝酸盐

B、PH

C、比密

D、球蛋白

E、白细胞脂酶

正确答案：D

17、加热后浑浊消失,提示尿液内含有

A、脓细胞

B、磷酸盐

C、尿酸盐

D、碳酸盐

E、细菌

正确答案：C

18、血细胞比容测定法中趋于淘汰的是：

A、比重测定法

B、血液分析仪法

C、粘度法

D、折射计法

E、温氏法

正确答案：E

19、不符合尿液分析仪正确叙述的是：

A、尿葡萄糖检查的特异性不如班氏定性法

B、细胞检查不可替代镜检

C、尿试带法简单、快速、用尿量少

D、尿蛋白测定采用指示剂蛋白误差原理

E、此类仪器采用球面分析仪接受双波长反射光

正确答案：A

20、血涂片中嗜多色性红细胞增多,表示骨髓造血功能

- A、旺盛
- B、正常
- C、低下
- D、恶性变
- E、重度低下

正确答案：A

21、下列有关于尿液试带法检测亚硝酸盐的说法，错误的是：

- A、阴性可排除泌尿系统感染
- B、单纯的亚硝酸盐阳性也须进行显微镜检查
- C、是用于尿路细菌感染的快速筛检试验
- D、尿液中须含有硝酸盐还原酶
- E、体内有适量硝酸盐存在

正确答案：A

22、目前，血液分析仪测定成熟红细胞参数的原理，不包括

- A、电阻抗法
- B、电阻抗法和光散射法
- C、电阻抗法和射频法
- D、流式细胞和鞘流电阻法
- E、流式激光散射法

正确答案：C

23、尿红细胞：

- A、SG
- B、OB
- C、GLU
- D、PRO
- E、NIT

正确答案：B

24、可出现血沉加快的是

- A、多发性骨髓瘤
- B、遗传性球形红细胞增多症
- C、良性肿瘤
- D、心绞痛
- E、真性红细胞增多症

正确答案：A

25、粪便一般检查包括：

- A、外观与隐血检查
- B、外观与化学检查
- C、外观与显微镜检查
- D、化学与显微镜检查
- E、外观与胆色素检查

正确答案：D

26、测定 HCG 特异性最好的试验是：

- A、生物学方法
- B、胶乳凝集抑制试验
- C、单克隆二点酶免疫法
- D、放射免疫法
- E、检孕卡法

正确答案：C

27、正常情况下，肾小球滤过膜只允许相对分子量小于多少的小分子物质通过：

- A、2 万
- B、2.5 万
- C、1 万
- D、1.5 万
- E、5 千

正确答案：D

28、疾病进行期突然出现中性粒细胞核象右移，常表示：

- A、预后良好
- B、有严重感染
- C、骨髓造血功能旺盛
- D、机体抵抗力好
- E、预后不良

正确答案：E

29、有关临床标本采集与处理的叙述错误的是？

- A、血培养一般应在患者发热初期或高峰时采集标本。
- B、脑脊液检查脑膜炎奈瑟菌时如未能及时送检，可将标本保存于四度环境中。
- C、脓汁厌氧培养时，注射器取材后需将空气排空，针头插在菌灭橡皮塞

类。

D、采用导尿管收集尿液要防止逆行感染。

E、自然咳痰法以清晨第一口痰为宜，咳痰前应先用清水漱口。

正确答案：B

30、ICSH 推荐 Hct 检测参考方法是

A、比重计法

B、电阻抗法

C、温氏法

D、放射性核素法

E、折射仪法

正确答案：D

31、检测 HCG 最适宜的标本是

A、随机尿

B、3 小时尿

C、24 小时尿

D、中段尿

E、晨尿

正确答案：E

32、退行性核左移提示：

A、骨髓造血功能旺盛

B、预后良好

C、机体的反应性强

D、骨髓造血功能减低

E、感染程度较轻

正确答案：D

33、异型淋巴细胞增多主要见于

A、急性胰腺炎

B、化脓性胆囊炎

C、各种病毒感染

D、心肌梗死

E、阑尾炎

正确答案：C

34、正常精液的液化时间不应超过

A、10 分钟

- B、5 分钟
- C、30 分钟
- D、60 分钟
- E、15 分钟

正确答案：C

35、hCG 的中文名是

- A、黄体生成素
- B、促甲状腺激素
- C、卵泡刺激素
- D、绒毛膜促性腺激素
- E、催乳素

正确答案：D

36、慢性肾炎病人尿液中不易见到的是

- A、细颗粒管型
- B、脂肪管型
- C、蜡样管型
- D、粗颗粒管型
- E、脓细胞

正确答案：E

37、若怀疑为溶血性贫血不支持诊断的实验室检查是

- A、尿胆红素 (+)
- B、血清总胆红素 ↑
- C、尿胆原 (+)
- D、尿含铁血黄素 (+)
- E、血清结合珠蛋白 ↓

正确答案：A

38、下列有关 Hb 的叙述不正确的是：

- A、Hb 是一种含色素辅基的结合蛋白质
- B、Hb 分布靠近红细胞膜处最高，越往细胞中央越少
- C、铁原子只有处于亚铁状态才能与 O₂ 结合
- D、影响 Hb 合成的激素为红细胞生成素和雌激素
- E、组成 Hb 的多肽链分为 α 和非 α 两大类

正确答案：D

39、镜下脓尿的判断标准

- A、白细胞小于 5 个/HPF，或小于 4000 个/h
- B、白细胞大于 5 个/HPF，或大于 4000 个/h
- C、白细胞小于 5 个/LPF，或小于 4000 个/h
- D、白细胞小于 4000 个/h
- E、白细胞大于 5 个/LPF，或小于 4000 个/h

正确答案：B

40、不属于红细胞异常结构的是

- A、Cabot 环
- B、嗜碱性点彩颗粒
- C、Auer 小体
- D、变性珠蛋白小体
- E、Howell-Jolly 小体

正确答案：C

41、苯丙酮尿症患者尿的特征性气味是：

- A、烂苹果味
- B、老鼠尿臭味
- C、大蒜臭味
- D、芳香气味
- E、腐臭味

正确答案：B

42、丝虫病患者常见：

- A、胆红素尿
- B、乳糜尿
- C、脓尿
- D、肌红蛋白尿
- E、血红尿白尿

正确答案：B

43、正常胃液的 pH 为

- A、3—4
- B、2—3
- C、0.5—1.5
- D、4—5
- E、0.9—1.8

正确答案：E

44、溶血性黄疸时,胆红素代谢的特点是

- A、尿胆原减少
- B、尿胆红素明显阳性
- C、尿胆素减少
- D、血清结合胆红素明显升高
- E、血清非结合胆红素明显升高

正确答案: D

45、保证粪便 OBT 质量的是

- A、同时观察标本的颜色
- B、同时做显微镜检查
- C、同时做阴性和阳性对照
- D、定时留标本
- E、标本采集后立即送检

正确答案: C

46、霍乱:

- A、黄褐色便
- B、绿色稀便
- C、白陶土色便
- D、米泔样便
- E、柏油样便

正确答案: D

47、主要由 T-H 蛋白构成的管型是

- A、蜡样管型
- B、宽大管型
- C、透明管型
- D、结尿管型
- E、细胞管型

正确答案: C

48、干化学尿蛋白试带只适用于检测

- A、糖蛋白
- B、核蛋白
- C、黏蛋白
- D、球蛋白
- E、清蛋白

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/775222222133012002>