

姓名： 科室： 得分：

一、单选题 1、男性，36岁，因肝硬化伴食管静脉破裂出血入院，院前已行三腔二囊管压迫止血，评估中哪项不需要

- A. 精神状态
- B. 病人兴趣
- C. 生命体征
- D. 三腔二囊管牵引效果
- E. 静脉输液情况

2、慢性龈炎时牙龈的炎症表现为

- A. 牙龈粉红色
- B. 牙龈质地坚韧
- C. 探诊易出血
- D. 附着丧失
- E. 牙齿松动

3、下肢动脉粥样硬化最特征的超声表现是（ ）

- A. 管腔内可见多发不均匀回声斑块
- B. 动脉管壁回声增强
- C. 病变血管管壁的正常结构消失
- D. 血管管腔内可见强弱不等的血栓回声

4、粘连型结核性腹膜炎诊断困难时，可考虑

- A. 结肠镜
- B. 腹部CT
- C. 结核菌培养
- D. 腹腔镜
- E. 剖腹探查

5、关于重症急性胰腺炎的发病机制，正确的是

- A. 磷脂酶 A2 引起胰腺出血
- B. 激肽释放酶使血管通透性增强
- C. 弹性蛋白酶引起脂肪坏死
- D. 脂肪酶引起水肿
- E. 核糖核酸酶是以酶原的形式存在的

6、韩某，男，28 岁。经 3 个月语言治疗后，现患者能自发说出“他不去，但我去”，故患者现自发语言到哪个句子水平

- A. 陈述句
- B. 单句
- C. 祈使句
- D. 一重复句（简单语义）
- E. 多重复句（复杂语义）

7、一般需要将提取液进行重蒸馏或加盐重蒸馏的提取方法是

- A. 超临界流体提取法
- B. 回流法
- C. 渗漉法
- D. 水蒸气蒸馏法
- E. 浸渍法

8、患者，女，20 岁。作静脉胆道造影检查时，出现意识淡漠，心悸、出冷汗，口唇发钳，面色苍白，HR 110 次/分，R 25 次/分，BP 60/4 mmHg，应首先选用

- A. 多巴胺
- B. 地塞米松
- C. 异丙嗪
- D. 肾上腺素
- E. 钙剂

9、临床药物治疗恶性肿瘤中非实体瘤的主要方法为

- A. 手术治疗

- B. 化学治疗
- C. 基因治疗
- D. 放射治疗
- E. 免疫治疗

10、不属于果实类的药材是

- A. 五味子
- B. 地肤子
- C. 芥子
- D. 补骨脂
- E. 使君子

11、下面关于胃癌的陈述，哪一条正确

- A. 进展期胃癌一定有淋巴结转移
- B. 早期胃癌一定无淋巴结转移
- C. 病灶直径 <1 cm 称为微小胃癌
- D. Borrmann 氏分型适用于进展期胃癌分型
- E. 弥漫型胃癌起源于肠化生上皮

12、急性阑尾炎右下腹痛产生的机制是由于

- A. 内脏神经反射
- B. 回肠痉挛
- C. 炎症刺激壁层腹膜
- D. 阑尾浆膜充血
- E. 阑尾高度肿胀

13、宫颈癌播散超过真骨盆但无远处转移，按 FIGO 的临床分期，应属

- A. II B 期
- B. III A 期
- C. III B 期
- D. IV A 期
- E. IV B 期

14、青光眼患者的眼内压约在 2.9~5.6kPa 范围，无青光眼者的眼内压约在 1.9~3.5kPa 范围内，若将诊断青光眼的标准由眼内压>2.9kPa 升高到>3.5kPa，会使诊断试验的

- A. 灵敏度升高
- B. 特异度升高
- C. 灵敏度和特异度均升高
- D. 灵敏度和特异度均下降
- E. 不确定，因为不知道患病率情况

15、雷尼替丁抗消化性溃疡的作用是由于

- A. 阻断了组胺 H₂ 体
- B. 阻断了组胺 H₁ 体
- C. 阻断了组胺 H₁ 体、Na⁺ 受体
- D. 抑制了 H⁺，K⁺-ATP 酶
- E. 阻断了 M 胆碱受体

16、心绞痛发作的典型部位是

- A. 心尖区
- B. 心前区向左上臂放散
- C. 胸骨下段后
- D. 胸骨上中后
- E. 剑突下

17、津液代谢与下列哪组脏腑最为密切

- A. 脾、肾、小肠、三焦
- B. 脾、肝、肾、三焦
- C. 肺、肾、三焦、小肠
- D. 肺、脾、肾、三焦
- E. 心、肾、小肠、膀胱

18、下列心律失常处理时可应用兴奋迷走神经的方法纠正的是

- A. 频发室性期前收缩
- B. 心室颤动
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 心房颤动
- E. 阵发性室性心动过速

19、男，40岁，确诊肝硬化1年，近2个月出现乏力、纳差，下列哪项最能表示有门脉高压征

- A. 脾大
- B. 肝大
- C. 蜘蛛痣
- D. 肝掌
- E. 食管下段静脉曲张

20、鼻腔血管收缩药使用最好不超过：

- A. 5天
- B. 7天
- C. 10天
- D. 15天
- E. 21天

21、三焦辨证的创立者是

- A. 叶天士
- B. 吴鞠通
- C. 吴又可
- D. 王孟英
- E. 钱乙

22、人们常称为“头皮”的结构是指

- A. 颅顶部的皮肤
- B. 颅顶部的皮肤和浅筋膜

- C. 皮肤和浅、深筋膜
- D. 皮肤、浅筋膜、帽状腱膜与枕额肌
- E. 由浅入深共 5 层结构

23、下列各项，不属于弦脉所主的病证是

- A. 肝郁
- B. 胃热
- C. 诸痛
- D. 痰饮
- E. 疟疾

24、应用尿激酶超早期溶栓治疗是指脑梗死后多少小时内溶栓

- A. 2小时
- B. 3小时
- C. 4小时
- D. 6小时
- E. 8小时

25、血清非结合胆红素血症是指

- A. 非结合胆红素占血清总胆红素的 80% ~85% 以上
- B. 非结合胆红素占血清总胆红素的 70% ~75% 以上
- C. 非结合胆红素占血清总胆红素的 60% ~65% 以上
- D. 非结合胆红素占血清总胆红素的 50% ~55% 以上
- E. 非结合胆红素占血清总胆红素的 40% ~45% 以上

26、血源性感染的预防，错误的是

- A. 严格无菌操作
- B. 使用抗生素预防
- C. 保持皮肤的完整性
- D. 及时发现、处理感染源
- E. 建立专业化的、固定的医护队伍

27、喉上神经麻痹时主要表现为：

- A. 声带张力丧失，不能发低音，声音细而低
- B. 声带张力丧失，不能发高音，声音粗而弱
- C. 声带内收受限，不能发高音
- D. 声带外展受限，呼吸困难
- E. 声带既不能内收，又不能外展

28、银屑病不侵犯的组织或器官是

- A. 皮肤
- B. 黏膜
- C. 毛发
- D. 关节
- E. 甲

29、女性，40岁，间歇性吞咽困难半年余，食管钡餐X线检查：食管下段可见“半月状”压迹，黏膜完整。该病人最可能的诊断是

- A. 食管平滑肌瘤
- B. 贲门失弛缓症
- C. 食管癌
- D. 食管裂孔疝
- E. 食管腐蚀性灼伤后狭窄

30、关于 MPS I，以下描述不正确的是

- A. 患儿出生后即出现症状
- B. 角膜混浊常见，严重者可致失明
- C. 进行性听力受损，甚至出现耳聋
- D. 生长发育落后
- E. 骨骼改变明显

31、洋地黄中毒伴缓慢性心律失常时首选处理措施是

- A. 人工心脏起搏
- B. 阿托品
- C. 氯化钾
- D. 硫酸镁
- E. 异丙肾上腺素

32、背部高耸呈屋脊状的蛇类药材是

- A. 蕲蛇
- B. 乌梢蛇
- C. 金钱白花蛇
- D. 赤链蛇
- E. 金环蛇

33、股四头肌的作用

- A. 屈膝
- B. 拉髌骨向上
- C. 下肢内旋
- D. 屈髋屈膝
- E. 髋外展

34、下列有关高血压脑病的叙述，错误的是

- A. 各种原因所致的血压突然升高均可引起该病
- B. 血压的绝对值在高血压脑病的发病上并无固定的标准
- C. 迅速降低高血压，不可使病情逆转
- D. 若发病后血压被有效地控制，脑内可不存有永久性病变
- E. 本病最具特征性脑实质变化是微梗死和斑点状出血

35、全口义齿上下后牙是否按正常关系排列，主要取决于

- A. 牙槽嵴横断面的形态
- B. 颌弓大小
- C. 颌弓形态
- D. 上下颌弓的水平关系

E. 上下颌弓的垂直关系

36、交叉性感觉障碍的病变水平位于

- A. 中脑上丘
- B. 中脑下丘
- C. 脑桥
- D. 延髓
- E. 颈髓

37、属于中纵隔的结构是

- A. 气管
- B. 食管
- C. 胸导管
- D. 心
- E. 肺

38、在断指再植的手术指征中，错误的是

- A. 拇指功能最重要，要千方百计再植
- B. 两处以上断离的断指应力争再植
- C. 青年断指者，应尽量设法再植
- D. 小儿断指者，均宜争取再植
- E. 老人断指者，一般应慎重决定再植或不再植

39、泌尿系统梗阻在老年男性患者中，最常见的病因是

- A. 结石
- B. 良性前列腺增生
- C. 肿瘤
- D. 结核
- E. 畸形

40、下列可表示药物的安全性的参数是

- A. 最小有效量
- B. 极量
- C. 治疗指数
- D. 半数致死量
- E. 半数有效量

41、下列急性水肿性胰腺炎的病理改变，错误的是

- A. 病变多局限在体尾部
- B. 胰腺肿胀，充血，被膜下积液
- C. 腹腔内脂肪组织可见散在粟粒状或斑状的黄白色皂化斑
- D. 大量血性腹水
- E. 腹部体征局限在上腹部，无全身性多器官损害

42、川芎茶调散的服用方法是食后清茶调下。关于清茶的作用，以下哪项不正确

- A. 清茶苦寒，清上降下
- B. 芳香走散，助川芎散风邪
- C. 清头目，为方中佐药
- D. 制约诸药温燥辛散太过
- E. 上清头目

43、成年女性乳房位于

- A. 第1~5肋骨水平深筋膜浅、深层之间
- B. 第2~6肋骨水平深筋膜浅、深层之间
- C. 第1~5肋骨水平浅筋膜浅、深层之间
- D. 第2~5肋骨水平浅筋膜浅、深层之间
- E. 第2~6肋骨水平浅筋膜浅、深层之间

44、造成低钾血症的原因中，不包括

- A. 摄入不足与补充不足
- B. 从肾脏排出过多
- C. 胃肠道丧失
- D. 钾向组织内转移

E. 水分丧失过多

45、诃子的作用是

- A. 涩肠止泻、固崩止遗、生肌敛疮
- B. 涩肠止泻、温中行气
- C. 涩肠止泻、敛肺下气、开音
- D. 涩肠止泻、敛肺止咳、止痛
- E. 涩肠止泻、敛肺止咳、和胃安蛔、固崩止血、生津止渴

46、功能凉血止血，善治尿血的药物是

- A. 仙鹤草
- B. 藕节
- C. 白茅根
- D. 小蓟
- E. 大蓟

47、下列不符合 ARDS 病理生理改变特点的是

- A. 严重二氧化碳潴留
- B. 肺顺应性降低
- C. 肺间质水肿
- D. 大量肺分流
- E. 严重低氧血症

48、躯体疾病所致精神障碍处理原则中最重要的是

- A. 积极治疗原发疾病
- B. 对症使用抗精神病药物
- C. 支持治疗
- D. 心理治疗
- E. 加强护理

49、挤压伤不常发生于（ ）

- A. 肺
- B. 心
- C. 膈肌
- D. 空虚的膀胱
- E. 肾脏

50、肝硬化失代偿期的临床表现不包括

- A. 食管胃底静脉曲张
- B. 血小板减少
- C. 肝病面容
- D. 糖尿病发生率增加
- E. 双颊盘状红斑

51、收缩压低于何值可诱发肝损害

- A. 60 mmHg
- B. 65 mmHg
- C. 70 mmHg
- D. 75 mmHg
- E. 80 mmHg

52、久病咳喘，呼多吸少，动则加剧，腰膝酸软，心悸气短，此证属于

- A. 心肺气虚
- B. 肾不纳气
- C. 肺气虚
- D. 肾阳虚
- E. 肾气不固

53、用刺激迷走神经的方法，以下哪项心律失常可纠正

- A. 窦性心律不齐
- B. 房颤
- C. 房扑
- D. 阵发性室上性心动过速
- E. 室性心动过速

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/776054002114011002>