

The background features a traditional Chinese ink wash painting of a misty landscape. It depicts rolling mountains in shades of teal and grey, a winding river with a small boat, and a flock of birds flying in the sky. The overall style is soft and atmospheric. The title text is centered over this background.

最新产后出血预防与处理指南

目录

CONTENTS

01 产后出血的现状

03 产后出血的预防措施

02 产后出血的处理原则

04 不同原因产后出血的处理方式

The background is a traditional Chinese ink wash painting. It depicts a misty landscape with several layers of mountains in shades of blue and green. In the foreground, a small boat with a person is on a body of water. There are also some yellow flowers and a branch on the right side. The overall style is soft and atmospheric. The title text is centered in the upper half of the image.


产后出血的现状

我国孕产妇死亡首要原因



产后出血导致孕产妇死亡

我国孕产妇死亡的首要原因是产后出血，尤其是发生难治性产后出血。



诊断和治疗的延迟

产后出血导致孕产妇死亡的主要原因是诊断和治疗的延迟，错过抢救时机。



重视高危因素和预防处理流程

要降低孕产妇死亡，需要重视高危因素，并遵循科学的预防和处理流程。

近20年产后出血死亡率下降

近20年我国产后出血死亡率持续下降

尽管我国产后出血导致的孕产妇死亡人数仍然较多，但近20年来，通过医疗手段的改善，产后出血的死亡率已经大幅降低。



诊疗及延迟抢救导致产后出血死亡率高

过去，由于诊断和治疗的延迟，使得许多患有产后出血的孕产妇失去了最佳抢救时机，从而导致了较高的死亡率。

积极处理第三产程可降低产后出血风险

第三产程是产后出血的高发时段，因此，积极处理第三产程，可有效降低产后出血的风险，进而降低由此引发的孕产妇死亡风险。

仍有进一步下降空间

产后出血原因及高危因素

子宫收缩乏力、产道损伤、胎盘因素和凝血功能障碍是产后出血的四大原因，其中任何一个因素都可能导致产后出血。

产后出血的诊断与评估

准确估计出血量，重视生命体征监测和SI的变化，及时进行相关实验室检查如血常规、凝血功能等。

产后出血的处理流程

呼救及团队抢救，综合评估及动态监测，尽早针对病因止血，容量复苏及成分输血。

The background features a traditional Chinese ink wash painting of a misty landscape. In the foreground, a small boat with a person is on a river. The middle ground shows several misty mountains, some with small yellow flowers. The background has more distant, hazy mountains and a flock of birds flying in the sky. There are also some decorative orange lines in the upper right and lower left corners.

产后出血的处理原则

早呼救及团队抢救



立即呼救

产后出血一旦发生，要立即呼救，包括求助有经验的产科医师等。



尽早团队抢救

应尽早启动产后出血抢救流程，构建多学科的抢救团队，及时处理。



尽早综合评估及动态监测

对产妇进行早期全面动态监测和评估，包括生命体征、出血量等，避免错过抢救时机。

早评估及动态监测

呼救及团队抢救

一旦发生产后出血，应尽早呼救，组建多学科抢救团队进行处理。

早期综合评估及动态监测

对产妇进行早期全面动态监测，包括出血量、生命体征、SI变化等。

尽早针对病因止血和容量复苏及成分输血

快速找出出血原因并进行针对性止血，同时进行合理的容量复苏和成分输血。

早针对病因止血和容量复苏



01

早呼救及团队抢救

一旦产后出血，应尽早呼救，组成多学科抢救团队进行处理。

02

尽早综合评估及动态监测

对产妇进行早期全面动态评估和监测，包括生命体征、SI的变化、出入量等。

03

尽早针对病因止血和容量复苏

确定出血原因后，应尽快进行有针对性的止血处理和液体复苏。

The background is a traditional Chinese ink wash painting. It depicts a misty landscape with several layers of mountains in shades of blue and green. In the foreground, a small boat with a person is on a body of water. There are also some yellow flowers and birds flying in the sky. The overall style is soft and atmospheric.

产后出血的预防措施

加强产前保健



积极治疗基础疾病

产前应积极治疗基础疾病，充分认识产后出血的高危因素。



提前转诊到有输血和抢救条件的医院分娩

高危孕妇尤其是前置胎盘、胎盘植入性疾病者，应于分娩前转诊到有输血和抢救条件的医院分娩。



加强第三产程的处理

积极处理第三产程能有效减少产后出血量和降低发生产后出血的风险。

积极处理第三产程



尽早呼救及团队抢救

发生产后出血时，要立即呼救并组建多学科抢救团队进行抢救。



尽早综合评估及动态监测

对产妇进行早期全面动态监测，包括生命体征、出血量等，以及基础的实验室检查。



尽早针对病因止血和容量复苏

迅速确定出血原因并进行针对性止血治疗，及时进行合理的容量复苏及成分输血。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/776105050150010202>