

2024 湖南省津市市《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题完整题库带答案（研优卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 对 M3 受体选择性高，可避免心脏及中枢神经系统的严重不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

- A: 奥昔布宁
- B: 索利那新
- C: 托特罗定
- D: 黄酮哌酯

答案：B

2. 伴有痛风的水肿病人，不宜选用下列哪种药物利尿

- A: 氨苯蝶啶
- B: 乙酰唑胺
- C: 阿米洛利
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

3. 以上药物镇咳作用最弱的是

- A: 吗啡
- B: 喷托维林
- C: 右美沙芬
- D: 可待因

答案：B

4. 钙通道阻滞剂的药理作用不包括

- A: 松弛支气管平滑肌
- B: 主要舒张静脉，对动脉影响较小
- C: 抗动脉粥样硬化作用
- D: 抑制血小板活化

答案：B

5. （2015 年真题）下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及抗记忆障碍主要是（）。

- A: 胞磷胆碱
- B: 吡拉西坦
- C: 利斯的明
- D: 多奈哌齐

答案：B

6. 患儿，5 岁。有咽痛、肌肉酸痛、咳嗽，实验室检查为支原体感染；医师处方红霉素治疗。

- A: 静脉滴注速度过快可发生心脏毒性
- B: 常见用药后 10 日出现转氨酶升高
- C: 易被胃酸破坏，临床常用其肠衣片或酯化物
- D: 红霉素广泛分布于各种组织和体液中

答案：D

7. 治疗血吸虫病宜选用

- A: 甲硝唑
- B: 甲苯咪唑
- C: 吡喹酮

D: 氯喹

答案: C

8. 属于抗流感病毒药的是

A: 奥司他韦

B: 恩替卡韦

C: 阿昔洛韦

D: 司他夫定

答案: A

9. 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是

A: 拉米夫定

B: 泛昔洛韦

C: 恩替卡韦

D: 干扰素- α

答案: B

10. 主要用于口服给药的广谱青霉素类是

A: 头孢哌酮

B: 头孢噻肟

C: 庆大霉素

D: 阿莫西林

答案: D

11. 有肾功能不全史的患者解热镇痛应慎用布洛芬，其主要原因是用药后可能发生

A: 尿潴留和水肿

B: 过敏反应

C: 急性肾衰竭

D: 重度肝损伤

答案：A

12. 儿童使用强效激素制剂，连续使用不应超过

A: 3 周

B: 1 周

C: 2 周

D: 4 周

答案：C

13. 在体内可与含羟基或羧基的毒物结合形成低毒或无毒结合物排出体外，起到解毒和保护肝脏的作用，用于急、慢性肝炎治疗的药物是（）

A: 葡醛内酯

B: 腺苷蛋氨酸

C: 硫普罗宁

D: 异甘草酸镁

答案：A

14. 与碳酸氢钠等碱性药物并用，能引起尿液及粪便变色的是

A: 乳果糖

B: 开塞露

C: 聚乙二醇 4000

D: 酚酞

答案：D

15. 属于白三烯受体阻断剂的是

A: 乙酰半胱氨酸

- B: 孟鲁司特
- C: 奥关拉唑
- D: 右美沙芬

答案：B

16. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 可使用大环内酯类药物如红霉素
- B: 依诺沙星可抑制茶碱代谢
- C: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小
- D: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用

答案：A

17. 属于低危患者可应用 PDE5 抑制剂的是

- A: 中度的充血性心力衰竭
- B: 轻度、稳定型心绞痛
- C: 高血压未得到控制者
- D: 2 周前发生过心肌梗死或脑卒中

答案：B

18. 抑制排卵避孕药的较常见不良反应是

- A: 多毛、痤疮
- B: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌
- C: 肾功能损坏
- D: 子宫不规则出血

答案：D

19. 头孢曲松

- A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- C: 肾毒性较大
- D: 用于非典型病原体感染

答案：A

20. 低度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

- A: 奥美拉唑+口服地塞米松
- B: 5-HT
- C: 每日化疗前，应用 5-HT
- D: 5-HT

答案：C

21. 可引起锥体外系反应的药物是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 雷尼替丁
- C: 甘草酸二铵
- D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：A

22. 长期大量服用维生素 A 会出现()

- A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、体重减轻、贫血、眼球突出等中毒现象
- C: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- D: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

答案：B

23. (2021 年真题) 若无禁忌证，治疗 2 型糖尿病首选的口服降糖药物
()

- A: 达格列净
- B: 二甲双胍
- C: 沙格列汀
- D: 吡格列酮

答案：B

24. 属于胸苷酸合成酶抑制剂

- A: 氟尿嘧啶
- B: 放线菌素
- C: 紫杉醇
- D: 顺铂

答案：A

25. 属于碳酸酐酶抑制剂的药物是

- A: 奥布卡因
- B: 阿托品
- C: 拉坦前列素
- D: 乙酰唑胺

答案：D

26. (2016 年真题) 易发生持续性干咳不良反应的药品是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 硝酸甘油
- C: 福辛普利
- D: 硝苯地平

答案：C

27. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用()

- A: 2%酚甘油滴耳液
- B: 2%过氧化氮溶液
- C: 3%酚甘油滴耳液
- D: 3%过氧化氢溶液

答案：D

28. 氟西汀用于治疗神经性贪食症，成人每日用量为

- A: 60mg
- B: 100mg
- C: 50mg
- D: 20mg

答案：A

29. 为光学异构体的氟喹诺酮类药物是()

- A: 氯霉素
- B: 磺胺嘧啶
- C: 呋喃妥因
- D: 左氧氟沙星

答案：D

30. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的调节血脂药是()

- A: 辛伐他汀
- B: 非诺贝特
- C: 烟酸
- D: 依折麦布

答案：A

31. (2015 年真题) 单纯饮食控制及体育锻炼无效的 2 型糖尿病肥胖者首选的降糖药是 ()。

- A: 格列美脲
- B: 二甲双胍
- C: 瑞格列奈
- D: 普萘洛尔

答案: B

32. 主要抑制排卵的短效口服避孕药是 ()

- A: 复方炔诺酮
- B: 丙酸睾酮
- C: 苯丙酸诺龙
- D: 炔诺酮

答案: A

33. 可影响胞浆膜通透性，引起细胞内重要物质外漏的药物是

- A: 多黏菌素
- B: 特比萘芬
- C: 环丙沙星
- D: 庆大霉素

答案: A

34. 可抑制花生四烯酸转化为白三烯 ()

- A: 过氧苯甲酰
- B: 异维 A 酸
- C: 阿达帕林
- D: 维 A 酸

答案：C

35. 喹诺酮类药物作用机制

- A: 干扰细菌核酸代谢
- B: 抑制细菌细胞壁合成
- C: 抑制细菌糖代谢
- D: 抑制细菌蛋白质合成

答案：A

36. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药的是()。

- A: 阿瑞吡坦
- B: 托烷司琼
- C: 维生素 B
- D: 甲氧氯普胺

答案：D

37. 长期使用可能导致血钾升高的降压药物是

- A: 硝普钠
- B: 贝那普利
- C: 氨氯地平
- D: 美托洛尔

答案：B

38. 高血压伴消化性溃疡患者不宜选用的药物是()

- A: 卡托普利
- B: 普萘洛尔
- C: 哌唑嗪
- D: 利血平

答案：D

39.（2019 年真题）患者，女，52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日 1 次，每次 2mg。

- A: 血脂异常
- B: 泌尿系统感染
- C: 骨质疏松症
- D: 血栓性静脉炎

答案：D

40.（2018 年真题）关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法，错误的是（）

- A: 甲硝唑有致突变和致畸作用
- B: 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深
- C: 甲硝唑半衰期比奥硝唑短
- D: 甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物

答案：D

41. 可使人体对维生素 B

- A: 异烟肼
- B: 糖皮质激素
- C: 丙磺舒
- D: 雌激素

答案：C

42. 利福平可促进雌激素的代谢或减少其肠肝循环，降低口服避孕药的作用，导致月经不规则，月经间期出血和计划外妊娠。所以，患者服用利福平时，应改用其他避孕方法。

- A: 药理作用拮抗
- B: 后者血药浓度下降，药效降低
- C: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- D: 不良反应叠加

答案：B

43. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化()

- A: 维 A 酸
- B: 异维 A 酸
- C: 过氧苯甲酰
- D: 阿达帕林

答案：B

44. 不可用于降低眼压的药物是

- A: 拉坦前列素滴眼剂
- B: 利福平滴眼剂
- C: 卡替洛尔滴眼剂
- D: 毛果芸香碱滴眼剂

答案：B

45. 大剂量具有抗雄激素作用,可用于子宫内膜癌或肾癌的药物是

- A: 甲羟孕酮
- B: 环丙孕酮
- C: 地屈孕酮
- D: 屈螺酮

答案：B

46. 与硝酸酯类药物联合应用发生严重低血压的药物是

- A: 西地那非
- B: 坎利酮
- C: 去甲肾上腺素
- D: 丙酸睾酮

答案：A

47. 奥司他韦对下列哪种病毒有效

- A: 疱疹病毒
- B: 甲型肝炎病毒
- C: 巨细胞病毒
- D: 甲型、乙型流感病毒

答案：D

48. （2019 年真题）患者，女，13 岁，有哮喘病史，半年前月经初潮，周期 28 天经期持续 4-5 天，月经前两天疼痛明显，影响正常的学习和活动，诊断为原发性痛经，适宜该患者使用的缓解痛经的药物是（ ）

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 吲哚美辛栓
- C: 塞来昔布胶囊
- D: 布洛芬片

答案：A

49. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者应禁用

- A: 哌嗪

- B: 奎宁
- C: 替硝唑
- D: 伯氨喹

答案：D

50. 顺铂作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

- A: 慢性淋巴细胞性白血病
- B: 非小细胞肺癌
- C: 纤维瘤
- D: 恶性淋巴瘤

答案：B

51. 铁剂用于治疗

- A: 再生障碍性贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 巨幼红细胞性贫血
- D: 小细胞低血红蛋白性贫血

答案：D

52. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg / d 治疗。

- A: Cr
- B: AST
- C: CK
- D: BUN

答案：C

53. 对女性能促进和维持黄体功能使黄体合成孕激素，对男性能使垂体功能不足者的睾丸产生雄激素，促使睾丸下降和男性第二性征的发育，从妊娠期妇女尿中提取的促性腺激素类药物是

- A: 溴隐亭
- B: 双炔失碳酯
- C: 绒促性素
- D: 戈那瑞林

答案：C

54. 四环素类首选用于()

- A: 鼠疫、土拉菌病
- B: 伤寒、副伤寒
- C: 布鲁菌病
- D: 钩端螺旋体病

答案：C

55. 可用维生素 B12 治疗的疾病是

- A: 缺铁性贫血
- B: 慢性失血性贫血
- C: 神经炎
- D: 再生障碍性贫血

答案：C

56. 纠正细胞内缺钾的是

- A: 胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: A 和 B 均无效
- D: 磺酰脲类

答案：A

57. 对钩虫皮下组织的超微结构破坏严重，导致细胞核消失或破坏、线粒体消失，对其肠管中心层线粒体等结构均有破坏，产生驱虫作用的药物是

- A: 葡萄糖酸锑钠
- B: 氯硝柳胺
- C: 伯氨喹
- D: 三苯双脒

答案：D

58. 主要作用于远曲小管和集合管、直接阻止 Na^+ 通道而抑制 Na^+-K^+ 交换，伴有血钾升高的药物是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 甘露醇
- C: 螺内酯
- D: 乙酰唑胺

答案：A

59. 噻嗪类利尿药略增加 HCO_3^- 的排泄，是因为其可以抑制

- A: 磷酸二酯酶
- B: Na^+-Cl^- 共转运子
- C: 碳酸酐酶
- D: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

答案：C

60. 阿托品 2mg 时，表现出的中毒症状为 ()

- A: 口干、心率加快、瞳孔轻度散大

B: 轻微的心率减慢，略有口干及少汗

C: 心悸、显著的口干、瞳孔扩大，有时出现视物模糊

D: 语言不清、烦躁不安、皮肤干燥发热

答案：C

61. 对抗新产生的血栓应首选

A: 尿激酶

B: 右旋糖酐

C: 华法林

D: 肝素

答案：A

62. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是()。

A: 他莫昔芬

B: 乙烯雌酚

C: 托瑞米芬

D: 氟他胺

答案：D

63. 体内代谢迅速，严重过量导致出血时，可用鱼精蛋白拮抗的药物是

A: 氯吡格雷

B: 肝素

C: 依诺肝素

D: 阿司匹林

答案：B

64. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 2 周
- B: 3 周
- C: 1 周
- D: 4 周

答案：A

65. 较常引起外周神经炎的抗癌药是

- A: 长春新碱
- B: 甲氨蝶呤
- C: 氟尿嘧啶
- D: 巯嘌呤

答案：A

66. 属于雄激素类的是()

- A: 甲羟孕酮
- B: 己烯雌酚
- C: 他莫昔芬
- D: 睾酮

答案：D

67. 用于抗艾滋病病毒的药物是

- A: 拉米夫定
- B: 更昔洛韦
- C: 利巴韦林
- D: 阿昔洛韦

答案：A

68. 易透过血脑屏障用于治疗普通型奈瑟球菌脑脊髓膜炎的药物是

- A: 复方新诺明
- B: 甲氧苄啶
- C: 磺胺多辛
- D: 磺胺嘧啶

答案：D

69. 消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

- A: 吲哚美辛
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 塞来昔布
- D: 阿司匹林

答案：C

70. (2020 年真题) 患者，女，55 岁。经皮冠状动脉介入治疗 (PCI) 术后一直服用他汀类药物，但是低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 未达标，医师增加了他汀类药物的剂量后，患者的 ALT 升至 120U/L，故医师拟恢复原他汀药物的剂量，并联用其他调血脂药，该患者宜联用的药物是

- A: 非诺贝特
- B: 辛伐他汀
- C: 氟伐他汀
- D: 依折麦布

答案：D

71. 需要迅速抗血小板作用时，不能选用的二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂是

- A: 替格雷洛
- B: 替罗非班
- C: 氯吡格雷
- D: 噻氯匹定

答案：D

72. 易通过血脑屏障的抗真菌药物是

- A: 氟康唑
- B: 咪康唑
- C: 酮康唑
- D: 克霉唑

答案：A

73. 小剂量碘主要用于

- A: 抑制甲状腺素的释放
- B: 黏液性水肿
- C: 地方性甲状腺肿
- D: 呆小病

答案：C

74. 抑制微管聚合，阻碍纺锤体的形成

- A: 长春碱
- B: 紫杉醇
- C: 他莫昔芬
- D: 羟喜树碱

答案：A

75. 普通肝素的作用靶点是

- A: 因子 X_a
- B: 因子 IX_a
- C: 凝血酶 III (AT—III)
- D: 因子 II_a

答案：C

76. 关于胶体果胶铋用药教育的说法,错误的是()

- A: 胶体果胶铋使用后口中可能有氨味
- B: 胶体果胶铋使用后大便可能会变黑
- C: 妊娠期妇女禁用胶体果胶铋
- D: 胶体果胶铋宜与牛奶同时服用

答案：D

77. 滴眼后可出现口腔苦味的药物是

- A: 氯霉素
- B: 更昔洛韦
- C: 四环素可的松
- D: 利巴韦林

答案：A

78. 使用羟甲唑啉滴鼻液期间,可能发生的不良反应是

- A: 心率加快
- B: 鼻黏膜充血
- C: 一过性针刺感
- D: 流泪

答案：A

79. 下列抗结核药物中也可以用于治疗麻风病的是()

- A: 异烟肼
- B: 链霉素
- C: 吡嗪酰胺
- D: 利福平

答案: D

80. 下列属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的药物是

- A: 环孢素
- B: 米非司酮
- C: 奥利司他
- D: 黄体酮

答案: C

81. 抑制叶酸合成的抗癌药物是

- A: 环磷酰胺
- B: 甲氨蝶呤
- C: 顺铂
- D: 阿糖胞苷

答案: B

82. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 乙酰唑胺
- B: 呋塞米

C: 吲达帕胺

D: 氨苯蝶啶

答案: B

83. 谷维素适用于

A: 原发性失眠

B: 神经源性尿崩症

C: 急慢性脑功能不全

D: 内分泌失调引起的失眠

答案: D

84. 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162/80mmHg，心率 72 次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

A: 辛伐他汀

B: 双氯芬酸

C: 氨基葡萄糖

D: 碳酸钙 D

答案: B

85. 患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A: 预期性恶心呕吐

B: 爆发性恶心呕吐

C: 急性恶心呕吐

D: 延迟性恶心呕吐

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/776124211054011030>