

2021-2022 年主治医师之消化内科主治 306 真题精选 附答案

单选题（共 55 题）

1、女性，48 岁。1 年来反复于进食后上腹部不适，无明显腹痛，无厌油。查体：消瘦，贫血貌，舌炎。化验：HP（+）。

- A. 胃癌的发生率高
- B. 极少数慢性浅表性胃炎可发展为慢性萎缩性胃炎
- C. 可并发消化性溃疡
- D. 一定会癌变
- E. 常合并肠化生

【答案】 D

2、肠结核

- A. 稀水便伴脐周痛
- B. 稀烂便伴下腹痛
- C. 洗肉水样大便
- D. 腹泻与便秘交替
- E. 血便伴里急后重

【答案】 D

3、胰岛素是由（ ）

- A. 肾上腺髓质分泌
- B. 胰岛 B 细胞分泌
- C. 垂体分泌

- D. 胰岛 A 细胞分泌
- E. 肾上腺皮质分泌

【答案】 B

4、上消化道出血不包括下列哪项病变引起的出血

- A. 胰胆病变引起的出血
- B. 回肠出血
- C. 十二指肠出血
- D. 胃空肠吻合术后的空肠病变出血
- E. 胃出血

【答案】 B

5、男性，20 岁。哮喘重度急性发作前来急诊。体检见张口、端坐呼吸，大汗淋漓，叙述病史仅能说些单词或短语而不连贯。为评价病情，下列体征中哪一项预示病情严重

- A. 两肺广泛高响度哮鸣音
- B. 两肺呼吸音低，偶闻散在哮鸣音
- C. 肋间隙增宽
- D. 肺叩诊过清音
- E. 心脏绝对浊音界缩小

【答案】 B

6、某肺结核患者大咯血致血压突然下降，首选治疗是

- A. 间羟胺 10mg+多巴胺 20mg+0.85%生理盐水 1500ml 静滴
- B. 立即血压监测

- C. 垂体后叶素 5~10 单位+25%葡萄糖 40ml, 缓慢静脉注射
- D. 氨甲苯酸 200mg+25%葡萄糖 20ml, 静脉注射
- E. 输血、补液

【答案】 C

7、重度食管静脉曲张

- A. 未见明显 X 线改变
- B. 食管狭窄与正常食管段过渡、边缘整齐、无钡影残缺征
- C. 食管中下段可见虫蚀样或蚯蚓样充盈缺损
- D. 管腔不规则狭窄、充盈缺损、管壁蠕动消失、黏膜紊乱
- E. 食管下端呈鸟嘴样改变, 黏膜纹尚正常

【答案】 C

8、与原发性肝癌发病最密切的因素是

- A. 病毒性肝炎
- B. 饮用水污染
- C. 肝硬化
- D. 黄曲霉毒素
- E. 寄生虫

【答案】 A

9、有机磷中毒者静脉滴注解磷定的目的是()

- A. 减少毒物吸收
- B. 恢复胆碱酯酶活力

- C. 对抗毒蕈碱样症状
- D. 预防脑水肿
- E. 对抗烟碱样症状

【答案】 B

10、属于反射性呕吐的疾病有

- A. 脑出血
- B. 青光眼
- C. 神经性厌食
- D. 癫痫
- E. 高血压脑病

【答案】 B

11、与遗传因素密切相关的是

- A. 胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤
- B. 结肠癌
- C. 胃息肉
- D. 弥漫型(胃型)胃癌
- E. 食管腺癌

【答案】 B

12、女性，65岁。上腹不适，早饱，暖气，食欲缺乏。胃镜及病理检查诊断：慢性胃炎伴重度异型增生，最主要的治疗方法是

- A. 胃黏膜保护药

- B. 预防性手术
- C. 促胃动力药
- D. 定期胃镜随访
- E. 抑酸药

【答案】 B

13、女性，22岁，反复脓血便半年，左下腹压痛，肠镜检查见距肛门30cm处肠黏膜充血，水肿，呈颗粒状，触之易出血。

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 慢性细菌性痢疾
- C. 克罗恩病
- D. 肠道菌群失调
- E. 肠易激综合征

【答案】 A

14、男性，51岁，间歇性上腹痛10年，持续性并逐渐加重1年，伴食欲不振、腹胀、腹泻，为糊状便，1~3次/日。1年来体重下降5kg。入院查：血压、心肺未见异常。辅助检查：尿糖(-)，尿淀粉酶正常，大便苏丹III染色阳性；B超：胆囊多发结石，胰腺回声不均，胰实质可见0.5cm×0.3cm强回声光团，伴声影，肝脾未见异常。

- A. 胆道疾病史
- B. 糖尿病史
- C. 胃癌
- D. 急性胰腺炎史
- E. 饮酒史

【答案】 C

15、下列不是重型溃疡性结肠炎的诊断标准之一的是

- A. 血清球蛋白 $<30\text{g/L}$
- B. 腹泻 6 次 / 天以上
- C. 血沉 $>30\text{mm/h}$
- D. 脉搏 >90 次 / 分
- E. 血红蛋白 $<75\text{g/L}$

【答案】 A

16、男性，41 岁。近半年来，反复发生左上肢抽搐，每次半分钟左右自行缓解，患者能清晰描述该过程。

- A. 丙戊酸钠
- B. 卡马西平
- C. 乙琥胺
- D. 苯妥英钠
- E. ACTH

【答案】 B

17、钩端螺旋体病在病程缓解的第 3~4 天后，可能出现再次发热(后发热)是因为()

- A. 青霉素治疗后反应
- B. 先后两批病原体侵入
- C. 迟发型变态反应
- D. 再燃
- E. 复发

【答案】 C

18、男性，22 岁。因上呼吸道感染静滴青霉素后，皮肤上见多个紫红片状改变，大小不等，不凸出皮面，按之不褪色，直径约为 6mm。诊断为

- A. 荨麻疹
- B. 充血性皮炎
- C. 血肿
- D. 紫癜
- E. 瘀点

【答案】 D

19、男性，50 岁。咯血 200ml 后突然窒息，应立即采取的措施是

- A. 输血
- B. 吸氧
- C. 去除呼吸道梗阻
- D. 推注垂体后叶素
- E. 静滴呼吸兴奋剂

【答案】 C

20、腓神经麻痹走路呈

- A. 跨阈步态
- B. 慌张步态
- C. 剪刀步态
- D. 醉汉步态

E. 鸭步

【答案】 A

21、细菌性肺炎的病原诊断

A. 痰抗酸染色

B. 痰菌培养

C. 痰革兰染色

D. 痰真菌培养

E. 痰找阿米巴滋养体下列情况应进行何种检查

【答案】 B

22、患者，男，45岁。发热、皮肤发黄2个月。查体：皮肤、巩膜黄染，颈部可见蜘蛛痣，肝肋下3cm，表面不光滑，触痛，肝表面可闻及收缩期血管杂音，脾肋下2cm。化验：WBC $4.2 \times 10^9/L$

A. 肝炎肝硬化

B. 肝脓肿

C. 肝硬化合并胆囊炎

D. 肝硬化合并肝癌

E. 慢性活动性肝炎

【答案】 D

23、肺结核感染途径中错误的是

A. 通过皮肤、泌尿生殖道传染途径也很多见

B. 结核菌主要通过呼吸道传播

C. 次要的传染途径是经消化道进入机体

- D. 传染源主要是排菌的结核患者
- E. 大量毒力强的结核侵袭时易发病

【答案】 A

24、患者，女，右下腹痛 2 年，伴不规则发热、腹泻 1 年。2 年前曾有肛门周围脓肿，既往有磺胺药过敏史，查体无异常。

- A. 克罗恩病
- B. 肠结核
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 结肠息肉
- E. 结肠癌

【答案】 A

25、患者，女，45 岁。慢性腹泻 20 年，排便 3~5 次 / 天，便稀，便前腹痛，排便后缓解。诊断为肠易激综合征。需注意的警戒症状是

- A. 症状与情绪有关
- B. 疼痛剧烈
- C. 出现夜间疼痛
- D. 患者生活质量差，伴发抑郁
- E. 多种药物治疗，效果不满意

【答案】 C

26、有关酸中毒对机体的影响，正确的是

- A. 增强心肌收缩力
- B. 引起低钾血症

- C. 减少组织的氧利用
- D. 氧解离曲线右移
- E. 收缩脑血管

【答案】 C

27、下列哪项不是肝性脑病的病因

- A. 断流手术
- B. TIPS
- C. 原发性肝癌
- D. 中毒性肝炎
- E. 肝硬化

【答案】 A

28、患者，女，57岁。早饱、腹胀1年余，失眠。胃镜：轻度浅表性胃炎，生化全项检查无异常。曾服多种药物均无效果。患者自觉病情严重，精神抑郁。下一步治疗可以选用的药物是

- A. 根除Hp药物
- B. 抑酸药
- C. 消化酶制剂
- D. 抗抑郁药
- E. 胃肠解痉药

【答案】 D

29、糖化血红蛋白A

- A. 1~2周

B. 8~12 周

C. 瞬时

D. 3~4 周

E. 2~3 周

【答案】 B

30、食管癌的最常见的好发部位是

A. 颈段

B. 上段

C. 中段

D. 下段

E. 贲门

【答案】 C

31、ITP 最常见的死因是

A. 脑出血

B. 心源性休克

C. 胃肠道出血

D. 骨髓功能不全

E. 消耗性凝血障碍

【答案】 A

32、患者，男，59 岁。3 周来出现胸痛、咳嗽、低热、呼吸困难。查体：气管左移，右锁骨上淋巴结肿大，右肺叩诊为实音，呼吸音消失。胸穿为血性胸腔积液。为明确诊断，最有意义的检查是

- A. 胸腔积液脱落细胞
- B. 胸腔积液 LDH
- C. 胸腔积液及血清癌胚抗原
- D. 胸腔积液结核菌
- E. 胸腔积液常规

【答案】 A

33、以下哪项最支持慢性肾盂肾炎的诊断

- A. 反复发作的尿路感染史
- B. 尿路感染反复发作伴高血压
- C. 尿路有复杂情况
- D. 影像学检查有局灶粗糙的肾皮质瘢痕
- E. 以上都不对

【答案】 D

34、关于肝硬化腹水形成的因素，不正确的是

- A. 门静脉压力增高
- B. 血浆胶体渗透压下降
- C. 淋巴回流受阻
- D. 原发性醛固酮增多
- E. 心房钠尿肽相对不足

【答案】 D

35、患者，男性，45岁。嗜酒，因呕血与黑便10h来院急诊。否认胃病与肝炎史。体检：腹壁静脉显露，腹部无压痛。有少量腹水，肝脾未满意扪及，血压16 / 10.4kPa(120 / 78mmHg)。

- A. 弥散性血管内凝血
- B. 维生素K缺乏
- C. 凝血因子合成障碍
- D. 毛细血管脆性增加
- E. 肝脏解毒功能不良而致毒性反应
- F. 食管静脉破裂出血

【答案】 A

36、符合溃疡性结肠炎的描述是

- A. 肉芽肿形成
- B. 溃疡圆形或椭圆形，其长轴与肠管相平行
- C. 由金黄色葡萄球菌感染引起
- D. 病变多局限于黏膜和黏膜下层
- E. 形成大量腺瘤性息肉

【答案】 D

37、关于麦氏点的描述，下列正确的是

- A. 右髂前上棘至脐连线的1 / 2处
- B. 脐与右髂前上棘连线中、外1 / 3交界处
- C. 两髂前上棘连线与通过耻骨结节所做垂直线的交点上
- D. 右侧腹直肌外缘平脐处
- E. 左、右髂前上棘连线的右1 / 3处

【答案】 B

38、继发性肺结核不同于原发型肺结核的特点是

- A. 常有高热、乏力
- B. 青少年多见
- C. 常有空洞或干酪样坏死
- D. 一般不排菌
- E. 起病急

【答案】 C

39、甲状腺功能亢进症

- A. 渗透性腹泻
- B. 分泌性腹泻
- C. 渗出性腹泻
- D. 肠运动功能异常性腹泻
- E. 感染性腹泻

【答案】 D

40、十二指肠球部溃疡可出现

- A. 右上腹节律性疼痛，夜间痛和背部疼痛多见且突出
- B. 多为剑突下正中或偏左节律性疼痛
- C. 多为上腹正中或偏右节律性疼痛
- D. 上腹疼痛无典型节律性、呕吐多见
- E. 上腹持续性剧痛、放射至背后

【答案】 C

41、以下不是内分泌系统固有的内分泌腺的是()

- A. 胸腺
- B. 甲状腺
- C. 肾上腺
- D. 垂体
- E. 性腺

【答案】 A

42、女性，71岁，咳嗽，咳痰30年，喘息10年，加重1周，2天来嗜睡。查体：球结膜水肿，口唇发绀。BP170/90mmHg，R28次/分，脉搏90次/分，双肺干湿性啰音，双下肢呈可凹性水肿

- A. 感染中毒性脑病
- B. 高血压脑病
- C. 肺性脑病
- D. 脑血管意外
- E. 高渗昏迷

【答案】 C

43、肺炎链球菌肺炎治疗的首选抗生素是

- A. 庆大霉素
- B. 红霉素
- C. 氧氟沙星
- D. 苄星青霉素

E. 林可霉素

【答案】 D

44、患者男，38岁。心悸，PDE检查示左房黏液瘤，该患者心脏听诊可闻及

A. 肿瘤扑落音

B. 收缩早期喷射音

C. 开瓣音

D. 胎心律

E. 心包叩击音

【答案】 A

45、治疗重症胃食管反流病的首选药物是

A. 奥美拉唑

B. 莫沙必利

C. 丙谷胺

D. 氢氧化铝

E. 雷尼替丁

【答案】 A

46、男性，45岁，2年来劳累时胸闷、心悸，含硝酸甘油效果差。查体：血压130/80mmHg(17.3/10.7kPa)。心界大，IgE正常，心率80次/分，律齐，心尖部可闻及S

A. 肥厚性心肌病梗阻型

B. 肥厚性心肌病非梗阻型

C. 冠心病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/776243035011011011>