

@精品辅导-只做好题

备考辅导系列

重点难点梯次总结汇编
精华考点合理提炼编排
不同模块全面备考提升
精选真题发现考试规律
章节训练逐一击破短板
全真模拟精确预测趋势
思维拓展强化考前冲刺

注：请仔细预览文本内容，确认后下载学习资料

@高分一次过

试卷代号：1439

国家开放大学 2021 年秋季学期期末统一考试
临床药理学 试题

2022 年 1 月

一、单项选择题（选择一个最佳选项，每题 2 分，共 80 分）

- 1-临床药理学研究的内容不包括()。
 - A. 临床药效学
 - B. 临床药动学
 - C. 安全性研究
 - D. 剂型改造
 - E. 药物相互作用
2. ()是指同时使用两种或两种以上的药物时药物作用和效应的变化。
 - A. 药物临床疗效
 - B. 药物不良事件
 - C. 药物联合应用
 - D. 药物相互作用
 - E. 药物不良反应
3. 药物不良反应是指()。
 - A. 由于超剂量、错误用药造成的有害反应
 - B. 长期用药造成的慢性中毒反应
 - C. 药物在正常用法用量下出现的有害反应
 - D. 药物引起的“三致”反应
 - E. 合格药物在正常用法用量下出现的不符合用药目的、给患者带来不适或痛苦的有害反应
4. 舌下给药的优点不包括()。
 - A. 舌部血流丰富，吸收药物较快
 - B. 可避免胃肠道及肝对药物的首关效应
 - C. 对药物的破坏少、作用快，特别适合经胃肠道吸收时易被破坏的药物
 - D. 口腔吸收面积小、吸收量有限
 - E. 舌下给药适用于高脂溶性的硝酸甘油
5. 有关药物代谢的描述，错误的是()。
 - A. 所有药物都要经过代谢
 - B. I 相代谢为氧化、还原和水解等反应
 - C. II 相代谢为结合反应
 - D. 不同个体的药物代谢酶活性差异显著
 - E. 酶的诱导剂能促进自身代谢，连续用药可因自身诱导而使药效降低
6. 经人胆汁排泄的药物，对其分子量的阈值要求是()。
 - A. <100
 - B. <200
 - C. <300
 - D. >500 且<5000
 - E. 分子量越小，越容易从胆汁排泄
7. 下列参数中不属于药效学参数的是()。
 - A. 效价强度
 - B. 效能
 - C. 起效时间
 - D. 治疗指数
 - E. 半衰期
8. 关于受体拮抗药的叙述，正确的是()。
 - A. 具有较弱的亲和力，内在活性较强
 - B. 具有较强的亲和力，较强的内在活性
 - C. 对受体有亲和力，但不具有内在活性

- D. 具有较强的亲和力，但内在活性较低
E. 具有较弱的亲和力和较弱的内在活性
9. 关于靶浓度的说法，错误的是()。
- A. 是指根据具体病情和药物治疗的目标效应为具体患者设定的血药浓度目标值
B. 不是大量数据的统计结果
C. 没有绝对的上下限
D. 是大量数据的统计结果
E. 实现靶浓度干预，要充分考虑患者的体重，基因多态性，肝、肾功能状态等多种因素
10. 临床上常开展 TDM 的药物不包括()。
- A. 抗癫痫药
B. 强心苷类
C. 抗心律失常药
D. 免疫抑制药
E. 降糖药
11. 新药的临床前研究不包括()。
- A. 高通量筛选
B. 药效学研究
C. 毒理学研究
D. 人体生物利用度研究
E. 药物的研制
12. 受试者是目标适应证患者，一般要求在 3 个临床试验中心进行研究、最低病例数是 300 例的试验是()。
- A. I 期临床试验
B. II 期临床试验
C. III 期临床试验
D. IV 期临床试验
E. 以上都不对
13. 硫酸鱼精蛋白对肝素的作用属于()。
- A. 竞争作用
B. 化学拮抗作用
C. 相加作用
D. 增强作用
E. 协同作用
14. 甲苯磺丁脲与下列()合用，能够引起低血糖反应。
- A. 苯巴比妥
B. 利福平
C. 甲丙氨酯
D. 肾上腺素
E. 氯霉素
15. ()是指在治疗剂量下出现的与用药目的无关的反应，多因药物的组织选择性低。
- A. 毒性反应
B. 后遗效应
C. 副反应
D. 变态反应
E. 特异质反应
16. 药源性疾病的治疗，错误的是()。
- A. 停用致病药物
B. 排出致病药物
C. 应用药理学拮抗药对抗致病药物
D. 调整治疗方案
E. 注意观察，无需治疗
17. 下列不属于依赖性药物的有()。
- A. 吗啡
B. 甲基苯丙胺
C. 氯胺酮
D. 氢氯噻嗪
E. 乙醇
18. 以下说法错误的是()。
- A. 毒品注射的方式有皮下注射、肌肉注射和静脉注射

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/777021115136006154>