

2023 年-2024 年护师类之主管护师高分通关题型题库附解析答案

单选题（共 45 题）

1、关于月经的叙述，正确的是（ ）。

- A.初潮时多是有排卵型月经
- B.两次月经第一日的间隔时间为一个月经周期
- C.月经周期的长短主要取决于分泌期的长短
- D.正常月经失血量不少于 80mL
- E.月经血是凝固的

【答案】 B

2、最先进入骨盆入口的胎儿部分称

- A.胎方位
- B.胎产式
- C.胎势
- D.胎先露
- E.横产式

【答案】 D

3、初孕妇，29 岁，妊娠 37+3 周，破水 4 小时来急诊室。检查：血压 14/10kPa(110/75mmHg)，头高浮，胎心 100 次/分。对该患者最佳的处理是

- A.立即行 B 超检查
- B.孕妇可自行活动
- C.吸氧，左侧卧位，急诊室观察

D.用平车推送病人到病房住院观察

E.行阴道检查

【答案】 D

4、患者女，30岁。性生活正常，婚后5年未孕，经夫妇双方检查，证实男方一切正常，女方输卵管阻塞经过治疗无效。宜采用（ ）。

A.人工授精

B.IVF-ET

C.配子输卵管内移植

D.宫腔配子移植

E.诱发排卵

【答案】 B

5、女，62岁，有冠心病病史12年一近日在日常劳动如洗衣、买菜时即可出现心悸、气促，休息后好转。患者日常的活动量应该是

A.可以进行正常的日常活动

B.可以进行轻度的活动，但要保证充分的休息

C.避免进行重体力劳动

D.卧床休息为主，但可下床排尿、排便

E.绝对卧床休息，由他人协助生活

【答案】 B

6、食管静脉曲张破裂大出血最常见的症状是（ ）。

A.呕大量鲜红色血液

B.柏油样大便

C.大便潜血试验持续阳性

D.黏液脓血便

E.长期反复解鲜红色血便

【答案】 A

7、断指再植后病人动脉危象表现除外

A.患肢抬高时，皮肤出现花斑

B.指端侧方切开不出血

C.毛细血管充盈时间<1 秒

D.动脉搏动减弱

E.指腹张力下降、塌陷

【答案】 C

8、在妇女一生中，卵泡发育成熟的数目是（ ）。

A.100～200 个

B.200～300 个

C.300～400 个

D.400～500 个

E.500～600 个

【答案】 D

9、患儿，男，2岁，体格瘦小，平日口唇、甲床青紫，活动、哭闹时加重。活动时喜下蹲，经查，诊断为法洛四联症。

A.靴型心

- B.肺门舞蹈征
- C.左心室明显增大
- D.左心房明显增大
- E.肺纹理明显增多

【答案】 A

10、关于胎盘早期剥离，下列叙述正确的是

- A.孕妇贫血程度与阴道出血量成正比
- B.以无诱因、无痛性反复阴道流血为特点
- C.是妊娠早期的一种严重出血性并发症
- D.重型胎盘早剥孕妇的子宫硬如板状，有压痛
- E.确诊后可选择期待疗法或终止妊娠

【答案】 D

11、对于急性大出血及有子宫内膜癌高危因素的病人的治疗原则是

- A.止血、调整周期、促排卵
- B.刮宫术止血
- C.支持疗法
- D.恢复黄体功能
- E.止血、调整周期、减少经量

【答案】 B

12、慢性肺脓肿是指肺脓肿病程超过

- A.2 个月

B.3 个月

C.4 个月

D.5 个月

E.6 个月

【答案】 B

13、有关膀胱造瘘的护理，描述错误的是

A.导管外口敷料每周更换一次

B.口外皮肤消毒后外敷油纱

C.尿袋位置不可高于造瘘口

D.更换尿袋时先放尿后换袋

E.更换内导管时最好在医院内进行

【答案】 A

14、脑血栓形成的病人，早期溶栓是指发病后

A.2 小时

B.6 小时

C.8 小时

D.12 小时

E.18 小时

【答案】 B

15、当社区护士指导居家病人家属如何照顾病人时，扮演的角色是（ ）。

A.照顾者

B.教导者

C.咨询者

D.管理者

E.协调者

【答案】 B

16、1~2 小时

A.宫口扩张期

B.胎儿娩出期

C.胎盘娩出期

D.中期妊娠期

E.晚期妊娠期

【答案】 B

17、重症急性炎症性脱髓鞘性多发性神经根病的主要死亡原因是（ ）。

A.脑疝

B.窒息

C.心力衰竭

D.呼吸肌麻痹

E.呼吸中枢抑制

【答案】 D

18、指导伤寒病人卧床休息至何时方可逐渐增加活动量

A.热退后两周

- B. 发热后-周
- C. 热退后第一天
- D. 热退后一周
- E. 发热后两周

【答案】 D

19、对肺炎球菌肺炎病人的护理措施中哪一项是不妥当的

- A. 气急、发绀可给予鼻导管吸氧
- B. 指导病人按医嘱服药，定期回访
- C. 进行保健指导，以防今后再次发病
- D. 高热者首选使用解热药
- E. 加强营养，增强抵抗力

【答案】 D

20、关于腰椎穿刺术后护理，不正确的是

- A. 密切观察意识、瞳孔及生命体征
- B. 穿刺后去枕平卧 6 小时
- C. 低颅压头痛者可多饮水或静脉输入生理盐水
- D. 颅内压较高者宜多饮水
- E. 及早发现脑疝的前驱症状

【答案】 D

21、有关尖锐湿疣的治疗，错误的是()。

- A. 药物治疗适用于小的病灶

- B.常用药物为三氯醋酸
- C.治疗期间避免性生活
- D.治疗预后好，不易复发
- E.治疗用物、器械应严格消毒

【答案】 D

22、腹部触诊时若腹壁呈揉面感柔韧感，这种情况最多见于

- A.上消化道大出血
- B.急性胰腺炎
- C.结核性腹膜炎
- D.急性胆管炎
- E.急性弥漫性腹膜炎

【答案】 C

23、硬膜外血肿的意识障碍典型变化是

- A.逆行性遗忘
- B.昏迷逐渐变浅至清醒
- C.昏迷不超过 30 分钟
- D.有中间清醒期
- E.持续性浅昏迷

【答案】 D

24、患者男，39 岁。不幸发生车祸，X线片示髌前上棘撕脱性骨折，合理的体位应为（ ）。

- A.伸髋位
- B.屈髋位
- C.健侧卧位
- D.患侧卧位
- E.平卧位

【答案】 B

25、患者，男性，25岁。因受凉后出现干咳，伴有体温升高，胸骨后不适。3天后咳嗽伴有咳痰，痰白质黏。对其护理正确的是

- A.保持病室内空气对流
- B.予以低蛋白、高维生素、高热量饮食
- C.鼓励患者多饮水，保证每天饮水 1500ml 以上
- D.绝对卧床休息
- E.持续低流量吸氧

【答案】 C

26、小儿患上感后，可引起的变态反应性疾病是

- A.败血症
- B.风湿热
- C.胃肠炎
- D.咽后壁脓肿
- E.支气管肺炎

【答案】 B

、患者男，48岁，5日前被诊断为肠梗阻，采用中心静脉输注 TPN 营养液，近日患者感觉有突发胸痛和刺激性干咳，疼痛呈持续性尖锐的刺痛，严重时可有呼吸困难，心率血压无明显改变，该患者最可能出现的情况是（ ）。

- A.气胸
- B.血胸
- C.脓胸
- D.空气栓塞
- E.败血症

【答案】 D

28、以下有关妇科腹部手术病人术后引流管的护理内容应除外

- A.随时观察引流液的性质和量
- B.保持引流管通畅
- C.引流瓶应隔日更换
- D.引流管需要每日更换
- E.每日测体温 3 次，以及早发现感染征兆

【答案】 C

29、原发型肺结核，下列哪项是错误的

- A.多发生于儿童
- B.结核菌可引起淋巴管炎和淋巴结炎
- C.症状多轻微而短暂
- D.原发病灶和淋巴结都不发生干酪样坏死
- E.初次感染部位多在上叶底部、中叶和下叶上部

【答案】 D

30、不属于胸腔穿刺的适应证的是

- A.胸腔积液性质不明者
- B.胸腔大量积液或气胸者
- C.脓胸病人进行抽脓盥洗治疗
- D.胸部肿块进行诊断性穿刺
- E.恶性胸腔积液需胸腔内注入药物者

【答案】 D

31、某孕妇由于妊高症应用硫酸镁治疗，治疗过程中出现膝反射消失，呼吸浅而慢，10次/分，该患者除立即停药外给予下述哪种药

- A.5%葡萄糖液静脉滴注
- B.肌注山莨菪碱
- C.静注 50%葡萄糖液
- D.静注 10%葡萄糖酸钙
- E.静注右旋糖酐-40

【答案】 D

32、患者女性，25岁。平素月经规则。现停经2月余，阴道流血10日。妇科检查：子宫如孕14周大，软，轻压痛，双侧附件区触及5cm囊性包块，壁薄活动好，无压痛。血HCG增高明显。

- A.B超
- B.腹部X线摄片
- C.盆腔CT
- D.血清测定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778005117016006054>