执业兽医资格考试（预防科目）模拟试卷 9 (题后含答案及解析)

题型有：1. A1 型题 2. B1 型题 3. A2 型题 4. A3/A4 型题

1． 维持细菌固有形态的结构是
A．S 层
B．拟核
C．细胞壁
D．细胞膜 E．细胞质

正确答案：C

2． L 型细菌与其原型菌相比，差异的结构是
A．核体
B．质粒
C．细胞膜
D．核糖体 E．细胞壁

正确答案：E

3． 细菌细胞中含量最多的物质是
A．无机盐
B．蛋白质
C．糖类
D．脂类 E．水

正确答案：E

4． 细菌群体生长过程中，对抗菌药物最敏感的时期是
A．静止期
B．迟缓期
C．对数期
D．稳定期 E．衰亡期

正确答案：C

5． 有助于病原菌在动物组织中扩散的细菌产物是
A．内毒素
B．肠毒素
C．细菌素
D．卵磷脂酶 E．色素

正确答案：D

6. 细菌在组织内扩散，与其相关的毒力因子是
A．菌毛
B．荚膜
C．外毒素
D．内毒素 E．透明质酸酶

正确答案：E

7. 无菌室空气消毒常用的射线是
A．紫外线
B．α-射线
C．β-射线
D．γ-射线 E．X-射线

正确答案：A

8. 引起猪肺疫的病原是
A．大肠杆菌
B．副猪嗜血杆菌
C．多杀性巴氏杆菌
D．沙门氏杆菌 E．葡萄球菌

正确答案：C

9. 监测免疫效果最常测定的是
A．特异性抗体水平
B．疫苗抗原含量
C．疫苗稳定性
D．排毒(菌)时间 E．疫苗佐剂含量

正确答案：A

10. 常年用于畜舍熏蒸消毒的消毒剂是
A．来苏儿
B．新洁尔灭
C．季胺盐
D．福尔马林 E．氢氧化钠

正确答案：D

11. 某 4～5 周龄猪群发病，眼睑周围皮下水肿，倒地后四肢划动如游泳状，1～2 天死亡，剖检见胃壁及肠系膜水肿，该病最可能是

A．猪链球菌病
B．李氏杆菌病
C．猪副伤寒
D．猪伪狂犬病 E．仔猪大肠杆菌病

正确答案：E

12．　可用于病毒血清型鉴定的方法是
A．中和试验
B．耐酸性试验
C．耐热性试验
D．乙醚敏感性试验 E．核酸酶敏感性试验

正确答案：A

13．　引起小鹅瘟的病原属于
A．正黏病毒科
B．细小病毒科
C．疱疹病毒科
D．副黏病毒科　E．冠状病毒科

正确答案：B

14．　与多克隆抗体相比，单克隆抗体的优点是
A．稳定性好
B．与抗原的结合力强
C．特异性强
D．针对多种抗原表位 E．制备过程简单

正确答案：C

15．　引起机体发热反应的热原质属
A．单糖
B．核酸
C．多糖
D．氨基酸 E．脂多糖

正确答案：C

16．　参与过敏反应的抗体是
A．IgG
B．IgE
C．IgA
D．IgME．IgD

正确答案：B

17．　属于中枢免疫器官的是
A．脾脏
B．胸腺
C．淋巴结
D．扁桃体 E．哈德氏腺

正确答案：B

18．　切断寄生虫的传播途径不包括
A．使用驱虫药物
B．控制传播媒介
C．圈舍环境消毒
D．粪便无害化处理 E．轮流放牧

正确答案：A

19．　治疗棘球蚴病的药物是
A．硫双二氯酚
B．吡喹酮
C．阿维菌素
D．莫能菌素　E．三氮脒

正确答案：　B

20．　诊断牛弓首蛔虫病常采用的粪便检查方法是
A．肉眼观察法
B．饱和盐水漂浮法
C．毛蚴孵化法
D．幼虫分离法 E．粪便培养法

正确答案：B

21．　治疗马圆线虫病的药物是
A．吡喹酮
B．倍硫磷
C．溴氰菊酮
D．磺胺嘧啶 E．噻苯咪唑

正确答案：E

22．　需颗粒性抗原参与的免疫血清学反应是

A．环状沉淀试验
B．对流免疫电泳
C．火箭免疫电泳
D．直接凝集反应 E．补体结合反应

正确答案：D

23．　可垂直传播的疾病是
A．口蹄疫
B．鸡白痢
C．鸭病毒性肝炎
D．牛流行热 E．犬细小病毒病

正确答案：B

24．　动物出现某病特有症状的感染称为
A．外源性感染
B．内源性感染
C．显性感染
D．隐性感染 E．继发感染

正确答案：C

25．　属于季胺盐类阳离子表面活性剂消毒剂的是
A．福尔马林
B．过氧乙酸
C．新洁尔灭
D．来苏儿 E．菌毒敌

正确答案：C

26．　乙型脑炎的流行病学特点是
A．蚊虫传播、无季节性
B．蚊虫传播、有季节性
C．飞沫传播、有季节性
D．飞沫传播、无季节性 E．垂直传播、无季节性

正确答案：B

27．　布鲁菌 M5 弱毒活疫苗不能用于哪种动物的免疫接种
A．猪
B．牛
C．绵羊
D．山羊 E．鹿

正确答案：A

28． 猪支原体肺炎的流行病学特点是
A．主要通过胎盘传播
B．主要通过精液传播
C．主要通过消化道传播
D．主要通过呼吸道传播 E．外来品种比地方品种更易感

正确答案： D

29． 仔猪断奶衰竭综合征的特征性病理变化是
A．脾脏梗死但不肿大
B．淋巴结肿大 2～5 倍
C．肺双侧对称性肉变
D．纤维素坏死性心肌炎 E．增生性和坏死性肺炎

正确答案： B

30． 用于分离副猪嗜血杆菌的培养基是
A．SS 琼脂
B．马丁琼脂
C．巧克力琼脂
D．鲜血琼脂 E．三糖铁斜面培养基

正确答案：C

31． 非疫区羊群一旦发生蓝舌病，应采取的防控措施是
A．环境消毒
B．治疗发病羊
C．扑杀发病羊群
D．隔离发病羊群 E．紧急免疫接种

正确答案：C

32． 副猪嗜血杆菌病最常见的病理变化是
A．出血性肠炎
B．多发性浆膜炎
C．肾小球肾炎
D．坏死性心肌炎 E．非化脓性脑炎

正确答案：B

33． 疑似牛副结核病病料涂片镜检常用的染色方法是

A．革兰氏染色
B．瑞氏染色
C．抗酸染色
D．姬姆萨染色 E．柯兹洛夫斯基染色

正确答案：C

34．　为避免猪繁殖与呼吸综合征传入猪场，引进猪隔离饲养观察的最短时间是
A．5 天
B．7 天
C．10 天
D．15 天 E．30 天

正确答案：E

35．　鸡传染性喉气管炎病鸡的气管和喉头黏膜上皮细胞内可见
A．胞浆内嗜酸性包涵体
B．胞浆内嗜碱性包涵体
C．胞核内嗜酸性包涵体
D．胞核内嗜碱性包涵体 E．胞浆内和胞核内嗜碱性包涵体

正确答案：C

36．　俗称“大头瘟”的禽病是
A．禽流感
B．鸭瘟
C．鸭病毒性肝炎
D．小鹅瘟 E．禽传染性脑脊髓炎

正确答案：B

37．　小鹅瘟特征性的剖检病理变化是
A．肝肿大、出血
B．小肠黏膜出
C．肺瘀血、出血
D．心内膜及外膜 E．小肠腔内形成状如香肠的栓子

正确答案：E

38．　犬首次接种犬传染病肝炎疫苗的时间一般是
A．1 月龄
B．2 月龄
C．3 月龄

D．4 月龄 E．配种前

正确答案：B

39． 预防猫泛白细胞减少症的首选措施是
A．免疫接种
B．减少应激
C．加强营养
D．抗生素预防 E．注射高免血清

正确答案：A

40． 白僵菌的增殖方式是
A．营养菌丝—节孢子—分生孢子
B．气生菌丝—分生孢子
C．营养菌丝—分生孢子—气生菌丝
D．分生孢子—营养菌丝—气生菌丝 E．营养菌丝—芽生孢子—节孢子—营养菌丝

正确答案：B

41． 动物感染寄生虫后，引起消瘦、营养不良的主要原因是
A．免疫损伤
B．继发感染
C．机械性损伤
D．掠夺宿主营养 E．虫体毒素作用

正确答案：D

42． 犬传染性肝炎病犬常见的体表变化是
A．皮下水肿
B．皮下脓肿
C．被毛脱落
D．皮肤溃疡 E．皮肤干裂

正确答案：A

43． 犬瘟热病的热型是
A．稽留热
B．双相热
C．波型热
D．不规则热 E．回归热

正确答案： B

44．　冠状膜壳绦虫主要感染的动物是
A．鸭
B．鸡
C．牛
D．羊 E．猪

正确答案：A

45．　华支睾吸虫感染终末宿主的发育阶段是
A．毛蚴
B．胞蚴
C．雷蚴
D．尾蚴 E．囊蚴

正确答案： E

46．　从猫粪中排出的弓形虫发育阶段是
A．包囊
B．卵囊
C．裂殖子
D．速殖子 E．配子体

正确答案： B

47．　新孢子虫的中间宿主是
A．牛
B．犬
C．猫
D．鼠 E．狼

正确答案：A

48．　检查隐孢子虫的最佳染色方法是
A．美蓝染色法
B．瑞氏染色法
C．姬姆萨染色法
D．革兰氏染色法　E．齐-尼氏染色法

正确答案： E

49．　引起仔猪皮肤局部出现红斑、丘疹和浮肿的寄生虫是
A．旋毛虫
B．猪蛔虫

C
D．猪球虫 E．兰氏类圆线虫

正确答案：E

50．　诊断疥螨病，通常采取的病料组织是
A．皮肤表面的毛发
B．病变皮肤的毛囊
C．毛囊内容物或皮脂腺
D．健康组织与病变交界处的痂皮 E．病变皮肤的中央痂皮

正确答案：D

51．　日本分体吸虫侵入人和牛、羊等终末宿主皮肤的发育阶段是
A．虫卵
B．毛蚴
C．胞蚴
D．尾蚴 E．童虫

正确答案：D

52．　多头绦虫成虫寄生在犬、狼、狐狸的
A．肝脏
B．肺脏
C．大脑
D．大肠 E．小肠

正确答案：E

53．　猪棘头虫病的主要临床表现是
A．消化功能障碍
B．呼吸功能障碍
C．泌尿系统障碍
D．凝血功能障碍 E．造血功能障碍

正确答案：A

54．　治疗马圆线虫病的药物是
A．吡喹酮
B．倍硫磷
C．溴氰菊酯
D．磺胺嘧啶 E．噻苯咪唑

正确答案：E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/778021103116006033