

2024年辽宁铁岭市卫健委直属医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、支气管哮喘患者出现气流受限的原因不包括（ ）。

- A. 腺体分泌亢进及黏液清除障碍
- B. 气道壁炎症细胞浸润
- C. 肺泡弹性回缩力下降及肺泡壁破坏
- D. 气道平滑肌痉挛
- E. 气道黏膜水肿

【正确答案】

C

【答案解析】

肺泡弹性回缩力下降及肺泡壁破坏属于肺气肿的病理改变。

2、下列疾病中，可不出现梗阻性黄疸的是（ ）。

- A. 肝内胆管结石
- B. 肝门部胆管癌
- C. 胰头癌
- D. 壶腹部肿瘤
- E. 胆总管结石

【正确答案】

A

【答案解析】

肝内胆管结石可多年无症状或仅有上腹和胸背部胀痛不适，常见的临床表现为急性胆管炎引起的寒战高热和腹痛，除合并肝外胆管结石或双侧肝胆管结石外，局限于某些肝段、肝叶的可无黄疸。肝细胞分泌的胆汁，经左右肝管肝总管与胆囊管汇合为胆总管，然后与主胰管汇合共同通路开口于十二指肠降部，故当胆汁流出道受阻时（如胆总管结石、肝门部胆管癌、胰头癌、壶腹部肿瘤等），均会出现梗阻性黄疸。

3、诊断恶性肿瘤的主要依据是（ ）。

- A. 肿瘤局部疼痛
- B. 肿瘤迅速增大
- C. 瘤细胞出现明显异型性
- D. 所属淋巴结肿大
- E. 机体明显消瘦

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

4、10个月的小儿，标准体重是（ ）。

- A. 6.2kg
- B. 7.5kg
- C. 8.8kg
- D. 9.0kg
- E. 9.6kg

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5、下列哪种室性心动过速不宜使用直流电复律治疗？（ ）

- A. 持续性室性心动过速
- B. 特发性室性心动过速
- C. 冠心病伴发室性心动过速
- D. 洋地黄中毒引起的室性心动过速
- E. 心力衰竭伴发的室性心动过速

【正确答案】

D

【答案解析】

室性心动过速可引起室颤发生，如为持续性、特发性或伴有基础疾病（冠心病、心衰）时，需紧急电复律。当发生洋地黄中毒时，予以电复律会诱发室颤，导致猝死。故洋地黄中毒引起的室性心动过速不宜使用直流电复律。

6、治疗伴有潜在性糖尿病的高血压的患者，不宜选用（ ）。

- A. 哌唑嗪
- B. 氢氯噻嗪
- C. 卡托普利
- D. 硝苯地平
- E. 尼莫地平

【正确答案】

B

【答案解析】

噻嗪类药物主要的不良反应包括电解质紊乱，引起低血钾、低血镁、低氯碱血症等，还可引起高尿酸血症，痛风者慎用；代谢性变化可致高血糖、高血脂症，可能是其抑制了胰岛素的分泌以及减少组织利用葡萄糖因而有潜在性糖尿病的高血压患者不宜选用。故本题答案为B项。

7、8个月患儿，腹泻5天，稀水便1日10余次，尿减少，体重5.5kg，皮下脂肪0.4cm，足稍凉，CO₂CP为9mmol/L，血钠128mmol/L，本例脱水程度及性质是（ ）。

- A. 轻度脱水，低渗性
- B. 轻度脱水，等渗性
- C. 中度脱水，等渗性
- D. 中度脱水，低渗性
- E. 重度脱水，低渗性

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

8、动脉导管未闭常引起（ ）。

- A. 左心房、右心房、左心室扩大
- B. 左心房、右心房、右心室扩大
- C. 右心房、右心室扩大
- D. 左心房、左心室扩大
- E. 右心房、右心室、左心室扩大

【正确答案】

D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778052101121006041>