

安徽省相山区整理《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题真题题库及答案【基础+提升】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

- A: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇
- B: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24h 尿量及尿颜色
- C: 肾功能不全者可以使用
- D: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂

答案：C

2. 下述关于甘油的描述，错误的是()

- A: 属于渗透性泻药
- B: 用于便秘的治疗
- C: 孕妇慎用
- D: 属于润滑性泻药

答案：A

3. （2020 年真题）口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

- A: 伐昔洛韦
- B: 昔多福韦
- C: 泛昔洛韦
- D: 喷昔洛韦

答案：A

4. 口服吸收少，用于肠道感染的是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 氧氟沙星
- C: 呋喃唑酮
- D: 甲氧苄啶

答案：C

5. 不属于血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）类药物作用特点的是

- A: ACEI 可引起反射性心率加快
- B: ACEI 类禁用于双侧肾动脉狭窄者
- C: ACEI 对肾脏有保护作用
- D: ACEI 可改善左心室功能

答案：A

6. 患儿。女，14 岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状 2 天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是（）。

- A: 呋喃妥因
- B: 环丙沙星
- C: 青霉素 G
- D: 阿奇霉素

答案：A

7. 对 M3 受体选择性高，可避免心脏及中枢神经系统的严重不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

- A: 索利那新
- B: 黄酮哌酯
- C: 托特罗定

D: 奥昔布宁

答案: A

8. 下列关于 IA 类抗心律失常药物的描述，错误的是

A: 减慢 0 相去极化速度

B: 降低膜反应性

C: 抑制 Na

D: 延长 APD 和 ERP

答案: C

9. 可单独用于原发性高血压的药物是

A: 呋塞米

B: 氢氯噻嗪

C: 甘露醇

D: 螺内酯

答案: B

10. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是

A: 多索茶碱

B: 左氧氟沙星

C: 羧甲司坦

D: 泼尼松龙

答案: C

11. 下列药物中，不能增强他莫西芬活性和疗效的是

A: 氟尿嘧啶

B: 甲氨蝶呤

C: 西咪替丁

D: 长春新碱

答案: C

12. 因为能增强 β -肾上腺素受体阻断药对心脏的抑制作用，所以禁止与普萘洛尔合用的药物是

A: 丁苯酞

B: 倍他司汀

C: 尼麦角林

D: 二甲双胍

答案: C

13. 下列属于 β 受体阻断剂的是

A: 美托洛尔

B: 卡托普利

C: 阿利吉仑

D: 螺内酯

答案: A

14. 甲状腺危象宜选用

A: 普萘洛尔

B: 硫脲类

C: 硫脲类+大剂量碘

D: 甲状腺片

答案: C

15. (2015 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者若长期服用依那普利片，除应监测血压、心、肾功能外。还应监测的指标是 ()。

- A: 血钙
- B: 血钾
- C: 血钠
- D: 血氯

答案：B

16. 治疗伤寒、副伤寒的首选药是

- A: 青霉素
- B: 四环素
- C: 诺氟沙星
- D: 氯霉素

答案：D

17. (2018 年真题) 不易发生“双硫仑样”反应的药物是 ()

- A: 头孢替安
- B: 头孢他啶
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢曲松

答案：B

18. 6~12 个月婴儿甲状腺功能减退症，左甲状腺素每日完全替代剂量为

- A: $5 \mu\text{g} / \text{kg}$
- B: $25 \mu\text{g}$

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 6 μg / kg

D: 4 μg / kg

答案：C

19. 严重肝病时应减量慎用、肾功能减退时可按原治疗量使用的是

- A: 青霉素
- B: 异烟肼
- C: 氟胞嘧啶
- D: 红霉素

答案：D

20. 对抗杆菌属等厌氧菌具有抗菌活性，属于头霉素类的抗菌药物是()。

- A: 头孢吡肟
- B: 氨曲南
- C: 头孢美唑
- D: 亚胺培南

答案：C

21. 患者，女性，40 岁，甲状腺肿大，伴有心悸、多汗、烦躁、消瘦等症状。诊断：甲状腺功能亢进症。

- A: 放射性碘
- B: 格列齐特
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 大剂量碘剂

答案：C

22. 在抗血小板药中，阿司匹林属于()。

- A: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 环氧酶抑制剂

D: 整合素受体阻断剂

答案：C

23. 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

A: 万古霉素

B: 利奈唑胺

C: 阿奇霉素

D: 米诺环素

答案：A

24. 促进尿酸排泄的抗痛风代表药物是

A: 别嘌醇

B: 塞来昔布

C: 扑热息痛

D: 丙磺舒

答案：D

25. 治疗伤寒、副伤寒的首选药物是

A: 红霉素

B: 磺胺嘧啶

C: 青霉素

D: 氯霉素

答案：D

26. (2016 年真题) 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是

A: 替米沙坦

B: 哌唑嗪

C: 坦洛新（坦索罗辛）

D: 依那普利

答案：A

27. 治疗冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛最为有效的药物是()

A: 硝酸异山梨酯

B: 氯沙坦

C: 比索洛尔

D: 氨氯地平

答案：D

28. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

A: 足量阿托品+胆碱酯酶复活药

B: 胆碱酯酶复活药

C: 阿托品+新斯的明

D: 阿托品

答案：A

29. 以下药物中，不属于抗胆碱能扩瞳药的是

A: 东莨菪碱

B: 阿托品

C: 后马托品

D: 新福林

答案：D

30. 患儿，女，8岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

A: 与细菌 30S 核糖体结合，抑制蛋白质合成

- B: 干扰 DNA 的合成
- C: 干扰细菌细胞壁合成
- D: 与细菌 50S 核糖体结合，抑制蛋白质合成

答案：C

31. 雷尼替丁与硫糖铝合用

- A: 减慢药物代谢速度
- B: 出现呼吸抑制或停止
- C: 使后者药效降低
- D: 可升高合用药物的血浆药物浓度

答案：C

32. 有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是()

- A: 聚乙烯醇蓖麻油
- B: 聚氯乙烯
- C: 邻苯二甲酸二辛酯
- D: 乙醇

答案：A

33. 氨苯蝶啶可导致的不良反应是

- A: 高钾血症
- B: 低氯碱血症
- C: 血小板增多
- D: 低血糖

答案：A

34. (2021 年真题) 能抑制外周 (甲状腺外) T4 转化为 T3 的抗甲状腺药物是 ()

- A: 美托洛尔
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 甲巯咪唑
- D: 卡比马唑

答案: B

35. 抑制胸腺核苷酸合成酶

- A: 羟基脲
- B: 氟尿嘧啶
- C: 阿糖胞苷
- D: 甲氨蝶呤

答案: B

36. 糖尿病和胰腺炎血症患者应慎用的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 螺内酯
- C: 甘露醇
- D: 呋塞米

答案: A

37. 睾酮替代治疗的给药方式不包括

- A: 直肠给药
- B: 注射给药
- C: 肠道外给药
- D: 透皮给药

答案: A

38. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 替米沙坦
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 美托洛尔
- D: 埃索美拉唑钠

答案：B

39. 干扰敏感菌有丝分裂，对深部真菌无效的药物是

- A: 灰黄霉素
- B: 氟胞嘧啶
- C: 两性霉素 B
- D: 伏立康唑

答案：A

40. 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：（1）心绞痛急性发作；（2）心功能不全、心功能 III 级；（3）高血压病 3 级；（4）高脂血症。

- A: 阿托伐他汀
- B: 美托洛尔
- C: 氨氯地平
- D: 呋塞米

答案：B

41. 诱导肝微粒体酶、是皮质激素和雌激素药效降低的是()

- A: 利福平
- B: 乙胺丁醇
- C: 异烟肼
- D: 链霉素

答案：A

42. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 16.9×10⁹/L，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体
- B: 莫西沙星对非典型病原体无效
- C: 莫西沙星对厌氧菌有效
- D: 莫西沙星属于氟喹诺酮类

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

43. 肝素的抗凝作用特点

A: 仅在体外有效

B: 体内、体外均有效

C: 仅在体内有效

D: 必须有维生素 K 辅助

答案：B

44. 具有中枢和外周抗多巴胺双重作用的是

A: 西沙必利

B: 甲氧氯普胺

C: 多潘立酮

D: 莫沙必利

答案：B

45. 下述药物可引起药物性鼻炎的是

A: 麻黄碱

B: 硼酸甘油滴耳液

C: 酚甘油滴耳液

D: 过氧化氢溶液

答案：A

46. 糖皮质激素对血液系统的影响不包括

A: 提高纤维蛋白原浓度

B: 减少淋巴细胞

C: 使红细胞含量增加

D: 使血小板数量下降

答案：D

47. (2019 年真题) 选择性沉积在牙齿和骨骼中，不可用于 8 岁以下患儿的药物是 ()

A: 四环素类

B: 氨基糖苷类

C: 氟喹诺酮类

D: 大环内酯类

答案：A

48. 通过分解产生新生态氧而发挥杀菌除臭作用用于治疗痤疮的药物是
()

A: 过氧苯甲酰

B: 壬二酸

C: 维 A 酸

D: 阿达帕林

答案：A

49. 磺酰脲类药物的不良反应不包括

A: 粒细胞减少

B: 口中金属味

C: 诱发甲亢

D: 肝炎

答案：C

50. 不宜口服给药的药物是

A: 普萘洛尔

B: 硝酸甘油

C: 洛伐他汀

D: 硝苯地平

答案：B

51. 壬二酸的作用特点不包括

- A: 可直接抑制皮肤表面的细菌
- B: 对厌氧菌无抑制和杀灭作用
- C: 局部使用能显著减少滤泡内丙酸杆菌的生长
- D: 可竞争性抑制产生二氢睾酮的酶过程

答案：B

52. 可竞争性地与胞浆中的醛固酮受体结合，拮抗醛固酮的保钾利尿药是

- A: 螺内酯
- B: 氢氯噻嗪
- C: 呋塞米
- D: 氨苯蝶啶

答案：A

53. 为碱性染料，能抑制革兰阳性菌和少数革兰阴性菌繁殖，对人无害、无刺激的消毒防腐药是

- A: 聚维酮碘
- B: 氯己定
- C: 依沙吖啶
- D: 过氧乙酸

答案：C

54. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 抑酸作用强大，持续时间长

B: 能有效地抑制夜间基础胃酸分泌

C: 停药后复发率低

D: 很少发生耐药

答案: B

55. 治疗绦虫病的首选药品是()。

A: 伊维菌素

B: 吡喹酮

C: 伯氨喹

D: 哌嗪

答案: B

56. 华法林过量导致的出血可选用的拮抗剂是()

A: 氨甲苯酸

B: 维生素 K

C: 维生素 B

D: 硫酸鱼精蛋白

答案: B

57. 不干扰血小板因子IV和血小板，致血小板减少症风险低，血浆半衰期 21 小时，极少引起出血的抗凝血药是()。

A: 磺达肝葵钠

B: 依诺肝素

C: 阿哌沙班

D: 水蛭素

答案: A

58. (2018 年真题) 可抑制粒细胞浸润和白细胞趋化, 用于痛风急性发作的药物是 ()

- A: 非布索坦
- B: 秋水仙碱
- C: 别嘌醇
- D: 苯溴马隆

答案: B

59. 属于 I B 类抗心律失常药

- A: 利多卡因
- B: 胺碘酮
- C: 普萘洛尔
- D: 奎尼丁

答案: A

60. 可单独或联合用于以胆固醇升高为主的患者, 特别适合作为不能耐受他汀治疗者的替代, 用于原发性高胆固醇血症、纯合子家族性高胆固醇血症、纯合子谷甾醇血症的是

- A: 烟酸
- B: 非诺贝特
- C: 阿昔莫司
- D: 依折麦布

答案: D

61. 关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的错误的是

- A: 若继发细菌或真菌感染, 可与抗菌药或抗真菌药联合使用
- B: 未控制的细菌或真菌感染不宜使用
- C: 面部、阴部和皱褶部分的湿疹, 需长期使用强效制剂

D: 可用于过敏性皮炎的治疗

答案: C

62. 能治疗强心苷中毒引起的窦性心动过缓和房室传导阻滞的药物是

A: 利多卡因

B: 阿托品

C: 洋地黄毒苷

D: 哌替啶

答案: B

63. 静脉注射可以治疗单纯疱疹病毒脑炎，局部可以用于疱疹病毒性角膜炎的药物是

A: 阿昔洛韦

B: 干扰素

C: 阿糖腺苷

D: 奥司他韦

答案: C

64. 下列药物中，与维生素 D 合用能出现高钙血症的药物是

A: 硫酸铝

B: 考来烯胺

C: 氢氯噻嗪

D: 矿物油

答案: C

65. (2018 年真题) 配制静脉输液时;应先用灭菌注射用水溶解,然后用 5%葡萄糖注射液稀释,不可用氯化钠注射液稀释的抗真菌药是 ()

A: 氟康唑

- B: 卡泊芬净
- C: 伏立康唑
- D: 两性霉素 B

答案：D

66. 肥胖型 2 型糖尿病患者首选的降血糖药()

- A: 抑制葡萄糖苷酶
- B: 可促进周围组织细胞(肌肉等)对葡萄糖的利用和抑制肝糖原异生作用
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：B

67. 使用痤疮治疗药物不会出现

- A: 红斑
- B: 皮肤色素沉着
- C: 肝脏氨基转移酶 AST 降低
- D: 眼周局部刺激

答案：C

68. 患儿，女，10 岁，体重 35kg，因发热、咳嗽 10 日而入院。体温波动于 38.5℃~39.5℃之间，咳嗽为刺激性干咳，少痰，以清晨及夜间为著。于外院先后静点青霉素及头孢类抗生素共 6 日，病情无明显好转。查体：一般状态良，双肺呼吸音粗糙，余无阳性体征。血常规正常，结核菌素试验阴性，X 线胸片示右肺中叶大片状阴影。临床诊断考虑为支原体肺炎。

- A: 10 日
- B: 7 日

C: 5 日

D: 12 日

答案: B

69. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A: 4 周

B: 1 周

C: 3 周

D: 2 周

答案: D

70. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

A: 双八面体蒙脱石散

B: 盐酸洛哌丁胺胶囊

C: 地衣芽孢杆菌胶囊

D: 双歧三联活菌胶囊

答案: B

71. 属于抗雌激素类的是()

A: 睾酮

B: 甲羟孕酮

C: 他莫昔芬

D: 己烯雌酚

答案: C

72. (2017 年真题) 具有磺胺类药物结构, 作用于近曲小管的利尿药是 ()

- A: 呋达帕胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 乙酰唑胺
- D: 螺内酯

答案: C

73. 下列药物不属于大环内酯类的是

- A: 大观霉素
- B: 泰利霉素
- C: 罗红霉素
- D: 阿奇霉素

答案: A

74. 物质代谢过程中催化“一碳单位”转移反应的辅酶组成成分是

- A: 维生素 A
- B: 维生素
- C: 维生素 B1
- D: 叶酸

答案: D

75. 下列药物中, 属于抗乙型肝炎病毒的药物是 ()

- A: 阿德福韦酯
- B: 奥司他韦
- C: 喷昔洛韦
- D: 齐多夫定

答案: A

76. 属于延长动作电位时程的抗心律失常药是()

- A: 利多卡因
- B: 维拉帕米
- C: 胺碘酮
- D: 普鲁卡因胺

答案: C

77. (2020 年真题) 可用于治疗绦虫感染的药物是

- A: 氯硝柳胺
- B: 哌嗪
- C: 林旦
- D: 甲硝唑

答案: A

78. 不可用于降低眼压的药物是()

- A: 利福平滴眼剂
- B: 卡替洛尔滴眼剂
- C: 毛果芸香碱滴眼液
- D: 拉坦前列素滴眼剂

答案: A

79. 属于甲状腺激素类药的是

- A: 醋酸去氨加压素
- B: 左甲状腺素
- C: 甲巯咪唑
- D: 生长抑素

答案: B

80. 强心苷中毒引起的室性心律失常，治疗应首选的药物是

- A: 普罗帕酮
- B: 普萘洛尔
- C: 丙吡胺
- D: 苯妥英钠

答案：D

81. 伊曲康唑属于

- A: 吗啉类
- B: 唑类
- C: 抗生素类
- D: 丙烯胺类

答案：B

82. 调血脂药中，升高 HDL-ch 作用最强，且具有降低脂蛋白 a 作用的是

- A: 烟酸
- B: 苯扎贝特
- C: 依折麦布
- D: 阿昔莫司

答案：A

83. 呋塞米的利尿作用部位在()

- A: 髓袢升支粗段
- B: 远曲小管初段
- C: 集合管
- D: 肾小球

答案：A

84. 治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的药物是

- A: 螺内酯
- B: 阿米洛利
- C: 氨苯蝶啶
- D: 甘露醇

答案：A

85. 全身用药可以用于伤寒、副伤寒的酰胺醇类药物是()

- A: 呋喃妥因
- B: 氯霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 复方磺胺甲噁唑

答案：B

86. 红霉素在下列哪种组织中浓度较低

- A: 肝
- B: 肺
- C: 胆汁
- D: 脑

答案：D

87. 舒张支气管作用比 β_2 受体激动剂弱且慢，但不易产生耐受性，适用于有吸烟史的老年哮喘患者的药物是

- A: 噻托溴铵
- B: 孟鲁司特

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 沙丁胺醇

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/778063000005007024>