

2024 年辽宁省西市区《执业药师之西药学专业二》资格考试内部题库附答案（巩固）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2021 年真题）常与 ACEI 联用，在协同降压的同时，兼具防治高钾血症的中效利尿剂是（ ）

- A: 甘油果糖
- B: 乙酰唑胺
- C: 螺内酯
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

2. 防治血栓性疾病如心肌梗死、脑梗死的药物是（ ）

- A: 维生素 K
- B: 香豆素类
- C: 氨甲环酸
- D: 非格司亭

答案：B

3. （2018 年真题）属于膨胀性泻药的是（ ）

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 硫酸镁
- C: 乳果糖
- D: 蓖麻油

答案：A

4. 服用叶酸治疗巨幼细胞贫血，需同时联合使用的药品是()

- A: 维生素 B12
- B: 维生素 B2
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 维生素 B1

答案：A

5. (2015 年真题) 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是()。

- A: 血管内皮生长因子
- B: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原
- C: 人表皮生长因子受体-2
- D: 表皮生长因子受体

答案：C

6. 戈那瑞林的禁忌不包括

- A: 妊娠期妇女
- B: 垂体腺瘤患者
- C: 肝肾病患者
- D: 垂体相关性闭经者

答案：C

7. 可致细胞膜通透性增加，细菌膨胀、溶解死亡的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 替加环素
- C: 多黏菌素
- D: 环丙沙星

答案：C

8. 服用叶酸治疗巨幼红细胞贫血，需同时联合使用的药品是()。

- A: 维生素 B
- B: 维生素 B
- C: 依诺肝素
- D: 维生素 B

答案：D

9. 奥美拉唑治疗消化性溃疡病的机制是()

- A: 阻断 CTZ 的 D
- B: 抑制胃壁细胞的 H
- C: 阻断 H
- D: 抗幽门螺杆菌

答案：B

10. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是

- A: 抑制 Na^+ 内流
- B: 抑制 Ca^{2+} 外流
- C: 促进 K^+ 外流
- D: 促进 Ca^{2+} 内流

答案：A

11. 属于阴道杀精药的是

- A: 氯地孕酮
- B: 左炔诺孕酮
- C: 壬苯醇醚
- D: 米非司酮

答案：C

12. 以下泻药中，半乳糖血症患者禁用的是

- A: 酚酞
- B: 硫酸镁
- C: 液状石蜡
- D: 乳果糖

答案：D

13. 四环素的抗菌作用机制

- A: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成
- B: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性
- C: 影响胞浆膜通透性
- D: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性

答案：A

14. 属于噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂的是

- A: 沙格列汀
- B: 瑞格列奈
- C: 格列美脲
- D: 罗格列酮

答案：D

15. 肝素过量可选用的拮抗药是()

- A: 维生素 K
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 氨基己酸
- D: 鱼精蛋白

答案：D

16. 患者女,32 岁,孕 2 周既往有癫痫病史长期服用卡马西平治疗为防止引起新生儿出血,该患者妊娠晚期应当补充的维生素是()

- A: 叶酸
- B: 维生素 K
- C: 维生素 D
- D: 维生素 B12

答案: B

17. 可用于预防风湿热复发的药物是 ()

- A: 庆大霉素
- B: 甲硝唑
- C: 呋喃妥因
- D: 苄星青霉素

答案: D

18. 巨幼红细胞性贫血可选用()

- A: 叶酸
- B: 肝素
- C: 尿激酶
- D: 维生素 K

答案: A

19. 四环素类抗菌药物抗菌谱广,但无抗菌作用的是

- A: 立克次体
- B: 衣原体
- C: 支原体
- D: 铜绿假单胞菌

答案：D

20. 治疗慢性失血（如内痔出血）所致的贫血应选用

- A: 叶酸
- B: 维生素 B
- C: 谷维素
- D: 硫酸亚铁

答案：D

21. 特比萘芬属于()

- A: 唑类抗真菌药
- B: 棘白菌素类抗真菌药
- C: 多烯类抗真菌药
- D: 丙烯胺类抗真菌药

答案：D

22. 广谱调血脂药物是

- A: 考来烯胺
- B: 氯贝丁酯
- C: 烟酸
- D: 吉非罗齐

答案：C

23. 属于雌激素的是

- A: 尼尔雌醇
- B: 地塞米松
- C: 泼尼松龙
- D: 甲羟孕酮

答案：A

24. 癫痫、帕金森病及精神疾病患者慎用的是

- A: 吲哚美辛
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 塞来昔布
- D: 布洛芬

答案：A

25. 具有预防和逆转血管平滑肌增厚及左心室肥厚的抗高血压药物是

- A: 比索洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氨氯地平
- D: 卡托普利

答案：D

26. 以下不属于地西泮的药理作用的是

- A: 镇静催眠
- B: 抗癫痫
- C: 抗抑郁
- D: 抗惊厥

答案：C

27. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物()

- A: 磺胺米隆
- B: 磺胺嘧啶
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺甲噁唑

答案：C

28. 伏格列波糖的降糖作用机制是

- A: 提高靶组织对胰岛素的敏感性
- B: 直接补充胰岛素
- C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- D: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶

答案：D

29. 属于利胆类保肝药的是

- A: 熊去氧胆酸
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 甘草酸二铵
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：A

30. 可引起眼睛疼痛不适的是

- A: 噻托溴铵
- B: 沙丁胺醇
- C: 喷托维林
- D: 氨溴索

答案：A

31. 通过阻断血管紧张素 II 受体而逆转心肌肥厚，减轻心力衰竭的药物是

- A: 地高辛
- B: 氨力农
- C: 氯沙坦

D: 美托洛尔

答案: C

32. 解热镇痛药的作用机制是

A: 激动中枢阿片受体

B: 抑制尿酸生成

C: 抑制前列腺素合成

D: 激动 M 受体

答案: C

33. 加重洋地黄中毒的易感因素为

A: 伴有房颤的心功能不全

B: 低钾血症

C: 甲状腺功能减退症

D: 低镁血症

答案: C

34. 下列关于升华硫的描述中，错误的是

A: 可用于痤疮、脂溢性皮炎

B: 儿童慎用

C: 不得与铁制品接触

D: 避免接触眼睛和其他黏膜

答案: C

35. 下列氟喹诺酮类抗菌药物中，原形从肾脏排泄率最高的是

A: 氟罗沙星

B: 氧氟沙星

C: 环丙沙星

D: 诺氟沙星

答案: B

36. 用药期间可引起眼泪、尿、粪、痰等呈橘红色的药物是

A: 异烟肼

B: 链霉素

C: 乙胺丁醇

D: 利福平

答案: D

37. (2020 年真题) 患者，女，63 岁。急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入 (PCI) 治疗，术后为预防支架内血栓形成，常与阿司匹林联合使用的药物是

A: 华法林

B: 氯吡格雷

C: 奥美拉唑

D: 双氯芬酸

答案: B

38. 适用于 IIa、IIb 型及家族性杂合子的高脂蛋白血症，但有特殊臭味和刺激性的是

A: 洛伐他汀

B: 烟酸

C: 考普罗布

D: 考来烯胺

答案: D

39. 地高辛与其合用，可使血清地高辛浓度增加 70%~100% 的药物是

- A: 阿托品
- B: 阿利吉仑
- C: 沙库巴曲缬沙坦
- D: 胺碘酮

答案：D

40. 西咪替丁治疗十二指肠溃疡的机制为

- A: 形成保护膜覆盖溃疡面
- B: 阻断胃腺壁细胞上的组胺 H1 受体，抑制胃酸分泌
- C: 中和过多的胃酸
- D: 阻断胃腺壁细胞上的组胺 H2 受体，抑制胃酸分泌

答案：D

41. 治疗勃起功能障碍药的是

- A: 达那唑
- B: 氯地孕酮
- C: 他达拉非
- D: 左炔诺孕酮

答案：C

42. 属于电解质补充药,可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是()

- A: 双环醇
- B: 异甘草酸镁
- C: 多烯磷脂酰胆
- D: 门冬氨酸钾镁

答案：D

43. 下列哪项是避免奥沙利铂的剂量依赖性神经系统毒性，避免出现咽喉痉挛等严重后果的措施

- A: 用生理盐水做溶剂
- B: 禁食热饮热水
- C: 禁食冷饮冷水、接触凉物
- D: 禁止接触塑料制品

答案：C

44. 作用于 DNA 拓扑异构酶 I 的生物碱是

- A: 羟喜树碱
- B: 来曲唑
- C: 甲氨蝶呤
- D: 卡莫氟

答案：A

45. 顺铂所致的肾损害会延缓药物的排泄而导致肾毒性增加，该药物是

- A: 丙磺舒
- B: 甲氨蝶呤
- C: 苯海拉明
- D: 呋塞米

答案：B

46. 匹维溴铵在使用中应注意

- A: 对食管有刺激性，需整片吞服
- B: 糖尿病患者避免使用
- C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗
- D: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

答案：A

47. 心律失常者慎用的治疗浅表真菌感染的药物是

- A: 咪康唑
- B: 两性霉素 B
- C: 益康唑
- D: 制霉菌素

答案：A

48. 下列不属于一线抗结核药的是

- A: 乙硫异烟胺
- B: 链霉素
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案：A

49. 属于 α

- A: 酚妥拉明
- B: 特拉唑嗪
- C: 度他雄胺
- D: 普适泰

答案：B

50. 作用机制为直接抑制破骨细胞的活性，从而抑制骨盐溶解，阻止钙由骨释出，而骨骼对钙的摄取仍在进行，因而可降低血钙；可抑制肾小管对钙和磷的重吸收，血钙也随之下落；对肿瘤骨转移、骨质疏松所致骨痛有明显治疗效果，该药物是

- A: 雷洛昔芬
- B: 骨化三醇

C: 阿仑膦酸钠

D: 降钙素

答案: D

51. 通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上 PBP3 的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

A: 头孢他啶

B: 氨基糖苷类

C: 头孢美唑

D: 头孢噻肟

答案: B

52. 可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是

A: 苯甲酸钠咖啡因

B: 纳洛酮

C: 氟马西尼

D: 阿托品

答案: D

53. 抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

B: 二甲双胍

C: 静脉用胰岛素

D: 胰岛素皮下注射

答案: C

54. 属于前药，在肝脏水解为阿昔洛韦，生物利用度比阿昔洛韦高 3~4 . 5 倍的抗病毒药物是

- A: 阿糖腺苷
- B: 干扰素
- C: 伐昔洛韦
- D: 奥司他韦

答案：C

55. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌的糖肽类抗菌药物是

- A: 克拉霉素
- B: 罗红霉素
- C: 万古霉素
- D: 红霉素

答案：C

56. (2017 年真题) 口角炎可以使用的治疗药物是 ()

- A: 维生素 B1
- B: 维生素 B2
- C: 维生素 A
- D: 维生素 D

答案：B

57. 可能发生不可逆性骨髓功能抑制，应避免重复疗程使用的药物是 ()

- A: 多西环素
- B: 青霉素
- C: 四环素
- D: 氯霉素

答案：D

58. 红霉素的主要不良反应是

- A: 胃肠道反应
- B: 耳毒性
- C: 过敏反应
- D: 肝损伤

答案：A

59. 延长动作电位时程的广谱抗心律失常药物是()

- A: 胺碘酮
- B: 维拉帕米
- C: 美西律
- D: 奎尼丁

答案：A

60. 口服治疗体癣，毛发癣，对深部真菌无效的药物是()

- A: 克霉唑
- B: 咪康唑
- C: 环丙沙星
- D: 灰黄霉素

答案：D

61. 下列属于短效糖皮质激素的是

- A: 泼尼松龙
- B: 泼尼松
- C: 甲泼尼龙
- D: 氢化可的松

答案：D

62. 具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

- A: 维 A 酸
- B: 过氧苯甲酰
- C: 阿达帕林
- D: 异维 A 酸

答案: B

63. 对急需抗凝处理的患者，以下哪种方案最优()

- A: 肝素
- B: 低分子量肝素
- C: 华法林
- D: 华法林+低分子量肝素

答案: D

64. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0. 5g，一日 3 次；阿卡波糖 0. 1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 高钠血症
- B: 高尿酸血症
- C: 高镁血症
- D: 高钾血症

答案: B

65. 因易导致新生儿溶血，妊娠晚期妇女禁用的抗菌药物是（）

- A: 庆大霉素
- B: 呋喃妥因

C: 苜星青霉素

D: 甲硝唑

答案: B

66. 通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是

A: 噻嘧啶

B: 哌嗪

C: 氯喹

D: 青蒿素

答案: B

67. 地高辛的中毒血清浓度为()

A: >5ng/ml

B: >2ng/ml

C: >50ng/ml

D: >20ng/ml

答案: B

68. (2020 年真题) 患者，女，55 岁。经皮冠状动脉介入治疗(PCI)术后一直服用他汀类药物，但是低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)未达标，医师增加了他汀类药物的剂量后，患者的 ALT 升至 120U/L，故医师拟恢复原他汀药物的剂量，并联用其他调血脂药，该患者宜联用的药物是

A: 非诺贝特

B: 辛伐他汀

C: 氟伐他汀

D: 依折麦布

答案：D

69. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药物是

- A: 阿糖胞苷
- B: 甲氨蝶呤
- C: 环磷酰胺
- D: 顺铂

答案：B

70. 具有利胆作用的药物是()

- A: 阿托品
- B: 甲氧氯普胺
- C: 熊去氧胆酸
- D: 肾上腺素

答案：C

71. 阻碍 DNA 合成的药物是

- A: 顺铂
- B: 氟尿嘧啶
- C: 紫杉醇
- D: 高三尖杉酯碱

答案：B

72. 关于 PDE5 抑制剂的代谢动力学，错误的是

- A: 他达拉非代谢物少部分从粪便，绝大部分经肾排泄
- B: 伐地那非对 PDE1 和 PDE6 的选择性是西地那非的 4 倍
- C: 他达拉非的吸收不受油脂性食物的影响
- D: 伐地那非对 PDE5 的选择性是西地那非和他达拉非的 10 倍

答案：A

73. (2021 年真题) 患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是 ()

- A: 硫酸镁
- B: 普芦卡必利
- C: 蓖麻油
- D: 乳果糖

答案：D

74. 下列属于重组人促红素的禁忌证的是 ()

- A: 心律失常
- B: 中性粒细胞减少
- C: 难以控制的高血压
- D: 低血压

答案：C

75. 对滴虫、阿米巴和兰氏贾第鞭毛虫等原虫，以及脆弱拟杆菌等厌氧菌具有强大抗菌活性，为治疗阴道滴虫病的首选药物是

- A: 甲硝唑
- B: 呋喃妥因
- C: 多黏菌素
- D: 克林霉素

答案：A

76. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

A: CYP2E1

B: CYP2D6

C: CYP2C19

D: CYP286

答案：C

77. 存在低度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 表柔比星

B: 多西他赛

C: 卡莫司汀

D: 泼尼松

答案：B

78. 氢氯噻嗪的利尿作用部位在()

A: 远曲小管初段

B: 集合管

C: 肾小球

D: 髓袢升支粗段

答案：A

79. 多巴胺受体阻断物的代表药物为()

A: 格雷司琼

B: 托烷司琼

C: 昂丹司琼

D: 甲氧氯普胺

答案：D

80. 抗心绞痛的首选联合治疗方案是()

A: 长效硝酸酯类+普萘洛尔

B: 维拉帕米+普萘洛尔

C: 短效硝酸酯类+螺内酯

D: 维拉帕米+氢氯噻嗪

答案：A

81. 磺胺类药物的抗菌机制是

A: 改变细菌细胞膜通透性

B: 抑制二氢叶酸还原酶

C: 抑制四氢叶酸还原酶

D: 抑制二氢叶酸合成酶

答案：D

82. 大剂量应用甲氨蝶呤后，可用()进行解救

A: 别嘌醇

B: 丙磺舒

C: 苯溴马隆

D: 亚叶酸钙

答案：D

83. 下列说法中错误的是

A: 芳香氨酶抑制剂主要包括来曲唑和阿那曲唑

B: ER 阳性者，绝经前、后均可使用他莫昔芬

C: 芳香氨酶抑制剂可用于绝经前乳腺癌患者

D: 他莫昔芬是目前临床上最常用的乳腺癌内分泌治疗药

答案：C

84. (2017 年真题) 维 A 酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是 ()

A: 一日一次，睡前使用

B: 一日一次,固定时间使用

C: 一日一次,晨起使用

D: 一日二次,早晚使用

答案: A

85. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者,在服用镇咳药的同时,应及时联合应用的药品是

A: 左氧氟沙星

B: 羧甲司坦

C: 泼尼松龙

D: 多索茶碱

答案: B

86. 羟孕酮与戊酸雌二醇配伍作长效注射避孕药,每月需肌内注射次数

A: 4 次

B: 1 次

C: 3 次

D: 2 次

答案: B

87. 青霉素在体内的主要消除方式是

A: 肝脏代谢

B: 肾小球滤过

C: 肾小管分泌排泄

D: 被血浆酶破坏

答案: C

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/778063103115007022>