专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年福建省金门县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题题库及答案（夺冠）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.Ⅱ期临床试验很难发现"低于1%发生频率"的不良反应，缘于

A：管理漏洞

B：病例数目少

C：考察不全面

D：观察时间短

答案：B

2.癫痫持续状态首选的药物是

A：卡马西平

B：丙戊酸钠

C：地西泮

D：拉莫三嗪

答案：C

3.抗凝治疗

A：巴曲酶

B：阿替普酶

C：低分子肝素

D：阿司匹林

答案：C

4.主要用于吗啡、哌替啶急性中毒解救的是

A: 亚硝酸钠

B: 双解磷

C: 盐酸烯丙吗啡

D: 谷胱甘肽

答案：C

5.可作为急性胰腺炎的症状指标是

A: 磷酸激酶升高

B: 淀粉酶升高

C: 磷酸激酶降低

D: 淀粉酶降低

答案：B

6.用于估算透析清除率的是（）

A: CLHD公式

B: CoCkroft-GAut公式

C: CoChrAnE分级

D: NCEMERP标准

答案：A

7.下列药物中，不属于抗风湿药的为

A: 透明质酸钠

B: 金诺芬

C: 硫唑嘌呤

D: 甲氨蝶呤

答案：A

8.(抗高血压药物的不良反应)，服用维拉帕米可能引起

A：免疫失调

B：房室传导阻滞

C：多毛症

D：直立性低血压

答案：B

9.抗感冒药中具有“使鼻黏膜血管收缩、解除鼻塞症状”作用的成分是

A：双氯芬酸

B：天麻素

C：伪麻黄碱

D：金刚烷胺

答案：C

10.钙制剂+维生素D+双膦酸盐用于治疗

A：抗癫痫药所致的骨质疏松症

B：妇女绝经后骨质疏松症

C：原发性骨质疏松症

D：老年性骨质疏松症

答案：D

11.代表乙型肝炎病毒e抗原的是

A：HBcAb

B：HBeAg

C：HBeAb

D：HBsAb

答案：B

12.血红蛋白的正常值参考范围是

A：男性120～160g/L，女性110～150g/L

B：男性100～150g/L，女性90～150g/L

C：男性100～160g/L，女性90～150g/L

D：男性110～150g/L，新生儿170～200g/L

答案：A

13.氯化钾注射液的正确给药方法是

A：直接肌内注射

B：鞘内注射给药

C：稀释后静脉滴注

D：直接静脉注射

答案：C

14.高血压合并消化性溃疡者不宜用

A：吲达帕胺

B：利血平

C：比索洛尔

D：硝苯地平

答案：B

15.（2017年真题）高血压治疗药物选择噻嗪类利尿剂慎用于（）

A：双侧肾动脉狭窄患者

B：胃溃疡患者

C：心力衰竭患者

D：痛风患者

答案：D

16.具有抗肿瘤作用的抗风湿药

A：布洛芬

B：利妥昔单抗

C：塞来昔布

D：甲氨蝶呤

答案：D

17.（2016年真题）患者，男，70岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院、目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是（）。

A：阿司匹林

B：利伐沙班

C：氯吡格雷

D：肝素

答案：A

18.对于癌症患者肠痉挛性疼痛，可考虑联合使用

A：加巴喷丁

B：芬太尼注射剂

C：布洛芬混悬液

D：丁溴东莨菪碱片

答案：D

19.影响核酸合成的药物

A：依托泊苷

B：放线菌

C：顺铂

D: 培美曲塞

答案：D

20.患者，男性，55岁，近期感觉乏力、疲倦、心悸、气短，经常头晕、头疼、困倦。经医生检查发现，患者皮肤干燥、指甲扁平。实验室检查示Hb72g/L。诊断为缺铁性贫血，处方为乳酸亚铁口服。

A: 心脏相关风险

B: 肝毒性

C: 胃肠道反应

D: 肾毒性

答案：C

21.药师应告知医师“合理用药信息”的事例是

A: 头孢菌素类之间无共同抗原决定簇；如头孢哌酮皮试阳性者头孢曲松钠皮试阴性

B: 氟西汀或帕罗西汀与异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用引起5-羟色胺综合征

C: 培氟沙星引起跟腱炎，合用糖皮质激素可致跟腱断裂

D: 他汀类药物合用吉非贝齐或烟酸致横纹肌溶解症

答案：A

22.患者，男，72岁，因腰痛无法起床1天就诊。患者已有多年的腰痛病史，经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难，行走为小步慢行，昨夜睡眠正常，早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史。经X线检查诊断为腰椎压缩性骨折。

A: 维生素D+双膦酸盐类+钙剂

B: 维生素D+雷洛昔芬+钙剂

C：维生素C+双膦酸盐类+钙剂

D：维生素D+雌激素+钙剂

答案：A

23.患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇紫绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A：急性左心衰竭

B：急性心肌炎

C：支气管哮喘

D：大叶性肺炎

答案：A

24.在现代社会，药学信息的收集已不困难，但很容易出现信息量大但杂乱无章和重复的现象。药师必须通过专业的药学信息检索，对众多良莠不齐的药物信息进行客观、合理的分析评价，去伪存真，挑出有专业证据的高质量信息，指导临床合理用药。

A：国家基本药物处方集

B：中国国家处方集

C：药物不良反应

D：新编药物学

答案：B

25.患者,男,60岁,坏死性胰腺炎剖腹探查术术后2年,恢复良好。进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是（）

A：干酵母片

B：复方阿嗪米特肠溶片

C：奥美拉唑肠溶胶囊

D: 蒙脱石散

答案：B

26.赵某，男性，60岁，既往高血压病史8年。与邻居吵架后突然起病，言语不清、左侧肢体无力、意识不清。查体：BP210／120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激阳性，左侧肢体无法活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 缺血性脑卒中

B: 脑血栓形成

C: 脑出血

D: 短暂性脑缺血发作

答案：C

27.影响氟胞嘧啶药效的PK／PD参数是

A: Cmax／MIC

B: Cmax

C: AUC0～24／MIC

D: %T>MI

答案：D

28.可吸附砷、沉淀汞的是

A: 鸡蛋白

B: 药用炭混悬液

C: 3%～5%鞣酸溶液

D: 1%氯化钠溶液

答案：A

29.仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

A: 雷洛昔芬
B: 帕米磷酸二钠
C: 骨化三醇
D: 阿法骨化醇
答案：A

30.前列腺增生症治疗药物特拉唑嗪的不良反应是
A: 性功能障碍
B: 加重闭角型青光眼
C: 心动过缓
D: 体位性低血压
答案：D

31.患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15kg。1天前开始发热，体温39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热20h左右出现腹泻，每间隔2～3小时排1次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L，粪便镜检可见红、白细胞。
A: 消化不良性腹泻
B: 感染性腹泻
C: 动力性腹泻
D: 分泌性腹泻
答案：B

32.根据药物对胎儿的危害,美国FDA将妊娠用药毒性分为A、B、C、D、X五个级别,正常剂量维生素D的妊娠毒性分级是()
A: D级

B: A级

C: X级

D: C级

答案：B

33.再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血可导致

A: 红细胞生成减少

B: 红细胞生成过多

C: 红细胞丢失过多

D: 血红蛋白生成减少

答案：A

34.核苷酸类HIV逆转录酶抑制剂（）

A: PIs

B: NNRTIs

C: NRTIs

D: FIs

答案：C

35.易吸湿的药品

A: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧

B: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处

C: 可贮存于严密的药箱内

D: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装

答案：A

36.每次配方尽可能1次完成，是针对

A: 规范操作、坚持核对

B: 配备足够的人力

C: 环境整齐、安静

D: 及时沟通

答案：A

37.便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是

A: 聚乙二醇4000

B: 番泻叶

C: 硫酸镁

D: 多库酯

答案：B

38.可能诱发心血管脑病、引起肝癌、肾癌的是

A: 精神刺激剂

B: 蛋白同化制剂

C: 易制毒药品

D: 肽激素类

答案：B

39.易经乳汁分泌药物的特性是

A: 蛋白结合率高

B: 弱酸性

C: 分子量大

D: 脂溶性高

答案：D

40.正常人的体温在37℃左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

A: 37.4℃～38℃

B: 37℃以上

C: 41℃以上

D: 38.1℃～39℃

答案：D

41.对伴有血管性水肿的荨麻疹可选用的药物是

A: 氯雷他定

B: 泮托拉唑

C: 赛庚啶

D: 氯苯那敏

答案：C

42.抗高血压药物中，非二氢吡啶类钙通道阻滞剂的主要不良反应为()。

A: 房屋传导阻滞，心功能抑制

B: 直立性低血压

C: 血钾减低、血钠减低、血尿酸升高

D: 血钾增高

答案：A

43.痛风急性发作期不宜服用，以防发生转移性痛风发作的是

A: 苯溴马隆

B: 泼尼松

C：秋水仙碱

D：别嘌醇

答案：A

44.缺铁性贫血、铅中毒贫血是由于

A: 红细胞生成减少

B: 红细胞丢失过多

C: 血红蛋白生成减少

D: 红细胞生成过多

答案：C

45.指本次不良反应经采取相应的医疗措施后的结果；如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，此栏应填"好转"

A: 不良反应/事件的结果

B: 用药起止时间

C: 用药原因

D: ADR/ADE过程描述

答案：A

46.博来霉素的主要毒副作用是（）

A: 心脏毒性

B: 肺纤维化

C: 溶血性尿毒症

D: 出血性膀胱炎

答案：B

47.关于II期临床试验的正确说法是

A: 试验样本数多发病不少于300例，其中主要病种不少于200例

B: 试验样本数多发病不少于300例，其中主要病种不少于100例

C：试验样本数多发病不少于300例，其中主要病种不少于50例

D：试验样本数多发病不少于500例，其中主要病种不少于100例

答案：B

48.患者，男，64岁，因“右足肿痛”就诊。查体：右足第一跖趾关节红肿、触痛明显。化验结果：血尿酸588．1μmol／L。诊断为“急性痛风性关节炎”。患者既往有高血压、高胆固醇血症、冠心病病史，目前正服用氢氯噻嗪片25mgqd、美托洛尔缓释片47.5mgqd、赖诺普利片20mgqd、辛伐他汀片10mgqd、阿司匹林肠溶片100mgqd。

A：双氯芬酸钠片

B：阿司匹林片（300mg）

C：贝诺酯片

D：别嘌醇片

答案：A

49.收录22000多种处方药和6000多种OTC药物的药学综合信息是

A：《药物信息手册》

B：《医师案头参考》

C：《马丁代尔药物大典》

D：《药物事实与比较》

答案：D

50.《国家非处方药目录》收录的治疗过敏性鼻炎的药物不包括

A：羟甲唑啉滴鼻液

B：赛洛唑啉滴鼻液

C：1%麻黄碱滴鼻液

D：丙酸倍氯米松鼻喷雾剂

答案：D

51.下列药学服务的对象中，不属于药学服务的特殊人群是

A: 血液透析者

B: 特殊体质者

C: 住院患者

D: 小儿、老人

答案：C

52.属于M受体激动剂的是

A: 异丙托溴铵

B: 美托洛尔

C: 福莫特罗

D: 乙酰胆碱

答案：D

53.某女孩，6岁，2个月来反复出现突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视、呼之不应，手中物体掉落．但从不跌倒，持续数秒钟可缓解。

A: 肌阵挛发作

B: 单纯部分性发作

C: 复杂部分性发作

D: 失神发作

答案：D

54.毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效的解毒药，但救治原则基本相同。

A: 巴比妥

B: 硫喷妥钠

C: 异戊巴比妥

D: 苯巴比妥

答案：C

55.患儿男,2岁,误服水银后应选用的洗胃液是（）

A: 淀粉溶液

B: 1:5000高锰酸钾溶液

C: 牛奶与水等量混合

D: 鸡蛋清

答案：D

56.转复并维持窦性心律

A: 华法林

B: 硝苯地平

C: 血凝酶

D: 多非利特

答案：D

57.患者向药师咨询停用口服避孕药后多久可备孕。下列答复中正确的是()

A: 复方短效口服避孕药停药6个月后方可备孕

B: 长效避孕药停药后即可备孕

C: 复方短效口服避孕药停药后即可备孕

D: 复方短效口服避孕药停药3个月后方可备孕

答案：C

58.治疗心力衰竭时，可抑制心肌重构和心肌纤维化的治疗药物不包括

A: 血管紧张素转换酶抑制剂

B: 醛固酮受体阻断剂
C: 血管紧张素Ⅱ受体阻断剂
D: 强心苷类药物
答案：D

59.过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用()
A: 氧氟沙星滴眼液
B: 七叶洋地黄双苷滴眼液
C: 玻璃酸钠滴眼液
D: 色甘酸钠滴眼液
答案：D

60.患者，女，57岁，最近因失眠来门诊就医。经医生咨询，患者反映以前没有过失眠现象，近期因工作原因导致压力加大，心理负担过重，白天想睡觉，晚上却无法入睡，每天睡眠不足5h。医生给予患者建议平时要注意多增加运动，缓解压力，并开具了如下处方：地西泮片：5mg×20/5mgqd
A: 无适应证用药
B: 超适应证用药
C: 处方应写商品名
D: 门诊处方所开剂量不能超过7日用量
答案：D

61.沟通技能在药学服务工作中最重要的作用是
A: 用药教育作用
B: 应对投诉作用
C: 双向交流作用
D: 药品警戒作用

答案：C

62.药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是()

A: 硫普罗宁片

B: 双歧三联活菌胶囊

C: 西地碘片

D: 乳酶生片

答案：B

63.患者，男，22岁，2天前因淋雨后出现发热，体温最高达39℃。经实验室和X线胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是

A: 阿米卡星

B: 阿奇霉素

C: 阿莫西林

D: 亚胺培南-西司他丁

答案：C

64.妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A: 妊娠1～2周

B: 妊娠3～5周

C: 妊娠1～3周

D: 妊娠3～4周

答案：B

65.（2018年真题）服用华法林期间应进行监测的指标是（）

A：ALT

B：INR

C：RBC

D：APTT

答案：B

66.急性期

A：1～6个月

B：2周

C：1～3个月

D：1个月内

答案：D

67.（2019年真题）患者，男，28岁，外出进餐后出现腹泻，一日6次，水样便，无发热和腹痛症状。宜选用的药物是

A：奥美拉唑肠溶胶囊

B：蒙脱石散

C：干酵母片

D：复方阿嗪米特肠溶片

答案：B

68.在医生的指导下使用已证明对胚胎与胎儿无害的药物，即

A：可用可不用的药物应尽量不用或少用

B：选用对胎儿危害较小的药物

C：禁止用试验性药

D：用药必须有明确的指征和适应证

答案：D

69.长期使用可降低血小板数量，可引起紫癜的药物是

A：卡马西平

B：文拉法辛

C：阿苯达唑

D：氟西汀

答案：C

70.（2015年真题）细菌感染腹泻患者宜选用（）。

A：干酵母

B：乳果糖

C：阿苯达唑

D：小檗碱

答案：D

71.（2017年真题）与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是（）

A：地衣芽孢杆菌活菌胶囊

B：左旋多巴片

C：非洛地平片

D：维A酸片

答案：C

72.麻醉药品、第一类精神药品处方的前记中，必须添加的项目是

A：药品名称、剂型、规格、数量

B：临床诊断

C：患者身份证明编号

D：患者姓名、性别

答案：C

73.（2015年真题）消化不良患者宜选用（）。

A：乳果糖

B：小檗碱

C：干酵母

D：阿苯达唑

答案：C

74.服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

A：餐后

B：餐前0.5～1小时

C：餐前

D：餐后1小时

答案：B

75.关于处方书写中的基本要求错误的

A：中药饮片调剂、煎煮的特殊要求注明在药品左上方并加括号

B：麻醉药品处方应有病历记录

C：一般情况下均要注明临床诊断

D：年龄必须写实足年龄

答案：A

76.（2019年真题）患者，女，62岁，2型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难，不宜选用的药物是

A：二甲双胍

B：格列齐特

C：吡格列酮

D：阿卡波糖

答案：C

77.患者,男,60岁,因水泡型足癣到药店购药药师应推荐的药品是()
A: 特比萘芬乳膏
B: 氢化可的松软膏
C: 利巴韦林软膏
D: 10%樟脑软膏
答案：A

78.受精后半个月以内
A: 女性生殖系统发育迟缓
B: 可产生形态或功能的异常而造成畸形
C: 几乎见不到药物的致畸作用
D: 中枢神经系统发育迟缓
答案：C

79.可致驾驶员嗜睡、神志低沉的是
A: 氯苯那敏
B: 阿米洛利
C: 东莨菪碱
D: 阿司匹林
答案：A

80.药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到ADR时，需要进行因果关系评价。患者，男，45岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗1个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该ADR的因果关系评价结果是()
A: 可能无关

B: 很可能
C: 肯定
D: 可能
答案：C

81.患者,女,45岁,常有上腹部饱胀、恶心食欲不振等消化不良症状。宜选用的药物（）
A: 干酵母片
B: 复方阿嗪米特肠溶片
C: 奥美拉唑肠溶胶囊
D: 蒙脱石散
答案：A

82.（2017年真题）用于评价肝功能不全严重程度的是（）
A: Cochrane证据分级
B: 数字评分法
C: CTP评分标准
D: APACHE评分系统
答案：C

83.（2019年真题）患者，男，72岁。诊断:高血压，心力衰竭，肋软骨炎。
A: 在患者症状好转后，应立即停用比索洛尔
B: 应注意观察是否有黑便
C: 应定期监测血压、心率
D: 应定期监测地高辛血药浓度
答案：A

84.（2016年真题）患者，男，67岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率100ml/min，医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法用量是（）。

A: 0.4g，每日3次

B: 0.4g，每日2次

C: 0.4g，每日4次

D: 0.4g，每日5次

答案：D

85.属于超短效的胰岛素制剂是

A: 低精蛋白锌胰岛素

B: 精蛋白锌胰岛素

C: 赖脯胰岛素

D: 甘精胰岛素

答案：C

86.可用于紫癜辅助治疗的药物是

A: 复合维生素B

B: 维生素

C: 维生素A

D: 维生素C

答案：D

87.常见老年人ADR的药物类别,普萘洛尔致心动过缓、心脏停搏、诱发哮喘，加重心衰

A: β受体阻断剂

B: 钙通道阻滞剂

C：抗生素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/778070064043007022