

2022 年《临床执业医师》执业医师资格考试基础题 (附答案)

一、单项选择题（共 130 题，每题 1 分）。

1、女性、65 岁、未孕。绝经 6 年、少量阴道流血 2 周、妇科检查：宫颈正常、子宫如妊娠 6 周大、稍软、双附件正常。本例确诊方法是

- A、B 超
- B、宫颈刮片
- C、腹腔镜
- D、分段诊刮
- E、血清肿瘤标志物检查

【参考答案】：D

2、下列临床表现中最不支持心绞痛诊断的是

- A、疼痛可在睡眠中发生
- B、含服硝酸甘油，疼痛在 3~5 分钟内缓解
- C、疼痛易被运动或情绪激动诱发
- D、反复出现的局限性心前区刺痛，每次持续仅 2~3 秒
- E、疼痛在休息时发生，持续 1~10 分钟

【参考答案】：D

3、焦虑症的核心症状为

- A、注意力集中困难
- B、精神焦虑
- C、躯体焦虑
- D、记忆力减退

E、睡眠障碍

【参考答案】： B

4、早、中期食管癌常用的手术方法是

A、食管胃转流术

B、食管癌切除，用结肠食管重建术

C、食管癌切除，用胃食管重建术

D、食管癌切除，用空肠食管重建术

E、胃造瘘术

【参考答案】： C

5、不符合急性心包炎的心电图变化

A、弓背向下型 ST 段抬高

B、T 波平坦或倒置

C、QRS 波呈低电压

D、电交替

E、弓背向上的 ST 抬高

【参考答案】： E

6、后纵隔肿瘤最常见的是

A、畸胎瘤

B、神经源性肿瘤

C、胸腺瘤

D、淋巴源肿瘤

E、胸内甲状腺

【参考答案】： B

7、我国将围生(产)期定为

- A、自妊娠 20 周到产后 7 足天
- B、自妊娠 28 周到产后 7 足天
- C、自妊娠 20 周到产后 14 足天
- D、自妊娠 28 周到产后 14 足天
- E、自妊娠 28 周到产后 28 足天

【参考答案】： B

8、男性，45 岁；发作性心动过速。心电图示室上速，心率 200 次 / 分，血压 80 / 50mmHg，平日未用药物治疗，此时最佳治疗方案是

- A、电复律
- B、静注异搏定
- C、静注 β 受体阻滞剂
- D、用间羟胺升压药
- E、按摩颈动脉窦

【参考答案】： A

9、吸气性呼吸困难见于

- A、脑外伤
- B、甲状腺肿大
- C、心肌病
- D、大量胸腔积液
- E、有机磷中毒

【参考答案】： B

10、氟喹诺酮类药物的作用机制是

- A、抑制细菌的转肽酶而影响细菌粘肽合成
- B、抑制细菌二氢叶酸合成酶
- C、抑制细菌 DNA 螺旋酶，阻碍 DNA 复制
- D、抑制细菌蛋白合成
- E、以上都不是

【参考答案】： C

11、治疗剂量下出现的与用药目的无关的反应是

- A、继发反应
- B、特异性反应
- C、毒性反应
- D、变态反应
- E、副作用

【参考答案】： E

12、医师进行试验性临床医疗。应当

- A、经医院批准
- B、征得本人同意
- C、征得患者本人或者其家属同意
- D、经医院批准并征得患者本人或者其家属同意
- E、经医院批准或者征得患者本人及家属同意

【参考答案】： D

13、当风湿性心脏病二尖瓣狭窄程度加重时()

- A、心尖部舒张期滚筒样杂音增强、肺动脉第二音减低
- B、心尖部舒张期滚筒样杂音减低、肺动脉第二音减低

- C、心尖部舒张期滚筒样杂音减低、肺动脉第二音增强
- D、心尖部舒张期滚筒样杂音增强、肺动脉第二音增强
- E、心尖部收缩期吹风样杂音和舒张期滚筒样杂音增强

【参考答案】： A

14、2 岁小儿，生后 4 个月出现发绀，哭吵甚，时有抽搐史。杏体：发育差，紫绀明显，心前区可闻及Ⅲ级左右收缩期的喷射音，胸片示肺门血管影少。右心室增大，心腰凹陷，呈靴形心。此患儿的诊断应是

- A、法洛四联症
- B、动脉导管未闭
- C、肺动脉狭窄
- D、室间隔缺损
- E、房间隔缺损

【参考答案】： A

15、Allen 试验可检查

- A、桡、尺动脉的通畅和相互吻合的情况
- B、腕管综合征
- C、胸廓出口综合征
- D、神经根型颈椎病
- E、颈肋畸形

【参考答案】： A

16、中年男子，猛抬重物后腰剧痛并向右下肢放射，咳嗽时加重，其诊断最大可能是

- A、腰椎骨折
- B、腰椎滑脱

- C、腰部肌筋膜炎
- D、腰间盘突出症
- E、腰扭伤

【参考答案】： D

17、兴奋在神经纤维上呈不衰减传导的原因是

- A、局部电流等于阈强度
- B、局部电流大于阈强度
- C、能量消耗小
- D、呈跳跃式传导
- E、电紧张性扩布

【参考答案】： B

18、维系蛋白质分子中，螺旋的化学键是

- A、盐键
- B、疏水键
- C、氢键
- D、肽键
- E、二硫键

【参考答案】： C

19、马斯洛需要层次从低到高的排列顺序是

- A、生理的需要，尊重的需要，安全的需要，爱与被爱的需要，自我实现的需要
- B、生理的需要，尊重的需要，爱与被爱的需要，安全的需要，自我实现的需要

C、生理的需要，爱与被爱的需要，安全的需要，尊重的需要，自我实现的需要

D、生理的需要，安全的需要，爱与被爱的需要，尊重的需要，自我实现的需要

E、生理的需要，安全的需要，尊重的需要，爱与被爱的需要，自我实现的需要

【参考答案】： D

20、根据 WHO 诊断标准，高血压定义为

A、 $\geq 130 / 85\text{mmHg}$

B、 $\geq 140 / 90\text{mmHg}$

C、 $\geq 150 / 95\text{mmHg}$

D、 $\geq 160 / 100\text{mmHg}$

E、 $\geq 180 / 110\text{mmHg}$

【参考答案】： B

21、不属于医学心理学研究分支的是

A、临床心理学

B、健康心理学

C、发展心理学

D、神经心理学

E、护理心理学

【参考答案】： C

22、一个测验工具中对于对象可以测量到的程度，是指该工具的

A、常模

B、信度

C、效度

D、样本

E、标准

【参考答案】： B

23、慢性肾上腺皮质功能减退症不全的替代治疗中，首选药物是

A、泼尼松

B、可的松

C、泼尼松龙

D、地塞米松

E、氟氢可的松

【参考答案】： B

24、心迷走神经末梢释放的递质是

A、组胺

B、乙酰胆碱

C、肾上腺素

D、去甲肾上腺素

E、谷氨酸

【参考答案】： B

25、心理治疗的目标是促进求助者的成长和自立，不能代替病人作出任何选择与决定。这是心理治疗的

A、真诚原则

B、耐心原则

C、保密原则

D、中立原则

E、回避原则

【参考答案】：C

26、动作电位升支超过 0mV 的部分称为

A、去极化

B、超极化

C、复极化

D、超射

E、极化

【参考答案】：D

27、关于骨盆的外测量错误的是

A、髂棘间径(IS)正常值为 23~26cm

B、髂嵴间径(IC)正常值为 25~28cm

C、骶耻外径(EC)正常值为 18~20cm

D、出口横径(TO)正常值为 8.5~9.5cm

E、出口后矢状径正常值为 8~10cm

【参考答案】：E

28、男，28 岁。骑跨伤 8 小时，排尿困难。尿道口流血，排尿时会阴部疼痛加重：体检：阴囊明显肿大，有血尿外渗，尿管不能插入，其最佳的处理方法

A、以金属导尿管导尿

B、立即施行尿道修补

C、行尿道会师

D、耻骨上膀胱造瘘

E、施行尿道修补和引流积血尿外渗

【参考答案】： E

29、局限于粘膜及粘膜下层的胃癌是

A、原位癌

B、浸润型癌

C、早期癌

D、进展期癌

E、晚期癌

【参考答案】： C

30、抢救羊水栓塞的首要措施是

A、纠正 DIC 及继发纤溶

B、纠正呼吸循环衰竭

C、纠正肾功衰竭

D、立即终止妊娠

E、切除子宫

【参考答案】： B

31、叶酸主要用于治疗

A、慢性失血所致贫血

B、妊娠期巨幼红细胞性贫血

C、乙胺嘧啶所致巨幼红细胞性贫血

D、溶血性贫血

E、再生障碍性贫血

【参考答案】： B

32、再障血象骨髓象特点

- A、呈全血细胞减少，少数呈两系细胞或血小板减少
- B、细胞大小不等，中心淡染区扩大
- C、可见巨核细胞增多，血片中血小板计数减少，可见畸形血小板
- D、粒细胞停滞于早幼粒阶段，胞浆中颗粒粗大
- E、骨髓增生活跃，但巨核细胞减少

【参考答案】： A

33、确定肺结核是否为传染源的最主要依据是

- A、血沉检查
- B、X 线检查
- C、痰结核菌检查
- D、结核菌素试验
- E、血结核抗体检查

【参考答案】： C

34、细胞水肿的发生机制主要与下列哪种细胞器的功能障碍有关

- A、高尔基体
- B、内质网
- C、溶酶体
- D、线粒体
- E、核糖体

【参考答案】： D

35、下列哪一项在乳房的物理检查中应避免

- A、按一定顺序检查乳房

- B、先检查健侧再检查患侧乳房
- C、用手轻抓捏乳房及肿物，以体会肿物情况
- D、用手掌面轻按揉滑动检查腋窝淋巴结情况
- E、乳头溢液需观察溢液量、色泽及溢液是否清亮，有无血性溢液等

【参考答案】： C

36、CAMP-蛋白激酶途径的传递通路是

- A、激素+受体→G 蛋白→AC→CAMP→PKA→效应蛋白(酶)磷酸化→生物效应
- B、激素+受体→PKA→AC→CAMP→G 蛋白→效应蛋白(酶)磷酸化→生物效应
- C、激素+受体→G 蛋白→PKA→CAMP→AC→效应蛋白(酶)磷酸化→生物效应
- D、激素+受体→AC→G 蛋白→CAMP→PKA→效应蛋白(酶)磷酸化→生物效应
- E、激素+受体→G 蛋白→CAMP→AC→PKA→效应蛋白(酶)磷酸化→生物效应

【参考答案】： A

37、下述关节脱位的特有体征，哪项是正确的

- A、肿胀，畸形，功能障碍
- B、压痛，肿胀，淤斑
- C、畸形，反常活动，关节空虚
- D、畸形，反常活动，弹性固定
- E、畸形，弹性固定，关节空虚

【参考答案】： E

38、对于心包炎的病因，不正确的是

- A、病毒
- B、结核
- C、肿瘤
- D、心脏员伤
- E、遗传

【参考答案】： E

39、将实验犬的肾切除，并给输入或饲喂氨基酸，血中尿素含量明显升高；若将实验犬的肝切除，则血中氨及氨基酸含量明显升高；若将犬的肝、肾同时切除，则血中尿素的含量可维持在较低水平，而血氨浓度明显增高。这些实验证明合成尿素的最主要器官是

- A、肾
- B、脑
- C、肠道
- D、肝
- E、肌肉

【参考答案】： D

40、对脑血管扩张作用最强的药物是

- A、硝苯吡啶
- B、尼莫地平
- C、非洛地平
- D、尼索地平
- E、尼群地平

【参考答案】： B

41、青霉素对金黄色葡萄球菌的作用是

- A、破坏磷壁酸
- B、损伤细胞膜
- C、与核糖体竞争性结合
- D、抑制肽聚糖的合成
- E、抑制菌体蛋白的合成

【参考答案】： D

42、某女，31 岁，原发不孕 3 年，月经正常，量中等，无痛经，妇查未发现异常，进一步检查首选

- A、输卵管通液
- B、B 超检查
- C、性交后试验
- D、腹部平片
- E、诊断性刮宫

【参考答案】： A

43、正常妊娠于 12 周时。子宫底于

- A、腹部不能触及
- B、耻骨联合上刚能触及
- C、耻骨联合上 2~3 横指
- D、脐耻之间
- E、以上都不是

【参考答案】： C

44、“癌前病变”最确切的概念是

- A、癌肿的早期阶段
- B、良性肿瘤发生了癌变
- C、一种恶性病变、不可逆转
- D、有癌变潜在可能的良性病变、有可能逆转
- E、有癌变潜在可能的良性病变、但必然会发展为癌肿

【参考答案】： D

45、下列肝炎病毒基因组归类于 DNA 病毒的是

- A、甲型肝炎
- B、乙型肝炎
- C、丙型肝炎
- D、丁型肝炎
- E、戊型肝炎

【参考答案】： B

46、6 岁男孩，自幼营养欠佳，较瘦小。可见方颅、肋膈沟和 O 形腿。查：血钙稍低，血磷降低，X 线示干骺端临时钙化带呈毛刷样，考虑其确切的诊断是

- A、营养不良
- B、维生素 D 缺乏性佝偻病
- C、维生素 D 缺乏性手足搐搦症
- D、抗维生素 D 佝偻病
- E、软骨营养不良

【参考答案】： B

47、关于异位妊娠，最常见的原因为什么

- A、输卵管发育不良或功能异常

- B、输卵管周围的肿瘤压迫
- C、输卵管粘膜炎症和周围炎
- D、宫内节育器或其他节育措施后
- E、助孕技术或受精卵游走

【参考答案】： C

48、可寄生于巨噬细胞内的细菌是

- A、鼠疫耶尔森菌
- B、布鲁菌
- C、金黄色葡萄球菌
- D、破伤风梭菌
- E、炭疽芽胞杆菌

【参考答案】： B

49、保证运动器官血液供应的重要机制是

- A、心输出量增加
- B、循环血管增加
- C、静脉回流量增加
- D、各器官血流量的重新分配
- E、血压升高

【参考答案】： A

50、小儿 5 个月，烦躁不安，多汗，后枕部脱发，有颅骨软化，诊断及治疗为

- A、佝偻病初期，维生素 D0.5 万~1 万 IU / d
- B、佝偻病激期，维生素 D500~1000IU / d

- C、佝偻病恢复期，维生素 D400~800IU / d
- D、佝偻病初期，维生素 D1 万~2 万 IU / d
- E、佝偻病激期，维生素 D1 万~2 万 IU / d

【参考答案】： E

51、指出抗甲状腺药卡比吗唑的作用机制

- A、使促甲状腺激素释放减少
- B、抑制甲状腺腺泡增生
- C、拮抗已合成的甲状腺素
- D、拮抗促甲状腺素
- E、抑制甲状腺腺泡细胞内过氧化物酶，妨碍甲状腺素合成

【参考答案】： E

52、因抢救急危患者、未能及时书写病历的、有关医务人员应当在抢救结束后据实补记、并加以注明、其时限是

- A、2 小时内
- B、4 小时内
- C、6 小时内
- D、8 小时内
- E、12 小时内

【参考答案】： C

53、宫颈癌临床分期是根据

- A、临床症状的严重程度
- B、病理细胞分级
- C、临床可见或不可见病变

D、病灶侵犯范围

E、血管或淋巴管内有无瘤栓

【参考答案】： D

54、正常情况下，机体有菌的部位是

A、脑脊液

B、骨骼

C、肌肉

D、血液

E、鼻腔

【参考答案】： E

55、男婴，足月，有宫内窘迫史，羊水 II 度污染。经产钳助产娩出。生后 1 分钟四肢青紫，心率每分钟 95 次，刺激时皱眉，呼吸浅弱，肌张力低，下列哪项措施不正确

A、擦干，保暖

B、吸出污染的羊水，保持呼吸道通畅

C、给氧

D、注射山梗茶碱刺激呼吸

E、若心率每分钟 60 次，进行胸外心脏按摩

【参考答案】： D

56、不是由于容量负荷过重所致心力衰竭的疾病是

A、主动脉瓣关闭不全

B、甲状腺功能亢进症

C、二尖瓣关闭不全

D、室间隔缺损

E、动静脉瘘

【参考答案】：B

57、间日疟患者经奎宁治疗 3 天，临床症状消失，2 个月后又出现疟疾，并在血中查到疟原虫，此种情况应考虑

A、疟疾再感染

B、疟疾复发

C、疟疾复燃

D、不同疟原虫混合感染

E、疟原虫重复感染

【参考答案】：C

58、结核性腹膜炎时，在腹水中发现结核杆菌阳性率最高的方法是

A、腹水浓缩法找结核杆菌

B、腹水动物接种法

C、腹水培养法

D、腹水直接涂片法

E、病理切片法

【参考答案】：B

59、菌痢流行间歇期间的重要传染源是

A、急性期病人

B、轻症病人

C、重症病人

D、急性恢复期病人

E、慢性病人和带菌者

【参考答案】： E

60、慢性支气管炎有小气道阻塞时、最敏感的肺功能检查指标是

A、第一秒用力呼气量占用力肺活量

的比值减少

B、残气容积明显增加

C、呼吸道阻力增加

D、闭合容量减少

E、频率依赖性肺顺应性降低

【参考答案】： E

61、关于酶竞争性抑制剂的叙述错误的是

A、抑制剂与底物结构相似

B、抑制剂与底物竞争酶的底物结合部位

C、增加底物浓度也不能达到最大反应速度

D、当抑制剂存在时 K_m 值变大

E、抑制剂与酶非共价结合

【参考答案】： C

62、男性，30岁，半年前上腹部曾受钝挫伤。2个月前上腹部出现肿物，近来常有呕吐，但无腹痛及发热。检查：上腹部有巨大囊性肿物，无压痛，诊断为假性胰腺囊肿，最好的治疗方法是

A、继续观察

B、穿刺抽吸囊肿内容物

C、手术切除囊肿

D、囊肿外引流术

E、囊肿内引流术

【参考答案】： E

63、紫外线灭菌主要适用于

- A、空气
- B、药液
- C、食具
- D、手术器械
- E、抗血清

【参考答案】： A

64、孙某，男，20岁，每天总感到身体上有许多蚂蚁在身上爬，有电流击他，有人用针刺他的全身，非常疼痛，此症状是

- A、幻触
- B、错觉
- C、感觉过敏
- D、感觉倒错
- E、本体幻觉

【参考答案】： A

65、以下关于急性病毒性肝炎细胞变化的描述，哪项是不常见的变化

- A、水性肿胀
- B、嗜酸性变
- C、肝细胞点状坏死
- D、肝细胞气球样变
- E、肝细胞脂肪变性

【参考答案】： E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778112042035006141>